






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.328









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.328





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.328





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.328


1K.6

1.6.328



XI  
MENG:







*Men*  
**GEOMETRIA**

**SPECIOSA.**



GEOMETRIA

2 F E C I O S A



3  
AD MAIOREM  
DEI GLORIAM

GEOMETRIÆ SPECIOSÆ  
ELEMENTA

PRIMUM

*De potestatibus, à radice binomia, & residua.*

SECUNDUM

*De innumerabilibus numerosis progressionibus.*

TERTIUM

*De quasi proportionibus.*

QUARTUM

*De rationibus logarithmicis.*

QVINTVM

*De proprijs rationum logarithmis.*

SEXTVM

*De innumerabilibus quadraturis.*



PETRI MENGOLI

I. V. Ph. D. Coll. Patr. Bonon. Archigymn. Mechanici.

BONONIÆ, Typis Io. Baptistæ Ferronij 1659.  
*Superiorum permissu.*



<sup>4</sup>  
Vidit Ouidius Montalbanus Philosophus Moralis, Mathematicus, & Iurista: & vndequaq; speciosa, & dignissima luce publica inuenit hæc Elementa, &c. Pro Reuerendis.  
P. Inquisit. Bonon.

Vidit D. Inuentius Tortus Cler. Reg. S. Pauli, Poenit. pro Illustris. & Reuerendis. D. D. Hieronymo, Boncompagno Archiep. Bonon. & Princ.

*Imprimatur.*

Fr. Gulielmus Fochus Inquisitor Bonon.



## REGESTVM.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRST  
VXYZ. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vu Xx Yy Zz. Aaa Bbb Ccc.

Omnes sunt duerniones, præter k, quæ est ternio, & c, quæ est semifol.



5

Amplissimo, & Integerrimo Viro  
D. FERDINANDO RIARIO,

Marchioni Castilionis Orciæ, Patritio Veneto,  
Senatori Bononiensi, Antiquiori, & Benemerito  
Patri Patriæ: PETRVS MENGOLVS Felicitatem.



~~~~~  
Eque Speciosæ Geometrię  
pulchritudini, neque tui  
Nominis claritati, quid-  
quam appositum existimo, Vir Am-  
plissime; quòd istud, in illius fronte  
præfulgeat. Ipsæ satis amabiles litte-  
rarum cultoribus visæ sunt, vtraque  
Geometria, Archimedis antiqua, &  
Indiuisibilibium noua Bonauenturæ  
Cauallerij Præceptoris mei, necnon  
& Viettæ Algebra: quarum, non ex  
confusione, aut mixtione, sed con-  
iunctis



<sup>6</sup>  
iunctis perfectionibus, noua quæ-  
dam, & propria laboris nostri species,  
nemini poterit displicere. Tuæ verò  
splendor gloriæ, Mathematicas quan-  
tasque longè prætergreditur lu-  
cubrationes: & quacunque versum  
prudencia regit fortunam, præclaris-  
simos diffundit radios; tuaque dome-  
stica sinceræ insinuat virtutis exem-  
pla. Inter quæ, singulare illud, ad bo-  
nas artes promouendas, tuæ officium  
est prouidentia; sua cuique studia  
consilio partiri, munificentia instrue-  
re, augere fauoribus, & auctoritate  
ad Magisterij decus, & perfectio-  
nem perducere. Id quod ego exper-  
tus hucusque sum ab adolescētia, tuæ

alumnus




alumnus protectionis. Nam te sua<sup>7</sup>  
fore primū, deinde (post Caualle-  
rium defunctum) etiam præceptore,  
scholasticus Mathematicus; te Ve-  
xillifero, professor publicus Arithme-  
tices, ante lauream; & post lauream,  
te nostri Archigymnasij modera-  
tore, ad nouam vsque cathedrā Me-  
chanicarum euectus: litterariam di-  
gnitatem, & fortunas omnes, tuis de-  
beo beneficijs. Hanc itaque meam  
Geometriam, grati erga te animi  
perpetuum statuo monumentum:  
tuorumque in me munerum aliqua-  
lem censum, in illius oblatione re-  
pēdo. Feliciori longè successu, quàm  
cum alijs plerūque scriptoribus con-  
tingit,



8  
tingit, surdis vota numinibus nuncu-  
pare: tabellaſque appendere; quarum  
dij ſui ne quidem titulos intelligant.  
Tibi vni, me ipſum totum, volunta-  
te pariter, & intellectu deditum, cre-  
ditumque deuincio: qui ſi forte ſtu-  
dijs Geometriæ quidquam adiece-  
ro, propoſito conueniens titulo, no-  
uum videlicet, atque ſpecioſum;  
tuam poſtulo, & expecto, noſtrorum  
elementorum, benigna in ſuſceptio-  
ne, ſententiam. Vale. Bononiæ  
IX. Kal. Ianuarias MDCLX.





## Lectori Elementario.



Ibi hunc librum scripsi, Lector, & Scholaris beneuole: ideoque nihil alienum sumpsi, præterquam ex prioribus nouem Elementis Euclidis. Vt huius libri beneficio utaris, tradam breuiter, sex faciliora quædam mathemata, singula pro singulis elementis, per quæ possis, lectos quosque titulos propositionum, numerosis exemplis confirmare, nostrasque demonstrationes, arithmeticæ artis certitudine, præuenire.

### *Caput Primum.*

Primum est, pro primo elemento: constructio potestatum cuiuslibet numeri binomij, vel residui. Est autem cuiusque numeri prima potestas, ipse numerus: secunda verò, est eiusdem numeri per se ipsum multiplicationis productus, quæ dicitur, quadratus: tertia, est productus primæ potestatis in secundam, quæ dicitur, cubus: quarta, est productus primæ potestatis in tertiam, quæ dicitur, quadro-quadratus: quinta, est productus primæ potestatis in quartam: & sic deinceps in infinitum.

Potestates numerorum, vsque ad decimam, & vsque ad potestates denarij, sequens exhibet tabella.

b

N<sup>o</sup>



10  
Numerorum

Potestates.

| Prima | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 2     | 4       | 8      | 16     | 32     |
| 3     | 9       | 27     | 81     | 243    |
| 4     | 16      | 64     | 256    | 1024   |
| 5     | 25      | 125    | 625    | 3125   |
| 6     | 36      | 216    | 1296   | 7776   |
| 7     | 49      | 343    | 2401   | 16807  |
| 8     | 64      | 512    | 4096   | 32768  |
| 9     | 81      | 729    | 6561   | 59049  |
| 10    | 100     | 1000   | 10000  | 100000 |

Numerorum

Potestates.

|    | Sexta   | Septima  | Octava    |
|----|---------|----------|-----------|
| 2  | 64      | 128      | 256       |
| 3  | 729     | 2187     | 6561      |
| 4  | 4096    | 16384    | 65536     |
| 5  | 15625   | 78125    | 390625    |
| 7  | 46656   | 279936   | 1679616   |
| 7  | 117649  | 823543   | 5764801   |
| 8  | 262144  | 2097152  | 16777216  |
| 9  | 531441  | 4782969  | 43046721  |
| 10 | 1000000 | 10000000 | 100000000 |

No-



|    | <i>Nonā</i> | <i>Decima</i> |
|----|-------------|---------------|
| 2  | 512         | 1024          |
| 3  | 19683       | 59049         |
| 4  | 262144      | 1048576       |
| 5  | 1953125     | 9765625       |
| 6  | 10077696    | 60466176      |
| 7  | 40353607    | 282475249     |
| 8  | 134217728   | 1073741824    |
| 9  | 387420489   | 3486784401    |
| 10 | 1000000000  | 10000000000   |

Porro cum Francisco Vietae, alijsque placuerit Analytistis, indeterminatum quemque determinabilem numerum, eiusque priorem potestatem, cuiuspiam simplicis litterae caractere significare: placuit consequenter, indeterminatas determinabiles eiusdem numeri potestates alias, eiusdem litterae caractere significare, numeris dextrorsum adscriptis, indicantibus, quota quæque sit potestas. ut exempli gratia, cum indeterminati numeri determinabilis prima potestas fuerit notata caractere litteræ *t*; secunda potestas, caractere significabitur *t*<sup>2</sup>; tertia potestas, caractere *t*<sup>3</sup>; quarta, *t*<sup>4</sup>; quinta, *t*<sup>5</sup>: & sic deinceps. cum vero determinatus fuerit litteræ *t*, valor ternarius, 3: tunc determinatus erit caracteris *t*<sup>2</sup>, valor 9; caracteris *t*<sup>3</sup>, valor 27; caracteris *t*<sup>4</sup>, valor 81; caracteris *t*<sup>5</sup>, valor 243: & sic deinceps.

b 2

Pla-



Placuit etiam duorum indeterminatorum determinabilium numerorum potestatibus inuicem multiplicatis, productos, pariter indeterminatos & determinabiles numeros, iisdem characteribus producentium significare deinceps conscriptis, ut ex multiplicatione  $a$  per  $r$ , productum  $ar$ ; & ex multiplicatione  $a2$  per  $r$ , productum  $a2r$ , & ex multiplicatione  $a$  per  $r2$ , productum  $ar2$ .

Quibus characteribus à Vietta, Herigonio, Beugrand penes Cauallerium, vsitatis, conuenientia nos adinuenimus nomina. Nam productum  $ar$ , ex multiplicatione primarum potestatum  $a$ , &  $r$ , vocamus, Vnprimam: & productum  $a2r$ , ex multiplicatione secundæ potestatis  $a$ , per primam  $r$ , vocamus, Biprimam: productum verò  $ar2$ , ex multiplicatione primæ  $a$ , per secundam  $r$ , vocamus, Vnifecundam: &  $a3r$ , productum tertiæ  $a$ , per primam  $r$ , vocamus, Triprimam: &  $a2r2$ , secundæ  $a$ , per secundam  $r$ , Bisecundam: &  $ar3$ , primæ  $a$ , per tertiam  $r$ , Vniterciam: item  $a4r$ , Quadriprimam:  $a3r2$ , Trifecundam:  $a2r3$ , Bitertiam:  $ar4$ , Vniquartam. & sic reliquas

$a5r$ , Quintiprimam.

$a4r2$ , Quadrifecundam.

$a3r3$ , Tritertiam.

$a2r4$ , Biquartam.

$ar5$ , Vniquintam.

$a6r$ , Sextiprimam.

$a5r2$ , Quintifecundam.

$a4r3$ , Quadntertiam.

$a3r4$ , Triquartam.

$a2r5$ , Biquintam.

$ar6$ , Vnifextam.

$a7r$ , Septimiprimam.

$a6r2$ , Sextifecundam.

$a5r3$ , Quintitertiam.

$a4r4$ , Quadriquartam.

$a3r5$ , Triquintam.

$a2r6$ ,



*a2r6*, Bisextam.  
*ar7*, Vniseptimam.  
*a8r*, Octauiprimam.  
*a7r2*, Septimifecundam.  
*a6r3*, Sextitertiam.  
*a5r4*, Quintiquartam.  
*a4r5*, Quadriquantam.  
*a3r6*, Trisextam.  
*a2r7*, Biseptimam.  
*ar8*, Vnioctauam.

13  
*a9r*, Noniprimam.  
*a8r2*, Octauifecundam.  
*a7r3*, Septimitertiam.  
*a6r4*, Sextiquartam.  
*a5r5*, Quintiquintam.  
*a4r6*, Quadrifextam.  
*a3r7*, Triseptimam.  
*a2r8*, Bioctauam.  
*ar9*, Vninonam.

Quare si litteræ *a*, taxatus fuerit valor 3, & litterę *r*, valor 2; erit characteris *ar* vniprimę, valor 6, productus multiplicationis 3 per 2: erit deinde characteris *a2*, valor 9; & characteris *a2r* biprimę, valor 18: item characteris *r2*, valor erit 4; & characteris *ar2* vnifecundę, valor 12: & sic deinceps.

Itaque sicut Euclides in 2. 8. numerosam triangularem tabulam instituit proportionalium ab vnitate, datisque minimis à numeris, datam inter se rationem habentibus: ita eadem methodo, placuit litteratam triangularem tabulam disponere proportionalium characterum, à data vnitate, propositisque duobus indeterminatis determinabilibus numeris, indeterminatam inter se rationem habentibus. Pro caractere autem vnitatis, litteram *u* collocauimus, in vertice triangularis tabulę, & pro indeterminatis determinabilibus numeris, duas litteras *a*, & *r*.

Ta-



14

Tabula autem proportionalium, est quæ sequitur, à vertice vsque ad decimam extensa  
basim, in qua vndecim censentur proportionales, in eadem ratione *a* ad *r*.

*Tabula Proportionalium.*

| <i>a</i>    | <i>r</i>            |
|-------------|---------------------|
| <i>a</i>    | <i>r</i>            |
| <i>a</i> 2  | <i>a</i> r          |
| <i>a</i> 3  | <i>a</i> 2 <i>r</i> |
| <i>a</i> 4  | <i>a</i> 3 <i>r</i> |
| <i>a</i> 5  | <i>a</i> 4 <i>r</i> |
| <i>a</i> 6  | <i>a</i> 5 <i>r</i> |
| <i>a</i> 7  | <i>a</i> 6 <i>r</i> |
| <i>a</i> 8  | <i>a</i> 7 <i>r</i> |
| <i>a</i> 9  | <i>a</i> 8 <i>r</i> |
| <i>a</i> 10 | <i>a</i> 9 <i>r</i> |

In



15  
In quatabula, quoniam litteræ *u*, valor est vnitas: si litteræ *a*, valor fuerit 3; litteræ  
verò *r*, valor 2: reliquorum characterum valores ordinantur similiter in simili tabula,  
quàm præcipit Euclides in præcitata prop. 2. 8. Elem.

*Tabula Proportionalium Eucl. Elem. 2. 8.*

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.                                                                     |  |
| 2. 3.                                                                  |  |
| 4. 6. 9.                                                               |  |
| 8. 12. 18. 24.                                                         |  |
| 16. 24. 36. 54. 81.                                                    |  |
| 32. 48. 72. 108. 162. 243.                                             |  |
| 64. 96. 144. 216. 324. 486. 729.                                       |  |
| 128. 192. 288. 432. 648. 972. 1458. 2187.                              |  |
| 256. 384. 576. 864. 1296. 1944. 2916. 4374. 6561.                      |  |
| 512. 768. 1152. 1728. 2592. 3888. 5832. 8748. 13122. 19683.            |  |
| 1024. 1536. 2304. 3456. 5184. 7776. 11664. 17496. 26244. 39366. 59049. |  |

Pla-



Placuit demum ijsdem Analystis, ex numero indeterminato, & determinabili (siue potestate, siue ex potestatibus producto) & ex determinato numero, per multiplicationem factum productum indeterminatum pariter atque determinabilem, eodem producentis caractere significari, præscripto numero multiplicationis. vt  $3a^2r$ , triplum productum sub secunda potestate numeri  $a$ , & sub prima numeri  $r$ ; vel triplam biprimam: &  $10a^2r^3$ , decuplum productum sub secunda potestate numeri  $a$ , & sub tertia numeri  $r$ ; vel decuplam bitertiam. & sic de reliquis.

Præter tabulam proportionalium prædictam, oportet aliam tabulam triangularem habere in promptu, quam Analystæ vocant, multiplicium tabulam: in qua vnitates in vertice ordinantur, & in lateribus; in area verò numeri, quorum vnusquisque inferioris basis numerus, duorum, sibi, quasi cornua fronti, adiacentium superioris basis numerorum est aggregatum: vt ex ipsius tabulæ patebit lectura; quam exponimus extensam, à vertice vsque ad decimam basim.



*Ta.*







## Totarum

Prima

Secunda

Tertia

Quarta

Quinta

Sexta

Septima

Octava

Nonæ

Decima

## Tabula

+r:

$$a^2 + 2ar + r^2$$

$$a^3 + 3a^2r + 3ar^2 + r^3$$

$$a^4 + 4a^3r + 6a^2r^2 + 4ar^3 + r^4$$

$$a^5 + 5a^4r + 10a^3r^2 + 10a^2r^3 + 5ar^4 + r^5$$

$$a^6 + 6a^5r + 15a^4r^2 + 20a^3r^3 + 15a^2r^4 + 6ar^5 + r^6$$

$$a^7 + 7a^6r + 21a^5r^2 + 35a^4r^3 + 35a^3r^4 + 21a^2r^5 + 7ar^6 + r^7$$

$$a^8 + 8a^7r + 28a^6r^2 + 56a^5r^3 + 70a^4r^4 + 56a^3r^5 + 28a^2r^6 + 8ar^7 + r^8$$

$$a^9 + 9a^8r + 36a^7r^2 + 84a^6r^3 + 126a^5r^4 + 126a^4r^5 + 84a^3r^6 + 36a^2r^7 + 9ar^8 + r^9$$

$$a^{10} + 10a^9r + 45a^8r^2 + 120a^7r^3 + 210a^6r^4 + 252a^5r^5 + 210a^4r^6 + 120a^3r^7 + 45a^2r^8 + 10ar^9 + r^{10}$$

Dicitur autem binomius numerus, cuius non vna tota quantitas nominatur, sed eius duarum partium quantitates totum integrè componentium. vt numerus quinaris, tunc binomius dicetur, cum à binario, atque ternario copulatis eius partibus denominabitur, quasi duo habens nomina. Characterem autem binomij numeri placuit ex characteribus duarum partium componi, crucicula interueniente, quæ signum est additionis. vt  $2+3$ , valet perinde atque  $5$ . Similiter si duæ partes totum binomium componentes fuerint numeri indeterminati  $a, r$ : totus binomius caractere significabitur ex vtrisque composito, interueniente crucicula, vt  $a+r$ .

Itaque sicut  $a+r$ , prima sui ipsius potestas, ex nominibus componitur in prima basi tabulæ nominum iacentibus; ita secunda potestas eiusdem binomij  $a+r$ , ex nomi-



## Formulae Tominum.

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| $1+r:$                                                     | t   |
| $a_2+ar+r_2:$                                              | t2  |
| $+3a_1+3ar_2+r_3:$                                         | t3  |
| $+4a_2+12r_2+4ar_3+r_4:$                                   | t4  |
| $+10a_1+10ar_3+5ar_4+r_5:$                                 | t5  |
| $4r_2+a_3r_3+15a_2r_4+6ar_5+r_6:$                          | t6  |
| $+35a_3+35a_3r_4+21a_2r_5+7ar_6+r_7:$                      | t7  |
| $15r_3+10a_4r_4+56a_3r_5+28a_2r_6+8ar_7+r_8:$              | t8  |
| $126a_1+126a_4r_5+84a_3r_6+36a_2r_7+9ar_8+r_9:$            | t9  |
| $174+21a_5r_5+210a_4r_6+120a_3r_7+45a_2r_8+10ar_9+r_{10}.$ | t10 |

nibus componitur, in secunda basi iacentibus,  $a_2+2ar+r_2$ ; tertia, ex nominibus, in tertia basi,  $a_3+3a_2r+3ar_2+r_3$ ; quarta, ex nominibus in quarta basi,  $a_4+4a_3r+6a_2r_2+4ar_3+r_4$ : & sic deinceps reliquæ potestates, ex nominibus in reliquis basibus componuntur.

Huc innumerabilia spectant theoremata huiusmodi. Si totus numerus diuisus fuerit utcumque in duos numeros, abscissum, & residuum: secunda potestas totius componitur, ex secunda potestate abscissi; duplo producto sub abscisso & residuo, idest dupla vniprima; & secunda potestate residui. tertia potestas totius componitur, ex tertia potestate abscissi; triplo producto sub secunda potestate abscissi, & prima residui, idest tripla biprima; triplo sub prima abscissi, & secunda residui, idest tripla vnifecunda; & ex potestate tertia residui. quarta potestas totius componitur



nitur ex quarta potestate abscissi; quadruplo producto sub  
 tertia abscissi, & prima residui, idest quadrupla triprima;  
 sexcuplo sub secundis potestatibus abscissi, & residui, idest  
 fescupla bifecunda; quadruplo sub prima potestate abscis-  
 si, atque tertia residui, idest quadrupla vnitertia; & ex quar-  
 ta potestate residui. aliaque deinceps, quorum præstat  
 characteres oculis percurrere, quàm voces legere, quibus  
 ipsa possent exponi.

*Potestates binomij  $a+r$ .*

*Prima  $a+r$ .*

*Secunda  $a^2+2ar+r^2$ .*

*Tertia  $a^3+3a^2r+3ar^2+r^3$ .*

*Quarta  $a^4+4a^3r+6a^2r^2+4ar^3+r^4$ .*

*Quinta  $a^5+5a^4r+10a^3r^2+10a^2r^3+5ar^4+r^5$ .*

*Sexta  $a^6+6a^5r+15a^4r^2+20a^3r^3+15a^2r^4+6ar^5$   
 $+r^6$ .*

*Septima  $a^7+7a^6r+21a^5r^2+35a^4r^3+35a^3r^4$   
 $+21a^2r^5+7ar^6+r^7$ .*

*Octava  $a^8+8a^7r+28a^6r^2+56a^5r^3+70a^4r^4+56a^3r^5$   
 $+28a^2r^6+8ar^7+r^8$ .*

*Nona  $a^9+9a^8r+36a^7r^2+84a^6r^3+126a^5r^4+126$   
 $a^4r^5+84a^3r^6+36a^2r^7+9ar^8+r^9$ .*

*Decima  $a^{10}+10a^9r+45a^8r^2+120a^7r^3+210a^6r^4$   
 $+252a^5r^5+210a^4r^6+120a^3r^7+45a^2r^8+10ar^9$   
 $+r^{10}$ .*

Quæ theorematà facile demonstrabuntur per inductio-  
 nem, determinato cuiusque litteræ valore.

Esto



Esto litteræ  $a$ , valor 2.  
 litteræ  $r$ , valor 3.  
 ideoque characteris  $a+r$ , valor 5.

---

|         |    |
|---------|----|
| $a2$ :  | 4  |
| $2ar$ : | 12 |
| $r2$ :  | 9  |

---

Secunda potestas à 5 : 25

---

|          |    |
|----------|----|
| $a3$ :   | 8  |
| $3a2r$ : | 36 |
| $3ar2$ : | 54 |
| $r3$ :   | 27 |

---

Tertia potestas à 5 : 125

---

|           |     |
|-----------|-----|
| $a4$ :    | 16  |
| $4a3r$ :  | 96  |
| $6a2r2$ : | 216 |
| $4ar3$ :  | 216 |
| $r4$ :    | 81  |

---

Quarta potestas à 5 : 625

Residuus dicitur numerus, qui duorum inæqualium numerorum, relinquitur, à maiore, minore subtracto; à quibus denominatur. vt numerus binarius, tunc residuus dicitur

d

tur



tur, cum à quinario, ternario dempto, relictus fuerit; & à quinario atque ternario denominatus. Characterem autem residui numeri, placuit, ex characteribus totius & abscissi denotari, à quibus denominatur, lineola, interueniente, quæ signum est subtractionis posterioris characteris à priore. vt  $5---3$ , valet perinde atque 2. Similiter si duo numeri, à quibus residuus denominatur, fuerint indeterminati,  $t$  maior,  $a$  minor, residuus caractere significabitur ex vtrisque  $t---a$ .

Itaque sicut  $t---a$ , prima sui ipsius potestas, fit ex nominibus  $t, a$ , in prima basi tabulæ nominum iacentibus; ita secunda potestas eiusdem residui  $t---a$ , fit ex nominibus in secunda basi, alternatim additis, & subtractis,  $t^2---2ta+a^2$ ; tertia, ex nominibus, in tertia basi  $t^3---3t^2a+3ta^2---a^3$ ; quarta, ex nominibus, in quarta basi  $t^4---4t^3a+6t^2a^2---4ta^3+a^4$ : & reliquæ deinceps potestates, fiunt similiter ex nominibus, in reliquis deinceps basibus iacentibus.

Huc pariter innumerabilia pertinent huiusmodi theoremata. Si à toto quodam maiore numero, quisque minor numerus abscissus fuerit: residui secunda potestas relinquitur, ex secunda potestate totius; dempto duplo producto sub toto & abscisso, idest, dempta dupla vni prima; addita secunda potestate abscissi: tertia potestas residui, relinquitur, ex tertia potestate totius; dempto triplo producto sub secunda potestate totius & sub prima abscissi, idest dempta tripla biprima; addito triplo producto sub prima  
totius



totius & sub secunda abscissi, idest addita tripla vnitecunda; dempta tertia potestate abscissi: quarta residui, relinquitur, ex quarta totius; dempto quadruplo producto sub tertia totius, & sub prima abscissi, idest, dempta quadrupla triprima; addito sexcuplo producto sub secundis potestatibus totius & abscissi, idest, addita sexcupla biseconda; dempto quadruplo producto sub prima totius, & sub tertia abscissi, idest dempta quadrupla vnitertia; addita quarta abscissi. aliaque similia, quorum præstat characteres oculis intueri, quàm voces legere.

*Potestates residui t --- a.*

*Prima*  $t --- a.$

*Secunda*  $t2 --- 2ta + a2.$

*Tertia*  $t3 --- 3t2a + 3ta2 --- a3.$

*Quarta*  $t4 --- 4t3a + 6t2a2 --- 4ta3 + a4.$

*Quinta*  $t5 --- 5t4a + 10t3a2 --- 10t2a3 + 5ta4 --- a5.$

*Sexta*  $t6 --- 6t5a + 15t4a2 --- 20t3a3 + 15t2a4 --- 6ta5 + a6.$

*Septima*  $t7 --- 7t6a + 21t5a2 --- 35t4a3 + 35t3a4 --- 21t2a5 + 7ta6 --- a7.$

*Octaua*  $t8 --- 8t7a + 28t6a2 --- 56t5a3 + 70t4a4 --- 56t3a5 + 28t2a6 --- 8ta7 + a8.$

*Nona*  $t9 --- 9t8a + 36t7a2 --- 84t6a3 + 126t5a4 --- 126t4a5 + 84t3a6 --- 36t2a7 + 9ta8 --- a9.$

*Decima*  $t10 --- 10t9a + 45t8a2 --- 120t7a3 + 210t6a4 --- 252t5a5 + 210t4a6 --- 120t3a7 + 45t2a8 --- 10ta9 + a10.$

d 2

Quæ



24

Quæ similiter demonstrabuntur facile per inductionem, determinato cuiusque litteræ valore.

Estō litteræ  $t$ , valor 5.  
 litteræ  $a$  valor 3.  
 ideoque characteris  $t-a$ , valor 2.

---

|       |    |        |    |
|-------|----|--------|----|
| $t2:$ | 25 | $2ta:$ | 30 |
| $a2:$ | 9  |        |    |

---

34  
 30

---

Secunda potestas à 2: 4

---

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| $t3:$   | 125 | $3ta:$ | 225 |
| $3ta2:$ | 135 | $a3:$  | 27  |

---

260  
 252

---

Tertia potestas à 2: 8

---

|         |      |         |      |
|---------|------|---------|------|
| $t4:$   | 625  | $4ta:$  | 1500 |
| $6ta2:$ | 1350 | $4ta3:$ | 540  |
| $a4:$   | 81   |         |      |

---

2056  
 2040

---

Quarta potestas à 2: 16

---

Si-



Similibus exemplis potest confirmari, tota constructionis potestatum ars, à binomijs, & residuis: quàm pro quantitibus omnifariam, in primo nostro elemento plenius ostendimus.

Capit. 2.

Secundum, pro secundo est elemento: multifariam progressuorum regulares collectiones; in quibus præcipua nostri inuenti pars est. Accipiat quilibet numerus, cuius abscindantur ordinatim vnitas, binarius, ternarius, & deinceps quicunque numeri possunt abscindi, vt vel numerus, vel saltem vnitas relinquatur: & residui vsque ad vnitatem, totidem saluentur, quot abscissi, singuli residui è regione suorum abscissorum.

Placuit autem acceptum numerum vocare quantitatem totam, & significare littera *t*: eiusque potestates vocare totas; *t2*, totam secundam; *t3*, totam tertiam; *t4* totam quartam; & sic deinceps. placuit etiam acceptos abscissos vocare quantitates abscissas, & significare littera *a*: item abscissorum potestates, vocare abscissas; *a2*, abscissam secundam; *a3*, abscissam tertiam; *a4*, abscissam quartam; & deinceps: residuos quoque placuit vocare, quantitates residuas, & significare littera *r*: item residuorum potestates, vocare residuas; *r2*, residuam secundam; *r3*, residuam tertiam; *r4*, residuam quartam; & deinceps. denique sub potestatibus cuiusque abscissæ, & suæ residuæ, placuit productos denominare vt supra, *ar* vniprimas, *a2r* biprimas, *ar2* vnifecundas, *a3r* triprimas, *a2r2* bifecundas



secundas, ar<sup>3</sup> vnitertias, & sic deinceps.

Sed ecce tabula, in qua cuiusque numeri ab vnitatem usque primùm ad 7. deinde usque ad 10. pro vnaqualibet abscissa, scripta est è regione residua, & abscissa secunda, & vniprima, & residua secunda, & abscissa tertia, & biprima, & vnifecunda, & residua tertia, & sic deinceps usque ad proportionales in decima basi tabulæ proportionalium iacentes.





| $t$ | $a$ | $r$ | $a2$ | $ar$ | $r2$ | $a3$ | $a2r$ |
|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| 2   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     |
| 3   | 1   | 2   | 1    | 2    | 4    | 1    | 2     |
|     | 2   | 1   | 4    | 2    | 1    | 8    | 4     |
| 4   | 1   | 3   | 1    | 3    | 9    | 1    | 3     |
|     | 2   | 2   | 4    | 4    | 4    | 8    | 8     |
|     | 3   | 1   | 9    | 3    | 1    | 27   | 9     |
| 5   | 1   | 4   | 1    | 4    | 16   | 1    | 4     |
|     | 2   | 3   | 4    | 6    | 9    | 8    | 12    |
|     | 3   | 2   | 9    | 6    | 4    | 27   | 18    |
|     | 4   | 1   | 16   | 4    | 1    | 64   | 16    |
| 6   | 1   | 5   | 1    | 5    | 25   | 1    | 5     |
|     | 2   | 4   | 4    | 8    | 16   | 8    | 16    |
|     | 3   | 3   | 9    | 9    | 9    | 27   | 27    |
|     | 4   | 2   | 16   | 8    | 4    | 64   | 32    |
|     | 5   | 1   | 25   | 5    | 1    | 125  | 25    |
| 7   | 1   | 6   | 1    | 6    | 36   | 1    | 6     |
|     | 2   | 5   | 4    | 10   | 25   | 8    | 20    |
|     | 3   | 4   | 9    | 12   | 16   | 27   | 36    |
|     | 4   | 3   | 16   | 12   | 9    | 64   | 48    |
|     | 5   | 2   | 25   | 10   | 4    | 125  | 50    |
|     | 6   | 1   | 36   | 6    | 1    | 216  | 36    |

ar 2



| <i>t</i> | <i>ar2</i> | <i>r3</i> | <i>a4</i> | <i>a3r</i> | <i>a2r2</i> | <i>ar3</i> |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 2        | 1          | 1         | 1         | 1          | 1           | 1          |
| 3        | 4          | 8         | 1         | 2          | 4           | 8          |
|          | 2          | 1         | 16        | 8          | 4           | 2          |
| 4        | 9          | 27        | 1         | 3          | 9           | 27         |
|          | 8          | 8         | 16        | 16         | 16          | 16         |
|          | 3          | 1         | 81        | 27         | 9           | 3          |
| 5        | 16         | 64        | 1         | 4          | 16          | 64         |
|          | 18         | 27        | 16        | 24         | 36          | 54         |
|          | 12         | 8         | 81        | 54         | 36          | 24         |
|          | 4          | 1         | 256       | 64         | 16          | 4          |
| 6        | 25         | 125       | 1         | 5          | 25          | 125        |
|          | 32         | 64        | 16        | 32         | 64          | 128        |
|          | 27         | 27        | 81        | 81         | 81          | 81         |
|          | 16         | 8         | 256       | 128        | 64          | 32         |
|          | 5          | 1         | 625       | 125        | 25          | 5          |
| 7        | 36         | 216       | 1         | 6          | 36          | 216        |
|          | 50         | 125       | 16        | 40         | 100         | 250        |
|          | 48         | 64        | 81        | 108        | 144         | 192        |
|          | 36         | 27        | 256       | 192        | 144         | 108        |
|          | 20         | 8         | 625       | 250        | 100         | 40         |
|          | 6          | 1         | 1296      | 216        | 36          | 6          |



| $t$ | $r4$                                | $a5$                                   | $a4r$                                 | $a3r2$                                | $a2r3$                                | $ar4$                                 |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2   | I                                   | I                                      | I                                     | I                                     | I                                     | I                                     |
| 3   | 16<br>I                             | I<br>32                                | 2<br>16                               | 4<br>8                                | 8<br>4                                | 16<br>2                               |
| 4   | 81<br>16<br>I                       | I<br>32<br>243                         | 3<br>32<br>81                         | 9<br>32<br>27                         | 27<br>32<br>9                         | 81<br>32<br>3                         |
| 5   | 256<br>81<br>16<br>I                | I<br>32<br>243<br>1024                 | 4<br>48<br>162<br>256                 | 16<br>72<br>108<br>64                 | 64<br>108<br>72<br>16                 | 256<br>162<br>48<br>4                 |
| 6   | 625<br>256<br>81<br>16<br>I         | I<br>32<br>243<br>1024<br>3125         | 5<br>64<br>243<br>512<br>625          | 25<br>128<br>243<br>256<br>125        | 125<br>256<br>243<br>128<br>25        | 625<br>512<br>243<br>64<br>5          |
| 7   | 1296<br>625<br>256<br>81<br>16<br>I | I<br>32<br>243<br>1024<br>3125<br>7776 | 6<br>80<br>324<br>768<br>1250<br>1296 | 36<br>200<br>432<br>576<br>500<br>216 | 216<br>500<br>576<br>432<br>200<br>36 | 1296<br>1250<br>768<br>324<br>80<br>6 |



| t | r5                                                 | a6                                       | a5r                                     | a4r2                                      | a3r3                                       |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2 | I                                                  | I                                        | I                                       | I                                         | I                                          |
| 3 | 3 <sup>2</sup><br>I                                | I<br>64                                  | 2<br>32                                 | 4<br>16                                   | 8<br>8                                     |
| 4 | 243<br>3 <sup>2</sup><br>I                         | I<br>64<br>729                           | 3<br>64<br>243                          | 9<br>64<br>81                             | 27<br>64<br>27                             |
| 5 | 1024<br>243<br>3 <sup>2</sup><br>I                 | I<br>64<br>729<br>4096                   | 4<br>96<br>486<br>1024                  | 16<br>144<br>324<br>256                   | 64<br>216<br>216<br>64                     |
| 6 | 3125<br>1024<br>243<br>3 <sup>2</sup><br>I         | I<br>64<br>729<br>4096<br>15625          | 5<br>128<br>729<br>2048<br>3125         | 25<br>256<br>729<br>1024<br>625           | 125<br>512<br>729<br>512<br>125            |
| 7 | 7776<br>3125<br>1024<br>243<br>3 <sup>2</sup><br>I | I<br>64<br>729<br>4096<br>15625<br>46656 | 6<br>160<br>972<br>3072<br>6250<br>7776 | 36<br>400<br>1296<br>2304<br>2500<br>1296 | 216<br>1000<br>1728<br>1728<br>1000<br>216 |

a2r4



| <i>r</i> | <i>a2r4</i>                               | <i>ar5</i>                              | <i>r6</i>                                | <i>a7</i>                                    | <i>a6r</i>                                  |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2        | I                                         | I                                       | I                                        | I                                            | I                                           |
| 3        | 16<br>4                                   | 32<br>2                                 | 64<br>1                                  | I<br>128                                     | 2<br>64                                     |
| 4        | 81<br>64<br>9                             | 243<br>64<br>3                          | 729<br>64<br>1                           | I<br>128<br>2187                             | 3<br>128<br>729                             |
| 5        | 256<br>324<br>144<br>16                   | 1024<br>486<br>96<br>4                  | 4096<br>729<br>64<br>1                   | I<br>128<br>2187<br>16384                    | 4<br>192<br>1458<br>4096                    |
| 6        | 625<br>1024<br>729<br>256<br>25           | 3125<br>2048<br>729<br>128<br>5         | 15625<br>4096<br>729<br>64<br>1          | I<br>128<br>2187<br>16384<br>78125           | 5<br>256<br>2187<br>8192<br>15625           |
| 7        | 1296<br>2500<br>2304<br>1296<br>400<br>36 | 7776<br>6250<br>3072<br>972<br>160<br>6 | 46656<br>15625<br>4096<br>729<br>64<br>1 | I<br>128<br>2187<br>16384<br>78125<br>279936 | 6<br>320<br>2916<br>12288<br>31250<br>46656 |

e 2

a5r2



| t | a5r2                                       | a4r3                                        | a3r4                                        | a2r5                                       | ar6                                         |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2 | I                                          | I                                           | I                                           | I                                          | I                                           |
| 3 | 4<br>32                                    | 8<br>16                                     | 16<br>8                                     | 32<br>4                                    | 64<br>2                                     |
| 4 | 9<br>128<br>243                            | 27<br>128<br>81                             | 81<br>128<br>27                             | 243<br>128<br>9                            | 729<br>128<br>3                             |
| 5 | 16<br>288<br>972<br>1024                   | 64<br>432<br>648<br>256                     | 256<br>648<br>432<br>64                     | 1024<br>972<br>288<br>16                   | 4096<br>1458<br>192<br>4                    |
| 6 | 25<br>512<br>2187<br>4096<br>3125          | 125<br>1024<br>2187<br>2048<br>625          | 625<br>2048<br>2187<br>1024<br>125          | 3125<br>4096<br>2187<br>512<br>25          | 15625<br>8192<br>2187<br>256<br>5           |
| 7 | 36<br>800<br>3888<br>9216<br>12500<br>7776 | 216<br>2000<br>5184<br>6912<br>5000<br>1296 | 1296<br>5000<br>6912<br>5184<br>2000<br>216 | 7776<br>12500<br>9216<br>3888<br>800<br>36 | 46656<br>31250<br>12288<br>2916<br>320<br>6 |



| <i>r</i> | <i>r7</i>                                    | <i>a8</i>                                      | <i>a7r</i>                                    | <i>a6r2</i>                                    | <i>a5r3</i>                                    |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | I                                            | I                                              | I                                             | I                                              | I                                              |
| 3        | 128<br>I                                     | I<br>256                                       | 2<br>128                                      | 4<br>64                                        | 8<br>32                                        |
| 4        | 2187<br>128<br>I                             | I<br>256<br>6561                               | 3<br>256<br>2187                              | 9<br>526<br>729                                | 27<br>256<br>243                               |
| 5        | 16384<br>2187<br>128<br>I                    | I<br>256<br>6561<br>65536                      | 4<br>384<br>4374<br>16384                     | 16<br>576<br>2916<br>4096                      | 64<br>864<br>1944<br>1024                      |
| 6        | 78125<br>16384<br>2187<br>128<br>I           | I<br>256<br>6561<br>65536<br>390625            | 5<br>512<br>6561<br>32768<br>78125            | 25<br>1024<br>6561<br>16384<br>15625           | 125<br>2048<br>6561<br>8192<br>3125            |
| 7        | 279936<br>78125<br>16384<br>2187<br>128<br>I | I<br>256<br>6561<br>65536<br>390625<br>1679616 | 6<br>640<br>8748<br>49152<br>156250<br>279936 | 36<br>1600<br>11664<br>36864<br>62500<br>46656 | 216<br>4000<br>15552<br>27648<br>25000<br>7776 |

a4r4



|   | a4r4                                             | a3r5                                           | a2r6                                           | ar7                                           | r8                                             |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2 | I                                                | I                                              | I                                              | I                                             | I                                              |
| 3 | 16<br>16                                         | 32<br>8                                        | 64<br>4                                        | 128<br>2                                      | 256<br>I                                       |
| 4 | 81<br>256<br>81                                  | 243<br>256<br>27                               | 729<br>256<br>9                                | 2187<br>256<br>3                              | 6561<br>256<br>I                               |
| 5 | 256<br>1296<br>1296<br>256                       | 1024<br>1944<br>864<br>64                      | 4096<br>2916<br>576<br>16                      | 16384<br>4374<br>384<br>4                     | 65536<br>6561<br>256<br>I                      |
| 6 | 625<br>4096<br>6561<br>4096<br>625               | 3125<br>8192<br>6561<br>2048<br>125            | 15625<br>16384<br>6561<br>1024<br>25           | 78125<br>32768<br>6561<br>512<br>5            | 390625<br>65536<br>6561<br>256<br>I            |
| 7 | 1296<br>10000<br>20736<br>20736<br>10000<br>1296 | 7776<br>25000<br>27648<br>15552<br>4000<br>216 | 46656<br>62500<br>36864<br>11664<br>1600<br>36 | 279936<br>156250<br>49152<br>8748<br>640<br>6 | 1679616<br>390625<br>65536<br>6561<br>256<br>I |



|   | <i>a9</i>                                          | <i>a8r</i>                                        | <i>a7r2</i>                                       | <i>a6r3</i>                                       |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2 | I                                                  | I                                                 | I                                                 | I                                                 |
| 3 | 8 I<br>512                                         | 2<br>256                                          | 4<br>128                                          | 8<br>64                                           |
| 4 | I<br>512<br>19683                                  | 3<br>512<br>6561                                  | 9<br>512<br>2187                                  | 27<br>512<br>729                                  |
| 5 | I<br>512<br>19683<br>262144                        | 4<br>768<br>13122<br>65536                        | 16<br>1152<br>8748<br>16384                       | 64<br>1728<br>5832<br>4096                        |
| 6 | I<br>512<br>19683<br>262144<br>1953125             | 5<br>1024<br>19683<br>131072<br>390625            | 25<br>2048<br>19683<br>65536<br>78125             | 125<br>4096<br>19683<br>32768<br>15625            |
| 7 | I<br>512<br>19683<br>262144<br>1953125<br>10077696 | 6<br>1280<br>26244<br>196608<br>781250<br>1679616 | 36<br>3200<br>34992<br>147456<br>312500<br>279936 | 216<br>8000<br>46656<br>110592<br>125000<br>46656 |

*a5r4*



|   | <i>a5r4</i>                                      | <i>a4r5</i>                                      | <i>a3r6</i>                                       | <i>a2r7</i>                                       | <i>ar8</i>                                        |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2 | I                                                | I                                                | I                                                 | I                                                 | I                                                 |
| 3 | 16<br>32                                         | 32<br>16                                         | 64<br>8                                           | 128<br>4                                          | 256<br>2                                          |
| 4 | 81<br>512<br>243                                 | 243<br>512<br>81                                 | 729<br>512<br>27                                  | 2187<br>512<br>9                                  | 6561<br>512<br>3                                  |
| 5 | 256<br>2592<br>3888<br>1024                      | 1024<br>3888<br>2592<br>256                      | 4096<br>5832<br>1728<br>64                        | 16384<br>8748<br>1152<br>16                       | 65536<br>13122<br>768<br>4                        |
| 6 | 625<br>8192<br>19683<br>16384<br>3125            | 3125<br>16384<br>19683<br>8192<br>625            | 15625<br>32768<br>19683<br>4096<br>125            | 78125<br>65536<br>19683<br>2048<br>25             | 390625<br>131072<br>19683<br>1024<br>5            |
| 7 | 1296<br>20000<br>62208<br>82944<br>50000<br>7776 | 7776<br>50000<br>82944<br>62208<br>20000<br>1296 | 46656<br>125000<br>110592<br>46656<br>8000<br>216 | 279936<br>312500<br>147456<br>34992<br>3200<br>36 | 1679616<br>781250<br>196608<br>26244<br>1280<br>6 |



| f | r9                                                 | a10                                                  | a9r                                                 | a8r2                                                 |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2 | I                                                  | I                                                    | I                                                   | I                                                    |
| 3 | 512<br>I                                           | I<br>1024                                            | 2<br>512                                            | 4<br>256                                             |
| 4 | 19683<br>512<br>I                                  | I<br>1024<br>59049                                   | 3<br>1024<br>19683                                  | 9<br>1024<br>6561                                    |
| 5 | 262144<br>19683<br>512<br>I                        | I<br>1024<br>59049<br>1048576                        | 4<br>1536<br>39366<br>262144                        | 16<br>2304<br>26244<br>65536                         |
| 6 | 1953125<br>262144<br>19683<br>512<br>I             | I<br>1024<br>59049<br>1048576<br>9765625             | 5<br>2048<br>59049<br>524288<br>1953125             | 25<br>4096<br>59049<br>262144<br>390625              |
| 7 | 10077696<br>1953125<br>262144<br>19683<br>512<br>I | I<br>1024<br>59049<br>1048576<br>9765625<br>60466176 | 6<br>2560<br>78732<br>786432<br>3906250<br>10076696 | 36<br>6400<br>104976<br>589824<br>1562500<br>1679616 |

f

a7r2



| <i>t</i> | <i>a7r3</i>                                          | <i>a6r4</i>                                          | <i>a5r5</i>                                         | <i>a46r</i>                                          |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2        | I                                                    | I                                                    | I                                                   | I                                                    |
| 3        | 8<br>128                                             | 16<br>64                                             | 32<br>32                                            | 64<br>16                                             |
| 4        | 27<br>1024<br>2187                                   | 81<br>1024<br>729                                    | 243<br>1024<br>243                                  | 729<br>1024<br>81                                    |
| 5        | 64<br>3456<br>17496<br>16384                         | 256<br>5184<br>11664<br>4096                         | 1024<br>7776<br>7776<br>1024                        | 4096<br>11664<br>5184<br>256                         |
| 6        | 125<br>8192<br>59049<br>131072<br>78125              | 625<br>16384<br>59049<br>65536<br>15625              | 3125<br>32768<br>59049<br>32768<br>3125             | 15265<br>65536<br>59049<br>16384<br>625              |
| 7        | 216<br>16000<br>139968<br>442368<br>625000<br>279936 | 1296<br>40000<br>186624<br>331776<br>250000<br>46656 | 7776<br>100000<br>248832<br>24883<br>100000<br>7776 | 46656<br>250000<br>331776<br>186624<br>40000<br>1296 |

*a3r7*



| <i>t</i> | <i>4377</i>                                          | <i>4278</i>                                          | <i>479</i>                                          | <i>710</i>                                           |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2        | I                                                    | I                                                    | I                                                   | I                                                    |
| 3        | 128<br>8                                             | 256<br>4                                             | 512<br>2                                            | 1024<br>I                                            |
| 4        | 2187<br>1024<br>27                                   | 6561<br>1024<br>9                                    | 19683<br>1024<br>3                                  | 59049<br>1024<br>I                                   |
| 5        | 16384<br>17496<br>3456<br>64                         | 65536<br>26244<br>2304<br>16                         | 262144<br>39366<br>1536<br>4                        | 1048576<br>59049<br>1024<br>I                        |
| 6        | 78125<br>131072<br>59049<br>8192<br>125              | 390625<br>262144<br>59049<br>4096<br>25              | 1953125<br>524288<br>59049<br>2048<br>5             | 9765625<br>1048576<br>59049<br>1024<br>I             |
| 7        | 279936<br>625000<br>442368<br>139968<br>16000<br>216 | 1679616<br>1562500<br>589824<br>104976<br>6400<br>36 | 10077696<br>3906250<br>786432<br>78732<br>2560<br>6 | 60466176<br>9765625<br>1048576<br>59049<br>1024<br>I |

f 2

Sequitur Ta-



40

## Sequitur Tabula pro numeris 8, 9, &amp; 10.

| t  | a | r | a <sub>2</sub> | ar | r <sub>2</sub> | a <sub>3</sub> | a <sub>2</sub> r |
|----|---|---|----------------|----|----------------|----------------|------------------|
| 8  | 1 | 7 | 1              | 7  | 49             | 1              | 7                |
|    | 2 | 6 | 4              | 12 | 36             | 8              | 24               |
|    | 3 | 5 | 9              | 15 | 25             | 27             | 45               |
|    | 4 | 4 | 16             | 16 | 16             | 64             | 64               |
|    | 5 | 3 | 25             | 15 | 9              | 125            | 75               |
|    | 6 | 2 | 36             | 12 | 4              | 216            | 72               |
|    | 7 | 1 | 49             | 7  | 1              | 343            | 49               |
| 9  | 1 | 8 | 1              | 8  | 64             | 1              | 8                |
|    | 2 | 7 | 4              | 14 | 49             | 8              | 28               |
|    | 3 | 6 | 9              | 18 | 36             | 27             | 54               |
|    | 4 | 5 | 16             | 20 | 25             | 64             | 80               |
|    | 5 | 4 | 25             | 20 | 16             | 125            | 100              |
|    | 6 | 3 | 36             | 18 | 9              | 216            | 108              |
|    | 7 | 2 | 49             | 14 | 4              | 343            | 98               |
| 10 | 8 | 1 | 64             | 8  | 1              | 512            | 64               |
|    | 1 | 9 | 1              | 9  | 81             | 1              | 9                |
|    | 2 | 8 | 4              | 16 | 64             | 8              | 32               |
|    | 3 | 7 | 9              | 21 | 49             | 27             | 63               |
|    | 4 | 6 | 16             | 24 | 36             | 64             | 96               |
|    | 5 | 5 | 25             | 25 | 25             | 125            | 125              |
|    | 6 | 4 | 36             | 24 | 16             | 216            | 144              |
|    | 7 | 3 | 49             | 21 | 9              | 343            | 147              |
|    | 8 | 2 | 64             | 16 | 4              | 512            | 128              |
|    | 9 | 1 | 81             | 9  | 1              | 729            | 81               |

ar



| 41  |        |       |       |        |          |        |
|-----|--------|-------|-------|--------|----------|--------|
| $t$ | $ar_2$ | $r_3$ | $a_4$ | $a_3r$ | $a^2r_2$ | $ar_3$ |
| 8   | 49     | 343   | 1     | 7      | 49       | 343    |
|     | 72     | 216   | 16    | 48     | 144      | 432    |
|     | 75     | 125   | 81    | 135    | 225      | 375    |
|     | 64     | 64    | 256   | 256    | 256      | 256    |
|     | 45     | 27    | 625   | 375    | 225      | 135    |
|     | 24     | 8     | 1296  | 432    | 144      | 48     |
|     | 7      | 1     | 2401  | 343    | 49       | 7      |
| 9   | 64     | 512   | 1     | 8      | 64       | 512    |
|     | 98     | 343   | 16    | 56     | 196      | 686    |
|     | 108    | 216   | 81    | 162    | 324      | 68     |
|     | 100    | 125   | 256   | 320    | 400      | 500    |
|     | 80     | 64    | 625   | 500    | 400      | 320    |
|     | 54     | 27    | 1296  | 648    | 324      | 162    |
|     | 28     | 8     | 2401  | 686    | 196      | 56     |
|     | 8      | 1     | 4096  | 512    | 64       | 8      |
| 10  | 81     | 729   | 1     | 9      | 81       | 729    |
|     | 128    | 512   | 16    | 64     | 256      | 1024   |
|     | 147    | 343   | 81    | 189    | 441      | 1029   |
|     | 144    | 216   | 256   | 384    | 576      | 864    |
|     | 125    | 125   | 625   | 625    | 625      | 625    |
|     | 96     | 64    | 1296  | 864    | 576      | 384    |
|     | 63     | 27    | 2401  | 1029   | 441      | 189    |
|     | 32     | 8     | 4096  | 1024   | 256      | 64     |
|     | 9      | 1     | 6561  | 729    | 81       | 9      |



$4^2$

| $t$ | $r_4$ | $a_5$ | $a_4r$ | $a_3r^2$ | $a_2r^3$ | $a_1r^4$ |
|-----|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| 8   | 2401  | 1     | 7      | 49       | 343      | 2401     |
|     | 1296  | 32    | 96     | 288      | 864      | 2592     |
|     | 625   | 243   | 405    | 675      | 1125     | 1875     |
|     | 256   | 1024  | 1024   | 1024     | 1024     | 1024     |
|     | 81    | 3125  | 1875   | 1125     | 675      | 405      |
|     | 16    | 7776  | 2592   | 864      | 288      | 96       |
|     | 1     | 16807 | 2401   | 343      | 49       | 7        |
| 9   | 4096  | 1     | 8      | 64       | 512      | 4096     |
|     | 2401  | 32    | 112    | 392      | 1372     | 4802     |
|     | 1296  | 243   | 486    | 972      | 1944     | 3888     |
|     | 625   | 1024  | 1280   | 1600     | 2000     | 2500     |
|     | 256   | 3125  | 2500   | 2000     | 1600     | 1280     |
|     | 81    | 7776  | 3888   | 1944     | 972      | 486      |
|     | 16    | 16807 | 4802   | 1372     | 392      | 112      |
|     | 1     | 32768 | 4096   | 512      | 6        | 8        |
| 10  | 6561  | 1     | 9      | 81       | 729      | 6561     |
|     | 4096  | 32    | 128    | 512      | 2048     | 8192     |
|     | 2401  | 243   | 567    | 1323     | 3087     | 7203     |
|     | 1296  | 1024  | 1536   | 2304     | 3456     | 5184     |
|     | 625   | 3125  | 3125   | 3125     | 3125     | 3125     |
|     | 256   | 7776  | 5184   | 3456     | 2304     | 1536     |
|     | 81    | 16807 | 7203   | 3087     | 1323     | 567      |
|     | 16    | 32768 | 8192   | 2048     | 512      | 128      |
|     | 1     | 59049 | 6561   | 729      | 81       | 9        |



|    | r5    | 46     | a5r   | a4r2  | 43<br>a3r3 |
|----|-------|--------|-------|-------|------------|
| 8  | 16807 | I      | 7     | 49    | 343        |
|    | 7776  | 64     | 192   | 576   | 1728       |
|    | 3125  | 729    | 1215  | 2025  | 3375       |
|    | 1024  | 4096   | 4096  | 4096  | 4096       |
|    | 243   | 15625  | 9375  | 5625  | 3375       |
|    | 32    | 46656  | 15552 | 5084  | 1728       |
|    | I     | 117649 | 16807 | 401   | 343        |
| 9  | 32768 | I      | 8     | 64    | 512        |
|    | 16807 | 64     | 224   | 784   | 2744       |
|    | 7776  | 729    | 1458  | 2916  | 5832       |
|    | 3125  | 4096   | 5120  | 6400  | 8000       |
|    | 1024  | 15625  | 12500 | 10000 | 8000       |
|    | 243   | 46656  | 2338  | 11664 | 5832       |
|    | 32    | 117649 | 33614 | 9604  | 2744       |
|    | I     | 262144 | 32768 | 4096  | 512        |
| 10 | 59049 | I      | 9     | 81    | 729        |
|    | 32768 | 64     | 256   | 1024  | 4096       |
|    | 16807 | 729    | 1701  | 3969  | 9261       |
|    | 7776  | 4096   | 6144  | 916   | 13824      |
|    | 3125  | 15625  | 15625 | 15625 | 15625      |
|    | 1024  | 46656  | 31104 | 20736 | 13824      |
|    | 243   | 117649 | 50421 | 21609 | 9261       |
|    | 32    | 262144 | 65536 | 16384 | 4096       |
|    | I     | 531441 | 59049 | 6561  | 729        |

a2r4



| t  | a2r4  | ar5   | r6     | a7      | a6r    |
|----|-------|-------|--------|---------|--------|
| 8  | 2401  | 16807 | 117649 | I       | 7      |
|    | 5084  | 15552 | 46656  | 128     | 384    |
|    | 5625  | 9375  | 15625  | 2187    | 365    |
|    | 4096  | 4096  | 4096   | 16384   | 16384  |
|    | 2025  | 1215  | 729    | 78125   | 46875  |
|    | 576   | 192   | 64     | 279936  | 93312  |
|    | 49    | 7     | I      | 823543  | 117649 |
| 9  | 4096  | 32768 | 262144 | I       | 8      |
|    | 9604  | 33614 | 117649 | 128     | 448    |
|    | 11664 | 23328 | 46656  | 2187    | 437+   |
|    | 10000 | 12500 | 15625  | 16384   | 20180  |
|    | 6400  | 5120  | 4096   | 78125   | 62500  |
|    | 2916  | 1458  | 729    | 279936  | 139968 |
|    | 784   | 224   | 64     | 823543  | 235298 |
|    | 64    | 8     | I      | 2097152 | 262144 |
| 10 | 6561  | 59049 | 531441 | I       | 9      |
|    | 16384 | 65536 | 262144 | 128     | 512    |
|    | 21609 | 50421 | 117649 | 2187    | 5103   |
|    | 20736 | 31104 | 46656  | 16384   | 24576  |
|    | 15625 | 15625 | 15625  | 78125   | 78125  |
|    | 9216  | 6144  | 4096   | 279936  | 186624 |
|    | 3969  | 1701  | 729    | 823543  | 352947 |
|    | 1024  | 256   | 64     | 2097152 | 524288 |
|    | 81    | 9     | I      | 4782969 | 531441 |



|    | 45     |       |       |        |        |         |
|----|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 1  | a5r2   | a4r3  | a3r4  | a2r5   | ar6    | r7      |
| 8  | 49     | 343   | 2401  | 16807  | 117649 | 823543  |
|    | 1152   | 3456  | 10168 | 31104  | 93312  | 279936  |
|    | 6075   | 10125 | 16875 | 28125  | 46875  | 78125   |
|    | 16384  | 16384 | 16384 | 16384  | 16384  | 16384   |
|    | 28125  | 16875 | 10125 | 6075   | 3645   | 2187    |
|    | 31104  | 10168 | 3456  | 1152   | 384    | 128     |
|    | 16807  | 2401  | 343   | 49     | 7      | 1       |
| 9  | 64     | 512   | 4096  | 32768  | 262144 | 2097152 |
|    | 1568   | 5488  | 19208 | 67228  | 235298 | 823543  |
|    | 8748   | 17496 | 34992 | 69984  | 139968 | 279936  |
|    | 25600  | 32000 | 40000 | 50000  | 62500  | 78125   |
|    | 50000  | 40000 | 32000 | 25600  | 20480  | 16384   |
|    | 69984  | 34992 | 17496 | 8748   | 4374   | 2187    |
|    | 67228  | 19208 | 5488  | 1568   | 448    | 128     |
|    | 32768  | 4096  | 512   | 64     | 8      | 1       |
| 10 | 81     | 729   | 6561  | 59049  | 531441 | 4782969 |
|    | 2048   | 8192  | 32768 | 131072 | 524288 | 2097152 |
|    | 11907  | 27783 | 64827 | 151263 | 352947 | 823543  |
|    | 36864  | 55296 | 82944 | 124416 | 186624 | 279936  |
|    | 78125  | 78125 | 78125 | 78125  | 78125  | 78125   |
|    | 124416 | 82944 | 55296 | 36864  | 24576  | 16384   |
|    | 151263 | 64827 | 27783 | 11907  | 5103   | 2187    |
|    | 131072 | 32768 | 8192  | 2048   | 512    | 128     |
|    | 59049  | 6561  | 729   | 81     | 9      | 1       |



| e  | a8       | a7r     | a6r2    | a5r3   | a4r4   |
|----|----------|---------|---------|--------|--------|
| 8  | I        | 7       | 49      | 343    | 2401   |
|    | 256      | 768     | 2304    | 6912   | 19936  |
|    | 6561     | 10935   | 18225   | 30375  | 50625  |
|    | 65536    | 65536   | 65536   | 65536  | 65536  |
|    | 390625   | 234375  | 140625  | 84375  | 50625  |
|    | 1679616  | 559872  | 186624  | 61008  | 19936  |
|    | 5764801  | 823543  | 117649  | 16807  | 2401   |
| 9  | I        | 8       | 64      | 512    | 4096   |
|    | 256      | 896     | 3136    | 10976  | 38416  |
|    | 6561     | 13122   | 26244   | 52488  | 104976 |
|    | 65536    | 81920   | 102400  | 128000 | 160000 |
|    | 390625   | 312500  | 250000  | 200000 | 160000 |
|    | 1679616  | 839808  | 419904  | 209952 | 104976 |
|    | 5764801  | 1647086 | 470596  | 134456 | 38416  |
|    | 16777216 | 2097152 | 262144  | 32768  | 4096   |
| 10 | I        | 9       | 81      | 729    | 6561   |
|    | 256      | 1024    | 4096    | 16384  | 65536  |
|    | 6561     | 15309   | 35721   | 83349  | 194481 |
|    | 65536    | 98304   | 147456  | 221184 | 331776 |
|    | 390625   | 390625  | 390625  | 390625 | 390625 |
|    | 1679616  | 1119744 | 746496  | 497664 | 331776 |
|    | 5764801  | 2470629 | 1058841 | 453789 | 194481 |
|    | 16777216 | 4194304 | 1048576 | 262144 | 65536  |
|    | 43046721 | 4782969 | 531441  | 59049  | 6561   |



|    | 43r5   | 42r6    | 4r7     | 47<br>r8 |
|----|--------|---------|---------|----------|
| 8  | 16807  | 117649  | 823543  | 5764801  |
|    | 161008 | 186624  | 559872  | 1679616  |
|    | 84375  | 140625  | 234375  | 390625   |
|    | 65536  | 65536   | 65536   | 65536    |
|    | 30375  | 18225   | 10935   | 16561    |
|    | 6912   | 2304    | 768     | 256      |
|    | 343    | 49      | 7       | 1        |
| 9  | 32768  | 262144  | 2097152 | 16777216 |
|    | 134456 | 470596  | 1647086 | 5764801  |
|    | 209952 | 419904  | 839808  | 1679616  |
|    | 200000 | 250000  | 312500  | 390625   |
|    | 128000 | 102400  | 81920   | 65536    |
|    | 52488  | 26244   | 13122   | 6561     |
|    | 10976  | 3136    | 896     | 256      |
|    | 512    | 64      | 8       | 1        |
| 10 | 59049  | 531441  | 4782969 | 43046721 |
|    | 262144 | 1048576 | 4194304 | 16777216 |
|    | 453789 | 1058841 | 2470629 | 5764801  |
|    | 497664 | 746496  | 1119744 | 1679616  |
|    | 390625 | 390625  | 390625  | 390625   |
|    | 221184 | 147456  | 98304   | 65536    |
|    | 83349  | 35721   | 15309   | 6561     |
|    | 16384  | 4096    | 1024    | 256      |
|    | 729    | 81      | 9       | 1        |

8 2

49



|    | a9        | a8r      | a7r2    | a6r3    |
|----|-----------|----------|---------|---------|
| 8  | I         | 7        | 49      | 343     |
|    | 512       | 1536     | 6408    | 13824   |
|    | 19683     | 32805    | 54675   | 91125   |
|    | 262144    | 262144   | 262144  | 262144  |
|    | 1953125   | 1171875  | 703125  | 421875  |
|    | 10077696  | 3349232  | 1119744 | 366048  |
|    | 40353607  | 5764861  | 823543  | 117649  |
| 9  | I         | 8        | 64      | 512     |
|    | 512       | 1792     | 6272    | 21952   |
|    | 19683     | 39366    | 78732   | 157464  |
|    | 262144    | 327680   | 409600  | 512000  |
|    | 1953125   | 1562500  | 1250000 | 1000000 |
|    | 10077696  | 5038848  | 2519424 | 1259712 |
|    | 40353607  | 11529602 | 3294172 | 911192  |
|    | 134217728 | 16777216 | 2097152 | 262144  |
| 10 | I         | 9        | 81      | 729     |
|    | 512       | 2048     | 8192    | 32768   |
|    | 19683     | 45927    | 107163  | 250047  |
|    | 262144    | 393216   | 589824  | 884736  |
|    | 1953125   | 1953125  | 1953125 | 1953125 |
|    | 10077696  | 6718464  | 4478976 | 2985984 |
|    | 40353607  | 17294403 | 7411887 | 3176523 |
|    | 134217728 | 33554432 | 8388608 | 2097152 |
|    | 387420489 | 43046721 | 4782969 | 531441  |

a5r4



|    | 45r4    | 44r5    | 43r6    | 42r7    | 49<br>ar8 |
|----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 8  | 2401    | 16807   | 117649  | 823543  | 5764861   |
|    | 39872   | 124416  | 366048  | 1119744 | 3349232   |
|    | 151875  | 253125  | 421875  | 703125  | 1171875   |
|    | 262144  | 262144  | 262144  | 262144  | 262144    |
|    | 253125  | 151875  | 91125   | 54675   | 32805     |
|    | 124416  | 39872   | 13824   | 4608    | 1536      |
|    | 16807   | 2401    | 343     | 49      | 7         |
| 9  | 4096    | 32768   | 262144  | 2097152 | 16777216  |
|    | 76832   | 268912  | 941192  | 3294172 | 11529602  |
|    | 314928  | 629856  | 1259712 | 2519424 | 5038848   |
|    | 640000  | 800000  | 1000000 | 1250000 | 1562500   |
|    | 800000  | 640000  | 512000  | 409600  | 327680    |
|    | 629856  | 314928  | 157464  | 78732   | 39366     |
|    | 268912  | 76832   | 21952   | 6272    | 1792      |
|    | 32768   | 4096    | 512     | 64      | 8         |
| 10 | 6561    | 59049   | 531441  | 4782969 | 43046721  |
|    | 131072  | 524288  | 2097152 | 8388608 | 33554432  |
|    | 583443  | 1361367 | 3176523 | 7411887 | 17294403  |
|    | 1327104 | 1990656 | 2985984 | 4478976 | 6718464   |
|    | 1953125 | 1953125 | 1953125 | 1953125 | 1953125   |
|    | 1990656 | 1327104 | 884736  | 589824  | 393216    |
|    | 1361367 | 583443  | 250047  | 107163  | 45927     |
|    | 524288  | 131072  | 32768   | 8192    | 2048      |
|    | 59049   | 6561    | 729     | 81      | 9         |



| t  | r9        | a10        | agr       | a8r2     |
|----|-----------|------------|-----------|----------|
| 8  | 40353607  | 1          | 7         | 49       |
|    | 10077696  | 1024       | 3072      | 9216     |
|    | 1953125   | 59049      | 98415     | 164025   |
|    | 262144    | 1048576    | 1048576   | 1048576  |
|    | 19683     | 9765625    | 5859375   | 3515625  |
|    | 512       | 60466176   | 20155392  | 6698464  |
|    | 1         | 282475249  | 40353607  | 5764861  |
| 9  | 134217728 | 1          | 8         | 64       |
|    | 40353607  | 1024       | 3584      | 12544    |
|    | 10077696  | 59049      | 118098    | 236196   |
|    | 1953125   | 1048576    | 1310720   | 1638400  |
|    | 262144    | 9765625    | 7812500   | 6250000  |
|    | 19683     | 60466176   | 30233088  | 15116544 |
|    | 512       | 282475249  | 80707214  | 23059204 |
|    | 1         | 1073741824 | 134217728 | 16777216 |
| 10 | 387420489 | 1          | 9         | 81       |
|    | 134217728 | 1024       | 4096      | 16384    |
|    | 40353607  | 59049      | 137781    | 321489   |
|    | 10077696  | 1048576    | 1572864   | 2359296  |
|    | 1953125   | 9765625    | 9765625   | 9765625  |
|    | 262144    | 60466176   | 40310784  | 26872856 |
|    | 19683     | 282475249  | 121060821 | 51883209 |
|    | 512       | 1073741824 | 268435456 | 67108864 |
|    | 1         | 3486784401 | 387420489 | 43046721 |



|    | a7r3     | a6r4     | a5r5    | a4r6     |
|----|----------|----------|---------|----------|
| 8  | 343      | 2401     | 16807   | 117649   |
|    | 27648    | 79744    | 248832  | 746496   |
|    | 273375   | 455625   | 759375  | 1265625  |
|    | 1048576  | 1048576  | 1048576 | 1048576  |
|    | 2109375  | 1265625  | 759375  | 455625   |
|    | 2196288  | 746496   | 248832  | 79744    |
|    | 823543   | 117649   | 16807   | 2401     |
| 9  | 512      | 4096     | 32768   | 262144   |
|    | 43904    | 153664   | 537824  | 1882384  |
|    | 472392   | 944784   | 1889566 | 3779136  |
|    | 2048000  | 2560000  | 3200000 | 4000000  |
|    | 5000000  | 4000000  | 3200000 | 2560000  |
|    | 7558272  | 3779136  | 1889566 | 944784   |
|    | 6588344  | 1882384  | 537824  | 153664   |
|    | 2097152  | 262144   | 32768   | 4096     |
| 10 | 729      | 6561     | 59049   | 531441   |
|    | 65536    | 262144   | 1048576 | 4194304  |
|    | 750141   | 1750329  | 4084101 | 9529569  |
|    | 3538944  | 5308416  | 7962624 | 11943936 |
|    | 9765625  | 9765625  | 9765625 | 9765625  |
|    | 17915904 | 11943936 | 7962624 | 5308416  |
|    | 22235661 | 9529569  | 4084101 | 1750329  |
|    | 16777216 | 4194304  | 1048576 | 262144   |
|    | 4782969  | 531441   | 59049   | 6561     |

a3r7



| <i>t</i> | <i>a3r7</i>                                                                                 | <i>a2r8</i>                                                                                 | <i>ar9</i>                                                                                   | <i>r10</i>                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | 823543<br>2196288<br>2109375<br>1048576<br>164025<br>9216<br>49                             | 5764861<br>6698464<br>3515625<br>1048576<br>164025<br>9216<br>49                            | 40353607<br>20155392<br>5859375<br>1048576<br>98415<br>3072<br>7                             | 282475249<br>60466176<br>9765625<br>1048576<br>59049<br>1024<br>1                             |
| 9        | 2097152<br>6588344<br>7558272<br>5000000<br>2048000<br>472392<br>43904<br>512               | 16777216<br>23059204<br>15116544<br>6250000<br>1638400<br>236196<br>12544<br>64             | 134217728<br>80707214<br>30233088<br>7812500<br>1310720<br>118098<br>3584<br>8               | 1073741824<br>282475249<br>60466176<br>9765625<br>1048576<br>59049<br>1024<br>1               |
| 10       | 4782969<br>16777216<br>22235661<br>17915904<br>9765625<br>3538944<br>750141<br>65530<br>725 | 43046721<br>67108864<br>51883209<br>26873856<br>9765625<br>2359296<br>321489<br>16384<br>81 | 387420489<br>268435456<br>121060821<br>40310784<br>9765625<br>1572864<br>137781<br>4096<br>9 | 3486784401<br>1073741824<br>282475249<br>60466176<br>9765625<br>1048576<br>59049<br>1024<br>1 |

In



In præcedenti tabula 'progressivas quantitates expandimus: in sequenti colligimus, cuiusque numeri massas ex omnibus eiusdem appellationis proportionalibus, pro vnaquaque numeri abscissione supra singillatim acceptis: videlicet massam ex omnibus abscissis, quàm significamus caractere  $O.a$ ; & massam ex omnibus residuis,  $O.r$ ; & massam ex omnibus abscissis secundis  $O.a2$ ; & massam ex omnibus vniprimis  $O.ar$ ; & massam ex omnibus residuis secundis,  $O.r3$ ; & reliquas deinceps, quatenus præcedens tabula expanditur.

| $t$ | $O.r$<br>$O.a$ | $O.r2$<br>$O.a2$ | $O.ar$ | $O.r3$<br>$O.a3$ | $O.ar2$<br>$O.a2r$ | $O.r4$<br>$O.a4$ |
|-----|----------------|------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|
| 2   | 1              | 1                | 1      | 1                | 1                  | 1                |
| 3   | 3              | 5                | 4      | 9                | 6                  | 17               |
| 4   | 6              | 14               | 10     | 36               | 20                 | 98               |
| 5   | 10             | 30               | 20     | 100              | 50                 | 354              |
| 6   | 15             | 55               | 35     | 225              | 105                | 979              |
| 7   | 21             | 91               | 56     | 441              | 196                | 2275             |
| 8   | 28             | 140              | 84     | 784              | 336                | 4676             |
| 9   | 36             | 204              | 120    | 1296             | 540                | 8772             |
| 10  | 45             | 285              | 165    | 2025             | 825                | 15333            |

h

 $O.ar3$



54

|          | <i>O.ar3</i> |                | <i>O.r5</i> | <i>O.ar4</i> | <i>O.a2r3</i> | <i>O.r6</i> |
|----------|--------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| <i>t</i> | <i>O.a3r</i> | <i>O.a2r2.</i> | <i>O.a5</i> | <i>O.a4r</i> | <i>O.a3r2</i> | <i>O.a6</i> |
| 2        | 1            | 1              | 1           | 1            | 1             | 1           |
| 3        | 10           | 8              | 33          | 18           | 12            | 65          |
| 4        | 46           | 34             | 276         | 116          | 68            | 794         |
| 5        | 146          | 104            | 1300        | 470          | 260           | 4890        |
| 6        | 371          | 259            | 4425        | 1449         | 777           | 20515       |
| 7        | 812          | 560            | 12201       | 3724         | 1960          | 67171       |
| 8        | 1596         | 1092           | 29008       | 8400         | 4368          | 184820      |
| 9        | 2892         | 1968           | 61776       | 17172        | 8856          | 446964      |
| 10       | 4917         | 3333           | 120825      | 32505        | 16665         | 978405      |

|          | <i>O.ar5</i> | <i>O.a2r4</i> |               | <i>O.r7</i> | <i>O.ar6</i> |
|----------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| <i>t</i> | <i>O.a5r</i> | <i>O.a4r2</i> | <i>O.a3r3</i> | <i>O.a7</i> | <i>O.a6r</i> |
| 2        | 1            | 1             | 1             | 1           | 1            |
| 3        | 34           | 20            | 16            | 129         | 66           |
| 4        | 310          | 154           | 118           | 2316        | 860          |
| 5        | 1610         | 740           | 560           | 18700       | 5750         |
| 6        | 6035         | 2659          | 2003          | 96825       | 26265        |
| 7        | 18236        | 7832          | 5888          | 376761      | 93436        |
| 8        | 47244        | 19856         | 14988         | 1200304     | 278256       |
| 9        | 109020       | 45528         | 34176         | 3297456     | 725220       |
| 10       | 229845       | 95205         | 71445         | 8080425     | 1703625      |



55

|    | O.2r5  | O.2r4  | O.r8     | O.ar7    | O.2r6   |
|----|--------|--------|----------|----------|---------|
|    | O.2r2  | O.2r3  | O.a8     | O.ar7    | O.2r2   |
| 2  | I      | I      | I        | I        | I       |
| 3  | 36     | 24     | 257      | 130      | 68      |
| 4  | 380    | 236    | 6818     | 2446     | 994     |
| 5  | 2300   | 1400   | 72354    | 21146    | 7604    |
| 6  | 9945   | 6009   | 462979   | 117971   | 39619   |
| 7  | 34216  | 20608  | 2142595  | 494732   | 159320  |
| 8  | 99696  | 59752  | 7907396  | 1695036  | 531012  |
| 9  | 255960 | 153792 | 24684612 | 4992492  | 1534488 |
| 10 | 594825 | 357225 | 67731333 | 13072917 | 3963333 |

|    | O.2r5   | O.r9    | O.ar8     |
|----|---------|---------|-----------|
|    | O.2r3   | O.a9    | O.a8r     |
| 2  | 1       | I       | I         |
| 3  | 40      | 32      | 513       |
| 4  | 526     | 418     | 20196     |
| 5  | 3896    | 3104    | 282340    |
| 6  | 20051   | 16003   | 2235465   |
| 7  | 80192   | 64064   | 12313161  |
| 8  | 265356  | 211460  | 52666768  |
| 9  | 769152  | 614976  | 186884496 |
| 10 | 1984917 | 1587334 | 574304985 |



56

|          | <i>O.a2r7</i> | <i>O.a3r6</i> | <i>O.a4r5</i> | <i>O.r10</i> |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <i>i</i> | <i>O.a7r2</i> | <i>O.a6r3</i> | <i>O.a5r4</i> | <i>O.a10</i> |
| 2        | I             | I             | I             | I            |
| 3        | 132           | 72            | 48            | 1025         |
| 4        | 2708          | 1268          | 836           | 60074        |
| 5        | 26300         | 11720         | 7760          | 1108650      |
| 6        | 165417        | 72297         | 48009         | 10874275     |
| 7        | 778120        | 337120        | 224224        | 71340451     |
| 8        | 2967888       | 1273008       | 851640        | 353815700    |
| 9        | 9655416       | 4154976       | 2766692       | 1427557524   |
| 10       | 27720825      | 11912505      | 7936665       | 4914341925   |

|          | <i>O.ar9</i> | <i>O.a2r8</i> | <i>O.a3r7</i> |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| <i>i</i> | <i>O.a9r</i> | <i>O.a8r2</i> | <i>O.a7r3</i> |
| 2        | I            | I             | I             |
| 3        | 514          | 260           | 136           |
| 4        | 20710        | 7594          | 3238          |
| 5        | 303050       | 94100         | 37400         |
| 6        | 2538515      | 715939        | 276563        |
| 7        | 14850676     | 3943352       | 1503488       |
| 7        | 67518444     | 17200816      | 6479148       |
| 9        | 254402940    | 63090168      | 23809576      |
| 10       | 828707925    | 201375525     | 75832725      |



57

O.44r6      O.45r5.

|    |          |          |
|----|----------|----------|
| 1  | O.46r4   |          |
| 2  | I        | I        |
| 3  | 80       | 64       |
| 4  | 1834     | 1510     |
| 5  | 21200    | 17600    |
| 6  | 157269   | 130835   |
| 7  | 856352   | 713216   |
| 8  | 3716116  | 3098604  |
| 9  | 13596208 | 11320316 |
| 10 | 43292325 | 35844325 |

His paratis, experire, si vera sunt, quæ proponimus  
theoremata, sub 5. 2. exempli gratia, tertium.

O.6a2:  $2t3 - 3t2 + t$ .  
idest, massa ex omnibus sexcuplis abscissis secundis cuiusq;  
totæ, est æqualis duplæ totæ tertiæ, dempta tripla tota se-  
cunda, addita ipsa tota.

Nota, quod interpunctio colon (:) nobis vsuuenit ad si-  
gnificandam æqualitatem.

Esto



58

Esto tota  
ideoque

|  |         |     |  |
|--|---------|-----|--|
|  | t:      | 7   |  |
|  | t2:     | 49  |  |
|  | t3:     | 343 |  |
|  | O.42:   | 91  |  |
|  | 2t3:    | 686 |  |
|  | t:      | 7   |  |
|  | 2t3+t:  | 693 |  |
|  | ---3t2: | 147 |  |
|  | O.642:  | 546 |  |

Item quartum O.6ar: t3---t:  
idest, massa ex omnibus sexcuplis vniprimis cuiusque tota,  
est æqualis tota tertia, dempta ipsa tota.

Esto tota t: 9  
ideoque t3: 729  
O.ar: 120

|  |        |     |  |
|--|--------|-----|--|
|  | t3:    | 729 |  |
|  | ---t:  | 9   |  |
|  | O.6ar: | 720 |  |

Item decimum sextum  
O.42043r3: 317+713---101.  
Esto



Est tota      10  
ideoque      13:      1000

17:      10000000

0.2373:      71445

317:      30000000

713:      7000

317+713:      30007000

---101:      100

60)      30006900

7)      500115

0.2373:      71445

Similiter alia sub eadem 5. 2. atque sub alijs eiusdem  
elementi propositionibus theoremata facile poteris pro-  
bare, ope tabularum præcedentium.

Sed ne quidquam tibi desit, accipe, pro huius capitis  
coronide, tabellam speciosam, expensam, vsque ad deci-  
mam basim. Vocamus autem speciem vnamquamlibet  
massam, in qua colliguntur cuiusque totæ, omnes, eiusdem  
appellationis proportionales, pro singulis abscissionibus  
acceptæ: & ex speciebus ordinatam tabulam triangularem  
similem tabulæ proportionalium, speciosam nuncupa-  
mus.

Ta-



*Tabula Speciosa.*

*O. 11.*

*O. 12.*

*O. 13.*

*O. 14.*

*O. 15.*

*O. 16.*

*O. 17.*

*O. 18.*

*O. 19.*

*O. 20.*

*O. 21.*

*Cap.*



## Cap. 3.

Tertium pro tertio elemento, est quædam animaduersione indeterminatarum determinabilium rationum: quarum te iam habere conceptum, facile demonstro; vt interim animaduertas.

Cum scripsero  $O.a$ , statim ex præcedenti capite habes massam ex omnibus abscissis: sed quota sit hæc massa, nondum habes, nisi scripsero, cuius numeri sit massa. Quod si assignauero  $O.a$ , numeri  $t$  massam esse; neque sic habes, quota sit, nisi simul assignauero, quotus est numerus, valor litteræ  $t$ . Neque si assignauero  $O.a$ , eius numeri massam esse, cuius  $t2$  est secunda potestas: neque si  $O.a$ , massam eius numeri dixerò, cuius  $t3$  est tertia potestas; nisi aut litteræ  $t$ , aut characteris  $t2$ , vel  $t3$ , quotus valor sit, certò certius assignauero. Similiter cum scripsero  $O.r$ , habes massam ex omnibus residuis: sed quantitatem eius non habes. Cum verò licentiam dederò, vt quotum quemque litteræ  $t$  valorem taxes; tuque huiusmodi vsus licentia dixeris,  $t$  valere quinario: statim profectò assignabis &  $O.a$ , valere 10; &  $t2$ , valere 25; &  $t3$ , valere 125; &  $O.r$ , valere 10; & determinatæ litteræ  $t$ , determinatas esse quantitates  $O.a$ ,  $O.r$ ,  $t2$ ,  $t3$ . Quare data licentia antequam vsus fueris, habebas profectò  $O.a$ ,  $O.r$ ,  $t2$ ,  $t3$ , quantitates indeterminatas determinabiles.

Rursum cum scripsero duas eiusdem numeri Massas  $O.a$ , &  $O.r$ , esse æquales; aut massam  $O.a$ , ad  $t2$  ---  $t$  dimidiâ esse; neque tamen assignauero, quotus litteræ  $t$  sit valor;



lor; dederimque assignandi licentiam: antequam vtaris licentia, profectò habes determinatam esse rationem dimidiam, indeterminatæ quantitatis  $O.a$ , ad indeterminatam quantitatem  $t2---t$ . Quæ quidem theoremata interim mihi credis ante demonstrationem, ex inductione exemplorum; atque ita ex determinatione: sed cum in secundo elemento demonstrauero; tunc citra omnem inductionem, & ante determinationem valoris litteræ  $t$ , indubitanter vtraque asseuerabis. Habes ergo inter indeterminatas quantitates, determinatas rationes.

Sed si quæsiro, quænam sit ratio Massæ  $O.a$ , cuiuspiam numeri  $t$ , ad  $t2$ ; aut Massæ  $O.2a$ , ad  $t2$ ; aut Massæ  $O.a$ , ad  $t$ ; aut massæ  $O.a$ , ad  $t3$ : ad has profectò interrogationes, data licentia vsus, cum taxaueris litteræ  $t$  valorem, tunc determinatam assignabis rationem; sed non eandem semper, ad eandem quæstionem. Siquidem litteram  $t$ , taxaueris valere 3; pro ratione  $O.a$ , ad  $t2$ , respondebis, 3 ad 9: qui si taxaueris litteram  $t$  valere 4; ad eandem quæstionem respondebis 6 ad 16: quæ non est eadem ratio 3 ad 9. item pro alijs valoribus, aliam respondebis rationem. Itaque data licentia taxandi litteram  $t$ , antequam taxaueris, habes rationem  $O.a$  ad  $t2$  indeterminatam determinabilem.

Interim notandum est, possibiles responsiones ad quæstionem propositam, pro varijs litteræ  $t$  valoribus, ordinatim semper maioribus; varias, & semper ordinatim maiores esse: dimidia quidem ratione semper minores; ad ipsam



ipsam verò dimidiam semper propiùs accedentes.

| Pro litteræ $t$ valore | $O.a$ | ad $12$ |
|------------------------|-------|---------|
| 2                      | 1     | 4       |
| 3                      | 3     | 9       |
| 4                      | 6     | 16      |
| 5                      | 10    | 25      |
| 6                      | 15    | 36      |
| 7                      | 21    | 49      |
| 8                      | 28    | 64      |
| 9                      | 36    | 81      |
| 10                     | 45    | 100     |

Quod si propositæ quæstioni potuerit, pro quodam valore assignabili responderi ratio propior dimidiæ, quàm alia quælibet; dicetur ipsa indeterminata ratio  $O.a$  ad  $12$ , quasi dimidia.

Similiter  $O.2a$  ad  $12$ , ratio est indeterminata determinabilis. nam

| Pro litteræ $t$ valore | $O.2a$ | ad $12$ |
|------------------------|--------|---------|
| 2                      | 2      | 4       |
| 3                      | 6      | 9       |
| 4                      | 12     | 16      |
| 5                      | 20     | 25      |
| 6                      | 30     | 36      |
| 7                      | 42     | 49      |



| Pro litteræ $t$ valore | $0.2a$ | ad $tz$ |
|------------------------|--------|---------|
| 8                      | 56     | 64      |
| 9                      | 72     | 81      |
| 10                     | 90     | 100     |

atque ita semper minoris inæqualitatis est ratio: sed eò semper maior, quò pro maiore litteræ  $t$  valore, assignatur. Quæ ratio indeterminata determinabilis; si fuerit assignabilis propior æqualitati, quàm data quælibet inæqualitas; dicetur ratio  $0.2a$  ad  $tz$ , quasi æqualitas.

| Item pro litteræ $t$ valore | $0.a$ | ad $t$ |
|-----------------------------|-------|--------|
| 2                           | 1     | 2      |
| 3                           | 3     | 3      |
| 4                           | 6     | 4      |
| 5                           | 10    | 5      |
| 6                           | 15    | 6      |
| 7                           | 21    | 7      |
| 8                           | 28    | 8      |
| 9                           | 36    | 9      |
| 10                          | 45    | 10     |

est ratio indeterminata determinabilis, pro maiore litteræ  $t$  valore, semper maior, quæ si fuerit assignabilis maior, quàm data quælibet; dicetur ratio  $0.a$  ad  $t$ , quasi infinita.

De



## Denique pro litteræ &amp; valore

O. a ad 13

|    |    |      |
|----|----|------|
| 2  | 1  | 8    |
| 3  | 3  | 27   |
| 4  | 6  | 64   |
| 5  | 10 | 125  |
| 6  | 15 | 216  |
| 7  | 21 | 343  |
| 8  | 28 | 512  |
| 9  | 36 | 729  |
| 10 | 45 | 1000 |

est indeterminata determinabilis, pro maiore litteræ & valore, semper minor: quæ si fuerit assignabilis minor, quàm data quælibet; dicetur ratio O. a ad 13, quasi nulla.

## Cap. 4.

Quantum, pro quarto elemento, est animaduersio *def. 10. lib. 5. Elem. Eucl. & def. 5. lib. 6.* in quibus modus quantitatis rationum assumitur; illi quidem superinductus, secundum quæ maiores, vel minores rationes dicuntur, *def. 8. lib. 5.* sed ab illo longè alius; & secundum quem propiores æqualitati, aut remotiores ab æqualitate rationes dicimus.

Modum autem quantitatis, in vnoquoque genere, concipimus ex duobus vno: secundum quod res eiusdem generis inuicem sunt componibiles, vt faciant eiusdem generis



neris aliam rem, in eiusdem modi comparatione grandior-  
rem. altero; secundum quod res eadem, secum ipsa altera,  
composita aliquoties, facit rem eiusdem generis, in ei-  
usdem modi comparatione, æquæ toties grandior. Sic  
calor calori adpositus, facit calidum calidius: & calor si-  
mul aliquoties iteratus, facit æquæ multoties calidius cali-  
dium. item lumen lumini adpositum, facit luminosius  
luminosum: idemque lumen simul aliquoties iteratum, fa-  
cit æquæ multoties luminosius luminosum.

Similiter ratio inæqualitatis maioris, alij maioris inæ-  
qualitatis rationi adposita, componit rationem maioris  
inæqualitatis, & magis maioris inæqualitatis, idest magis  
ab æqualitate remotæ, *ex def. 5. 6.* Et ratio maioris inæqua-  
litatis, secum ipsa altera, aliquoties composita, facit ra-  
tionem multò maioris inæqualitatis æquemultiplicatam,  
idest æquemultò remotiorem ab æqualitate, *ex def. 10. 5.*  
Quare maioris inæqualitatis rationibus, conuenit modus  
quantitatis secundum quem magis vel minùs maioris sunt  
inæqualitatis, idest, magis, vel minùs ab æqualitate di-  
stantes.

Eodemque modo, ratio minoris inæqualitatis, alij mi-  
noris inæqualitatis rationi adposita facit rationem mino-  
ris inæqualitatis, & magis minoris inæqualitatis, idest re-  
motioris ab æqualitate *ex def. 5. 6.* Et ratio minoris inæ-  
qualitatis, secum ipsa altera, aliquoties composita, facit  
rationem multò minoris inæqualitatis æquemultiplicatam,  
idest æquemultò remotioris ab æqualitate, *ex def. 10. 5.*

Quare



Quare minoris inæqualitatis rationibus, conuenit modus quantitatis, secundum quem magis, vel minùs minoris sunt inæqualitatis, idest secundum quem magis, vel minùs ab æqualitate distant.

Porro quantum ad hunc modum attinet quantitatis, notandum est, rationum quasi tria genera esse. Primum æqualitatis, cui talis modus non conuenit, neque seorsim ipsi, neque sibi & alijs, tamquam vnus generis rationibus: nam æqualitas æqualitati adposita, eandem componit æqualitatem; & maioris inæqualitatis, vel minoris inæqualitatis rationi adposita, eandem inæqualitatis facit rationem. Secundum, maioris inæqualitatis. Tertium, minoris inæqualitatis; quibus tales modos conuenire singulis demonstraui: sed non vtrisque, vt vni generi. nam maioris inæqualitatis, & minoris inæqualitatis rationes adpositæ, nec magis maioris, nec magis minoris inæqualitatis componunt rationes.

Cap. 5.

Quintum pro quinto elemento est inquisitio quantitatis quæ cuiusque rationis non ex hypothesi est propria, sed naturaliter, & citra omnem hypothesim: altioris rationis, maior; depressioris, minor; æquealtæ, eadem; multiplicatæ, æquemultiplex; & submultiplicatæ, æquesubmultiplex: quam logarithmum vocamus; & nos in quinto elemento, diligenter; quantum potuimus, persecuti, non hucusque quidem attigimus, tamen viam inueniendi aperuimus. Id quod primum in ratione dupla, ita conabor explicare.

Accipe



Accipe seriem infinitam omnium fractionum, in quibus vnitas, & omnes numeri denominant vnitatem: quarum in characteribus, cum consueuerit numerator, scribi supra denominatorem interueniente lineola, sic

$\frac{1}{1}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{7}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{9}$   $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{11}$   $\frac{1}{12}$   $\frac{1}{13}$   $\frac{1}{14}$   $\frac{1}{15}$   $\frac{1}{16}$  &c.

nos aliter. scripsimus enim primùm numeratorem, deinde statim adscripsimus denominatorem inter parentheses clausum: quod compositioni typographycæ longè commodius cum sit, lectioni etiam tum in latino sermone, tum in nostro Italico idiomate, magis conuenit.

1(1), 1(2), 1(3), 1(4), 1(5), 1(6), 1(7), 1(8), 1(9), 1(10),  
1(11), 1(12), 1(13), 1(14), 1(15), 1(16), &c.

Et in accepta serie sume terminos, duplam habentes rationem, simplos, dimidios, subtriplos, subquadruplos, aliosque submultiplos deinceps. Et inter extremos, accipe in eadem serie medios quosque, quorum & maioris extremi summa dicetur hyperlogarithmus, eo quod superet logarithmum; eorundem verò mediorum, & minoris extremi summa, dicetur hypologarithmus; eo quod superetur à logarithmo.

Itaque duplæ rationis hyperlogarithmi sunt, qui sequuntur: primus inter simplos & maximos; & reliqui deinceps ordinatim inter minores, & submultiplos.

1(1).



$I(1)$ .  
 $I(2)$   $I(3)$ .  
 $I(3)$   $I(4)$   $I(5)$ .  
 $I(4)$   $I(5)$   $I(6)$   $I(7)$ .  
 $I(5)$   $I(6)$   $I(7)$   $I(8)$   $I(9)$ .

& reliqui in infinitum: quorum inter simplo hyperlogarithmus est maximus, & reliqui deinceps ordinatim minores.

Item duplæ rationis hypologarithmi sunt qui sequuntur primus inter simplos, & maximos, & deinceps reliqui

$I(2)$ .  
 $I(3)$   $I(4)$ .  
 $I(4)$   $I(5)$   $I(6)$ .  
 $I(5)$   $I(6)$   $I(7)$   $I(8)$ .  
 $I(6)$   $I(7)$   $I(8)$   $I(9)$   $I(10)$ .

& in infinitum: quorum inter simplos hypologarithmus est minimus, & reliqui deinceps ordinatim sunt maiores.

Est autem assignatorum quocunque minimus hyperlogarithmorum, maior quàm maximus hypologarithmorum: & differentia æqualis minimo assumptorum extremorum rationis duplæ. cum autem possit assumi minor extremus, quàm data quælibet quantitas; possunt consequenter assumi termini duplam inter se rationem habentes, quorum hyperlogarithmi, & hypologarithmi differentia minor, quàm data quælibet quantitas. unde hyperlogarithmus, & hypologarithmus, quasi sunt æquales.

Porro logarithmus illa est quantitas, ad quam tendunt

k

hyper-



hyperlogarithmi, cum semper deinceps minuuntur, & ad quam tendunt hypologarithmi, cum semper deinceps augentur; omni minor hyperlogarithmo, & omni maior hypologarithmo.

Similiter, sesquialteræ rationis hyperlogarithmi & hypologarithmi sunt, qui sequuntur: & utrorumque primus est inter simplos, & maximos; reliqui verò deinceps ordinati inter minores, & submultiplos.

#### Hyperlogarithmi.

I(2).  
I(4) I(5).  
I(6) I(7) I(8).  
I(8) I(9) I(10) I(11).  
I(10) I(11) I(12) I(13) I(14).  
& deinceps alij in infinitum.

#### Hypologarithmi.

I(3).  
I(5) I(6).  
I(7) I(8) I(9).  
I(9) I(10) I(11) I(12).  
I(11) I(12) I(13) I(14) I(15).  
& reliqui deinceps in infinitum.

Similiter alius cuiusque rationis hyperlogarithmi, & hypologarithmi sunt assignabiles, quorum omnium quantitas intermedia eiusdem rationis est logarithmus. Et hæc est suæ cuiusque rationis quantitas naturalis, & earundem, vel æquealtarum rationum eadem quantitas, secundum altitu-



altitudinis & depressionis modum in præcedenti capite fu-  
sius declaratum.

Deinde altiorum rationum sunt maiores logarithmi, &  
depressiorum minores. quod ideò patet, quia altioris hy-  
perlogarithmi rationis, hyperlogarithmos continent de-  
pressioris: & hypologarithmi continent hypologarithmos.

Nam exempli gratia hyperlogarithmi sunt rationum

| triplæ                         | & sesquialteræ  |
|--------------------------------|-----------------|
| 1(1) 1(2).                     | 1(2).           |
| 1(2) 1(3) 1(4) 1(5).           | 1(4) 1(5).      |
| 1(3) 1(4) 1(5) 1(6) 1(7) 1(8). | 1(6) 1(7) 1(8). |

quorum triplæ altioris hyperlogarithmi continent sesqui-  
alteræ depressioris hyperlogarithmos.

Item hypologarithmi sunt earumdem rationum.

| triplæ                         | & sesquialteræ  |
|--------------------------------|-----------------|
| 1(2) 1(3).                     | 1(3).           |
| 1(3) 1(4) 1(5) 1(6).           | 1(5) 1(6).      |
| 1(4) 1(5) 1(6) 1(7) 1(8) 1(9). | 1(7) 1(8) 1(9). |

quorum hypologarithmi triplæ continent hypologi-  
thmos sesquialteræ.

Vnde patet etiam, quod compositæ rationis logari-  
thmus, est aggregatus componentium logarithmorum:  
nam & hyperlogarithmi duplæ, & sesquialteræ, hyper-  
logarithmos triplæ componunt; & hypologarithmi, hy-  
pologarithmos.

k 2

Hyper-



## Hyperlogarithmi.

Duplæ

Sesquialteræ.

1(1).

1(2).

1(2) 1(3).

1(4) 1(5).

1(3) 1(4) 1(5).

1(6) 1(7) 1(8).

1(4) 1(5) 1(6) 1(7).

1(8) 1(9) 1(10) 1(11).

## Hypologarithmi.

Duplæ

Sesquialteræ.

1(2).

1(3).

(8) 1(3) 1(4).

1(5) 1(6).

1(4) 1(5) 1(6).

1(7) 1(8) 1(9).

1(5) 1(6) 1(7) 1(8).

1(9) 1(10) 1(11) 1(12).

Sed & duplicatæ rationis duplus est logarithmus: nam duplicatæ duplæ rationis, nempe quadruplæ hyperlogarithmi ex binis duplæ rationis hyperlogarithmis aggregatis fiunt.

## Hyperlogarithmi quadruplæ

ex duplæ,

&amp; duplæ hyperlogarithmis.

1(1). 1(2) 1(3).

1(2) 1(3). 1(4) 1(5) 1(6) 1(7).

1(3) 1(4) 1(5). 1(6) 1(7) 1(8) 1(9) 1(10) 1(11).

## Hypologarithmi quadruplæ

ex duplæ,

&amp; duplæ hypologarithmis.

1(2). 1(3) 1(4).

1(3) 1(4). 1(5) 1(6) 1(7) 1(8).

1(4) 1(5) 1(6). 1(7) 1(8) 1(9) 1(10) 1(11) 1(12).

Si-



Similiter multiplicata cuiusque rationis æquemultiplex deprehenditur logarithmus; quia quasi æquemultipli sunt hyperlogarithmi, & quasi æquemultipli sunt hypologarithmi. Et è conuerso submultiplicata deprehenditur submultiplex logarithmus.

### A P P E N D I X.

**C**Um hæc scriberem, mihi contigit rectum tramitem inuenire, ad persequendos omnium numerosarum rationum logarithmos. Oportet autem eiusdem ab initio propositæ seriei fractionum terminos assumere, aliquotenos à primo, singulos, binos, ternos, quaternos, quinos, & deinceps. Porro ex totenis collectas quantitates voco prologarithmos, & totenorum seriem, voco seriem prologarithmorum.

Est autem series singulorum *A*: series prologarithmorum ex binis *B*: series prologarithmorum ex ternis *C*: item ex quaternis *D*: item ex quinis *E*: & deinceps alia. Deinde series ordinetur excessuum, primi prologarithmi seriei *B*, supra primum seriei *A*; & secundi, supra secundum; & tertij, supra tertium; & sic deinceps in infinitum: omnium huiusmodi excessuum summa, est logarithmus rationis duplæ. Nam primus excessus, est hypologarithmus inter maximos terminos rationis duplæ: summa ex primo & secundo, est hypologarithmus, inter subduplos maximorum: summa ex primo secundo & tertio, est hy-

k 3

po-



|          |      |       |       |       |       |      |       |       |       |        |       |       |       |        |        |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| <i>E</i> | 1(1) | 1(2)  | 1(3)  | 1(4)  | 1(5). | 1(6) | 1(7)  | 1(8)  | 1(9)  | 1(10). | 1(11) | 1(12) | 1(13) | 1(14)  | 1(15). |
| <i>D</i> | 1(1) | 1(2)  | 1(3)  | 1(4). |       | 1(5) | 1(6)  | 1(7)  | 1(8). |        | 1(9)  | 1(10) | 1(11) | 1(12). |        |
| <i>C</i> | 1(1) | 1(2)  | 1(3). |       |       | 1(4) | 1(5)  | 1(6). |       |        | 1(7)  | 1(8)  | 1(9). |        |        |
| <i>B</i> | 1(1) | 1(2). |       |       |       | 1(3) | 1(4). |       |       |        | 1(5)  | 1(6). |       |        |        |
| <i>A</i> |      |       | 1(1). |       |       |      | 1(2). |       |       |        |       |       | 1(3). |        |        |

prologarithmus, inter subtriplos maximorum. Ergo summa omnium, hypologarithmorum est maximum, nempe logarithmus.

Item series ordinetur excessuum primi prologarithmi seriei *C*; supra primum seriei *B*; & secundi, supra secundum; & tertij, supra tertium; & sic deinceps in infinitum: omnium huiusmodi excessuum summa, est logarithmus rationis sesquialteræ.

Item series ordinetur excessuum primi prologarithmi seriei *D*, supra primum seriei *C*; & secundi, supra secundum; & ter-

tij supra tertium; & sic deinceps in infinitum: omnium summa excessuum, est logarithmus rationis sesquiteritiæ.

Similiter series ordinetur excessuum primi prologarithmi seriei *E*, supra primum seriei *C*; & secundi, supra secundum; & tertij, supra tertium; & sic deinceps in infinitum: omnium summa excessuum, est logarithmus rationis quam habent numeri ex quotenis est series *E*, & ex quotenis est series *C*. Nam primus excessus, inter terminos eiusdem rationis terminos est hypologari-



garithmus: primi vero & secundi excessuum summa, est hypologarithmus inter subdublos maximorum: primi secundi & tertij summa excessuum, est hypologarithmus inter subtriplos; & sic deinceps.

*Cap. 6.*

Sextum & vltimum, pro sexto est elemento: numerosa duarum propositionum quinti elementi reductio, quarum est vsus insignis in sexto.

*Prima, quæ est 99. 5.*

Quatuor harmonicè dispositarum quantitatuum, si prima maxima est omnium, logarithmus, rationis primæ ad secundam, ad logarithmum rationis tertię ad quartam, minor est, quàm vt prima ad tertiam; maior, quàm vt secunda ad quartam.

Sint quantitates numerosas inuicem rationes habentes, harmonicè dispositæ 1(4) 1(5) 1(8) 1(9) quarum maxima 1(4).

Dico logarithmum rationis 1(4) ad 1(5) ad logarithmum rationis 1(8) ad 1(9), minorem esse, quàm vt 1(4) ad 1(8); maiorem verò, quàm vt 1(5) ad 1(9). idest

Dico logarithmum rationis 5 ad 4 ad logarithmum, rationis 9 ad 8, minorem esse, quàm vt 8 ad 4; maiorem verò, quàm vt 9 ad 5. idest

Dico rationem 5 ad 4, ad rationem 9 ad 8, logarithmicè minorem esse, quàm vt 8 ad 4; maiorem verò logarithmicè, quàm vt 9 ad 5. idest

Dico rationem 5 ad 4 quadruplicatam, depressiorem esse



esse ratione 9 ad 8 octuplicata: & 5 ad 4 quintuplicata  
tam altiorem esse ratione 9 ad 8 nonuplicata.

Et quia ambæ rationes 5 ad 4, & 9 ad 8, sunt maioris  
inæqualitatis: inter quas depressoires altioribus sunt mi-  
nores. Dico 5 ad 4 quadruplicatam minorem esse ra-  
tione 9 ad 8 octuplicata: & 5 ad 4 quintuplicatam, ma-  
iorem esse ratione 9 ad 8 nonuplicata. idest

Dico potestates quartam 5 ad quartam 4, minorem  
esse quam ut octaua 9 ad octauam 8: quintam verò 5 ad  
quintam 4, maiorem quam ut nona 9 ad nonam 8. idest

Dico productos sub potestatibus, sub quarta 5, &  
octaua 8, minorem, quàm sub quarta 4, & octaua 9: sed  
sub quinta 5, & nona 8, maiorem, quàm sub quinta 4, &  
nona 9.

*Potestates.*

Quarta 5

625

Octaua 8

16777216

83886080

33554432

100662296

10485659900

Quar-



Quarta 4 256

Oitava 9 43046721

---

258280326

215233605

86093442

---

11019960576

---

Quinta 5 3125

Nona 8 134217728

---

671088640

268435456

134217728

402653184

---

419430400000

---

Quinta 4 1024

Nona 9 387420489

---

1549681956

774840978

387420489

---

396718580736

---



*Secunda, quæ est 100. 5.*

Quatuor arithmeticè dispolitorum numerorum, ratio primi ad secundum totuplicata, quotus est primus, maior est ratione tertij ad quartum totuplicata, quotus est quartus: ratio verò primi ad secundum totuplicata, quotus est secundus, minor est, quàm tertij ad quartum totuplicata, quotus est tertius.

Sint quatuor arithmeticè dispositi numeri 8, 5, 7, 4.

Dico rationem 8 ad 5 octuplicatam, maiorem esse ratione 7 ad 4 quadruplicata: & rationem 8 ad 5 quintuplicatam, minorem septuplicata 7 ad 4. idest

Dico potestates octauam 8 ad octauam 5, maiorem esse, quàm quarta 7 ad quartam 4: quintam 8 ad quintam 5, minorem, quàm septima 7 ad septimam 4. idest

Dico productos sub potestatibus, sub octaua 8, & quarta 4, maiorem esse, quàm sub octaua 5, & quarta 7: & sub quinta 8, & septima 4, minorem, quàm sub quinta 5, & septima 7.

Potestates.

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| Octaua | 8 | 16777216 |
| Quarta | 4 | 256      |

---

100663296

83886080

33554432

---

4294967296

---



Octava 5

390625

Quarta 7

2401

390625

1562500

781250

937890625

Quinta 8

32768

Septima 4

16384

131072

262144

98304

196608

32768

536870912

Potestates.

Quinta 5

3125

Septima 7

823543

4117715

1647086

823543

2470629

2573571875.



## In Præfatione præcedenti.

| Pag. | lin. | col. |        |        |
|------|------|------|--------|--------|
| 52   | 7    | I    | 164025 | 273375 |
|      | 8    | I    | 9216   | 27648  |
|      | 9    | I    | 49     | 343    |

## In Opere sequenti.

| Pag. | lin. |                |                                                              |
|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 5    | 20   | basibus, quæ   | basibus, quælibet quan-<br>titas fuerit summa<br>duarum, quæ |
| 64   | 25   | quoties        | quotus                                                       |
|      | 26   | quoties        | quotus                                                       |
| 207  | 27   | supra lineolam | ante parentheses                                             |
| 208  | 3    | infra lineolam | inter parentheses.                                           |



SOLI DEO GLORIA.




**GEOMETRIÆ  
SPECIOSÆ  
ELEMENTA.**






Petrus Mengolus, Lucae Tesino, adolescenti  
optimo S. D.



**I**N prima lectione Algebrae Speciosa,  
tres tabulas triangulares tibi tradidi,  
multiplicium, & proportionalium, &  
nominum nuncupatas: earumque  
usum, ad componendas, & relin-  
quendas potestates binomiorum, & per modum ar-  
tis, explicavi. Eius demonstrationem, presenti tra-  
do libello; quam ex me audisti: ut legendo recolas; &  
ad potiora mathemata suscipienda, te prepares. Ni-  
hil alienum sumo; prater quadam, ex Euclide,  
in quinto, & sexto: qua suis locis allego, in margi-  
ne. Vale.



GEO.



3  
ELEMENTVM  
GEOMETRIÆ SPECIOSÆ

ELEMENTVM PRIMVM

DEFINITIONES.

**I**n tabula triangularis, ex vertice, & basibus, & lateribus, ita concipiatur ordinata; ut in vertice sit quædam quantitas; & in prima basi, statim sub vertice, sint duæ quantitates; & in secunda basi, tres; & in tertia, quatuor; & sic deinceps: in singulis basibus, dicentur, quantitates extremæ, Prima, & Ultima; & his proximæ, Secunda, & Penultima; item Tertia, & Tritultima; Quarta, & Quartultima; & deinceps.

2. Unde latus primarum omnium quantitarum, dicetur, Primum; & secundarum, Secundum; & deinceps: ultimarum quoque dicetur, Ultimatum; & penultimarum, Penultimum; & sic deinceps.

3. In singulis quoque lateribus, quantitas, quæ in vertice, aut quæ vertici est proxima, dicetur Prima; & reliquæ

A 2

dein-



deinceps, Secunda, Tertia, Quarta, & sic in infinitum.

4. Quantitas, vnde progressio continuè proportionallium, ordinatur in infinitum, dicetur, Rationalis. & significabitur, caractere  $u$ .

5. Et prima consequens à rationali, dicetur, Radix, vel Potestas prima. & significabitur, caractere cuiusq; litteræ alphabeti.

6. Et reliquæ consequentes, dicentur Potestates radices, Secunda, Tertia, & deinceps, iuxta suum cuiusque ordinem. Et significabitur vnaquæque, eadem litterâ suæ radices, adscriptoque ordinis numero. vt radices  $a$ , secunda potestas  $a^2$ , tertia  $a^3$ , & sic deinceps.

7. Rationalis, licet nomen ordinis non habeat inter potestates; tamen habebitur pro ordinata: & dicetur, vni-  
tate minùs ordinata, quàm sit prima potestas.

8. Si tabulæ triangularis in vertice, fuerit rationalis; & in prima basi, duæ fuerint radices, prior, in primo latere, & posterior, in vltimo; & deinceps in primo latere, fuerint ordinatæ potestates prioris radices, & in vltimo, potestates posterioris: fuerint autem, & in reliquis lateribus secundo, tertio, & deinceps in singulis, ordinatæ continuè proportionales, in eadem ratione primi lateris; item in penultimo, tritultimo, & reliquis deinceps lateribus, in singulis, ordinatæ fuerint continuè proportionales, in eadem ratione vltimi lateris: & in singulis basibus, fuerint ordinatæ continuè proportionales, in eadem ratione radicum; in secunda basi, tres, quarum extremæ sunt secunda potestates



states radicum; in tertia, quatuor, quarum extremæ sunt potestates tertiæ, & sic deinceps: dicetur Tabula Proportionalium. *Huiusmodi tabulam ordinat Euclides in 2. 8. Elementorum.*

9. In tabula proportionalium, inter extremas, una quælibet media, ad quam rationalis habuerit rationem compositam ex duabus rationibus, ad quasdā potestates utrarumque radicum; denominabitur ab utrisque ordinibus potestatum, à priori primū, deinde à posteriore. & significabitur, ex utrisque characteribus, caractere composito; ex priori primū, deinde ex posteriore. Ut si prior est radix  $a$ , posterior  $r$ ; media, ad quam  $u$ , rationem habet compositam, ex rationibus,  $u$  ad  $a$ , &  $u$  ad  $r$ , dicetur, Vni prima; & significabitur, caractere  $ar$ : ad quam verò  $u$ , rationem habet compositam ex rationibus,  $u$  ad  $a^2$ , &  $u$  ad  $r^3$ , dicetur, Bitertia; & significabitur caractere  $a^2r^3$ : & sic deinceps.

10. Si tabulæ triangularis in vertice, fuerit vnitas; & in prima basi, & in lateribus primo, & ultimo, fuerint unitates; deinceps verò in basibus, quæ versus verticem sibi insistant, quasi fronti cornua, dicetur, Tabula multiplicium.

11. Si duæ tabulæ, multiplicium, & proportionalium, ita coaptentur, vertex, vertici, & latera, lateribus, & bases, basibus, ut congruant; idest, ut quisque numerus multiplex, congruentem multiplicet proportionalem: producta, dicetur, Tabula Nominum. Significabitur autem, vnumquodque nomen, eodem suæ proportionalis caractere,



tere, post suum immediatè numerum conscripto.

12. In quibusque proportionalitatibus earundem, vel non earundem rationum; homologæ sunt primùm, antecedentes, antecedentibus, & consequentes, consequentibus: deinde permutando, antecedentes suis consequentibus sunt homologæ: homologarum quoque æquemultiplices, & eadem partes, & summae, & differentia, sunt homologæ.

13. Homologia, est sumptio homologarum, vt & in alia quadam proportionalitate, fiant homologæ.

14. Ratio ex æquali, dicetur, quælibet ratio, ex rationibus composita.



Ta-



Tabula Proportionalium.

|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| a2  | ar   | r2   | a    |
| a3r | a2r2 | ar3  | r4   |
| a4  | a3r  | a2r2 | ar3  |
| a5r | a4r  | a3r2 | a2r3 |
| a6  | a5r  | a4r2 | a3r3 |

Tabula Multiplicium.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Tabula Nominum.

|    |      |        |        |
|----|------|--------|--------|
| a3 | 3a2r | 3ar2   | r3     |
| a4 | 4a3r | 6a2r2  | 4ar3   |
| a5 | 5a4r | 10a3r2 | 10a2r3 |
| a6 | 6a5r | 15a4r2 | 20a3r3 |

Ex-



*Explicationes quarundam notarum.*

Additio significabitur, caractere crucis: vt ex  $a$ , &  $r$ , collecta summa,  $a + r$ .

Subtractio, caractere lineolæ: vt ex  $t$ , dempta  $a$ , relinquit differentiam,  $t - a$ .

Æqualitas, ea interpunctione significabitur, qua partes principes periodi solent distingui. vt quod  $a + r$ , est æqualis ipsi  $t$ ,

$$a + r : t.$$

Ratio significabitur interpunctione, qua maximæ partes periodi subdistinguuntur; scilicet puncto, & commate. vt ratio  $a$  ad  $r$ , scribendo,

$$a ; r.$$

Itaque proportio  $a$  ad  $r$ , sicut  $a2$  ad  $ar$ , significabitur, scribendo,

$$a ; r : a2 ; ar.$$

Et composita ratio ex rationibus. velut ex  $u$  ad  $a2$ , &  $u$  ad  $r3$ , composita  $u$  ad  $a2r3$ , scribendo,

$$u ; a2, + u ; r3 : u ; a2r3.$$

vbi comma, inter  $a2$ , & crucem, vtiliter distinguit, ad significandum, non quantitatam  $a2$ , &  $u$ , summam  $a2 + u$ , sed rationum.

Multiplicata quoque ratio, significabitur. velut  $a3$  ad  $r3$ , triplicata rationis  $a$  ad  $r$ , scribendo,

$$a3 ; r3 : triplicata a ; r.$$

Thea



# PRIMUM.

*Theorema primum, Propositio prima.*

**E**X iisdem rationibus, ex æquali, sunt eadem rationes.

*Hypothesis.*

$a; b; c; d.$

$e; f; g; h.$

Dico ex æquali  $a; b, + e; f; c; d, + g; h.$

*Preparatio.*

$e; f; b; i.$

$g; h; d; l.$

*Demonstratio.*

11.5.  $b; i; d; l$

22.5.  $a; i; c; l$

def. 5.6.  $a; b, + e; f; a; i.$

def. 5.6.  $c; d, + g; h; c; l.$

11.5.  $a; b, + e; f; c; d, + g; h.$  Quod erat demonstrandum.

Quare ex iisdem rationibus, ex æquali, sunt eadem rationes.

*Theor. 2. Prop. 2.*

**Q**uantitates proportionales, per homologiam sunt proportionales.

*Demonstr.*

def. 6.5.

12. & 24.5.

15.5

16.5

17.5

18.5

Nam conuertendo, quantitates fiunt proportionales: item homologas homologis addendo: item æque multiplicando, & æque partiendo: & permutando: & diuidendo: & com-

B

po-



19.5

22.5

ponendo: & homologas ab homologis auferendo; & per conuerſionē rationis: & ex æquali in proportionē ordinata: coniunctisq; omnifariam huiusmodi argumentis, quocunque ordine, per homologiam, proportionales fiunt. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 3. Prop. 3.*

**P**otestates æqueordinatæ totuplicatam habent rationem radicū, quotus est ordo.

*Hypoth.*

Sint radices,  $a, r$ : quarum potestates æqueordinatæ,  $a_3, r_3$ : numerus ordinis, 3.

Dico  $a_3; r_3$ : triplicatam  $a; r$ .

*Demonstrat.*

def. 6. |  $a_3; u$ : triplicata  $a; u$ .

def. 6. |  $u; r_3$ : triplicata  $u; r$ .

p. h. |  $a_3; r_3$ : triplicata  $a; r$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 4. Prop.*

**S**i tabulæ triangularis in vertice fuerit rationalis; & in prima basi, fuerint duæ radices; & in primo, & ultimo latere, fuerint continuè proportionales; & in singulis basibus, ordinatæ fuerint continuè proportionales: erit proportionalium tabula.

*De-*



*Demonstr.*

Cum enim in prima basi sint radices : erunt in  
*def. 6.* secunda basi extremæ, secundæ potestates; dupli-  
*3. h.* catam habentes rationem radicum : quæ & dupli-  
*def. p.* catam habent rationem deinceps : ergo ratio ra-  
*11. 5.* dicum eadem est, quæ deinceps. Eodemque mo-  
 do, in singulis basibus, ostendetur, quod ratio ra-  
 dicum eadem est, quæ deinceps. Quare ut in pri-  
 ma basi, ita in secunda, & reliquis, eadem semper  
 est ratio primæ quantitatis ad secundam, & secun-  
 dæ ad terciã, & sic deinceps; item penultimæ ad vl-  
 timam, & tritultimæ ad penultimã, & sic deinceps.  
 Itaque in binis deinceps lateribus, & in binis deinceps  
 basibus, quantitates eandem habent rationem  
*16. 5.* radicum, antecedentes, in vno, & consequentes, in  
 altero latere : ergo permutando, eandem habent  
 rationem, antecedentes, in vna, & consequentes, in  
 altera basi : & ut in primo latere sunt continuè pro-  
 portionales, ut rationalis ad priorem radicem; ita  
 in secundo, & in tertio, & in reliquis deinceps, in  
 eadem sunt ratione continuè proportionales : &  
 ut in ultimo, sunt continuè proportionales, ut ra-  
 tionalis ad posteriorem radicem; ita in penultimo,  
*def. 8.* & tritultimo, & in reliquis deinceps. Quare tabula  
 triangularis, est tabula proportionalium. Quod &c.  
 Quare &c.



*Theor. 5. Prop. 5.*

**S**I tabulæ triangularis in vertice, fuerit rationalis; & in prima basi, fuerint duæ radices; & in primo, & ultimo latere, fuerint continuè proportionales; & in singulis lateribus à primo, fuerint ordinatæ continuè proportionales, in eadem ratione, quæ deinceps, in primo: erit proportionalium tabula. Item si in singulis lateribus ab ultimo, fuerint ordinatæ continuè proportionales, in eadem ratione, quæ deinceps, in ultimo: erit proportionalium tabula.

*Demonstr.*

36. 5. Cum in binis deinceps basibus, & in binis deinceps lateribus à primo, quantitates eandem habeant rationem, quæ deinceps, in primo, antecedentes, in vna, & consequentes, in altera basi: habebunt, permutando, eandem rationem etiam, antecedentes, in vno, & consequentes, in altero latere: eritque in basibus, ratio deinceps, eadem, quæ in prima basi: eruntque in singulis basibus, continuè proportionales in eadem ratione radicis: quare tabula triangularis, erit proportionalium tabula. Quod &c.

4. b. Simili prorsus demonstratione, ostendetur altera pars Theorematis. Quam &c.

Quare &c.

---

*Theor.*



**I**N tabula proportionalium, rationalis ad vnamquamq; mediam, habet rationem cōpositam ex rationibus, ad potestatem, in primo latere, vnitatem minùs ordinatam, quàm sit ipsa media, in basi, ab vltima; & ad potestatem, in vltimo latere, vnitatem minùs ordinatam, quàm sit ipsa media, in basi, à prima.

*Hypoth. & Demonst.*

def. p. Sit in tabula proportionalium, quinta basis; in qua, sex proportionales: & sit vna ex medijs, non prima, quæ est sextultima, nec sexta, quæ est vltima, sed quarta, quæ est tritultima. Et sint, in primo latere, radix  $a$ ; & in vltimo, radix  $r$ : & ab  $a$ , sit secunda potestas  $a^2$ , vnitatem minùs ordinata, quàm tritultima; quæ profecto in primo latere, est  
def. 8. tertia; & in tritultimo, est prima: sit etiam ab  $r$ ,  
def. 3. tertia potestas  $r^3$ , vnitatem minùs ordinata, quàm quarta; quæ profecto, in vltimo latere, est quar-  
def. 8. ta; & in quarto, prima: erit quantitas  $a^2r^3$ ,  
def. 3. bitertia, ad quam, rationalis habet rationem com-  
def. 9. positam ex rationibus, ad potestates  $a^2$ , &  $r^3$ .

Dico mediam, in quinta basi, quartam tritultimam, esse bitertiam  $a^2r^3$ .

*Demonstr.*

def. 2. Nam quarta, & tritultima, in quarto est, & in tritultimo latere: in quarto quidem, est tertia quantitas; & in tritultimo, est quarta. Habet ergo



go rationalis ad tertiam quarti lateris, rationem  
 compositam ex rationibus, ad  $r3$  primam quar-  
 ti lateris, & primæ quarti lateris ad tertiam: sed  
 def. 8. prima quarti lateris ad secundam, & secunda ad  
 tertiam, sunt continuè proportionales, vt prima  
 primi lateris ad secundam, & secunda ad tertiam:  
 p. b. ideoque prima ad tertiam quarti lateris, est vt pri-  
 ma  $u$ , ad tertiam primi  $a2$ : ergo rationalis ad ter-  
 p. b. tiam quarti lateris, idest, ad quartam tritultimam,  
 in quinta basi, rationem habet compositam ex  
 rationibus,  $u$  ad  $r3$ , &  $u$  ad  $a2$ ; eandem, quam  
 9. 5. habet ad  $a2r3$  bitertiam. Ergo in quinta basi,  
 quarta tritultima, est bitertia  $a2r3$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 7. Prop. 7.*

**Q**uantitas, ad quam rationalis habet rationem com-  
 positam, ex rationibus ad potestates, in primo, &  
 ultimo latere tabulæ proportionalium; est media:  
 & est in basi æqueordinata, atque summa est ordinum po-  
 statum: & est vnitate plus ordinata, in basi, ab vltima,  
 quàm sit ordo potestatis, in primo latere: item est vnitate  
 plus ordinata, in basi, à prima, quàm sit ordo potestatis, in  
 ultimo latere.

*Hypoth.*

Sit quantitas  $a2r3$ , ad quam  $u$ , rationem habet com-  
 positam, ex rationibus,  $u$  ad  $a2$ , in primo latere, &  $u$   
 ad



ad  $r_3$ , in ultimo, tabulae proportionalium: quarum potestatum summa ordinum, sit ordo quintae basis: & quarum potestatum, unitate maiores ordines, eius quidem  $a_2$ , quae in primo est latere, sit ordo tritultima, & eius  $r_3$ , quae in ultimo est latere, sit ordo quarta, in basi.

Dico  $a_2r_3$ , esse quartam tritultimam, in quinta basi.

*Demonstr.*

Est enim  $a_2$ , tertia in primo latere; & ut  $u$  ad  $a_2$ , ita est, in quarto latere, prima ad tertiam: sed est  $r_3$ , prima in quarto latere: ergo  $u$  ad tertiam in quarto latere, rationem habet compositam, ex rationibus, ad  $a_2$ , & ad  $r_3$ ; eandem, quam ad  $a_2r_3$ . Ergo  $a_2r_3$ , est tertia in quarto latere: ergo est quarta in tritultimo: ergo in sua basi, est quarta tritultima: sed quarta tritultima non est, nisi inter sex proportionales, quarum & sexta est ultima, & quinta est penultima, & sic deinceps: & sex proportionales, non nisi in quinta sunt basi. Ergo  $a_2r_3$  bitertia, est & quarta tritultima, in quinta basi. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 8. Prop. 8.*

**S**umma cuiusque basis nominum in tabula, est potestas aequaeordinata summae radicum.

*Hy-*



*Hypoth.*

Sit in tabula nominum basis tertia, cuius summa nominum  $a^3 + 3a^2r + 3ar^2 + r^3$ : sit quoque summa radicum  $a+r$ .

Dico  $a^3 + 3a^2r + 3ar^2 + r^3$ , esse tertiam potestatem  $a+r$ .

Oportet autem prius demonstrare, de summa nominum, praecedentium basium, videlicet, secundae basis.

Dico itaque primò  $a^2 + 2ar + r^2$ , secundam esse potestatem  $a+r$ .

*Demonstr.*

def. 8.  $u; a: a; a^2: r; ar: a+r; a^2 + ar.$

& 2. h.  $u; r: a; ar: r; r^2: a+r; ar + r^2.$

2. h.  $u; a+r: a+r; a^2 + 2ar + r^2.$

$a^2 + 2ar + r^2$ , est secunda potestas  $a+r$ .

Quod &c.

def. 8.  $u; a: a^2; a^3: ar; a^2r: r^2; ar^2: a^2 + 2ar$

& 2. h.  $+ r^2; a^3 + 2a^2r + ar^2.$

$u; r: a^2; a^2r: ar; ar^2: r^2; r^3: a^2 + 2ar + r^2; a^2r + 2ar^2 + r^3.$

2. h.  $u; a+r: a^2 + 2ar + r^2; a^3 + 3a^2r + 3ar^2 + r^3.$

def. 6.  $a^3 + 3a^2r + 3ar^2 + r^3$ , est tertia potestas  $a+r$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theo-*



*Theor. 9. Prop. 9.*

**S**itrium quantatum, prima maior fuerit, quàm secun-  
da; tertia autem maior fuerit excessu ipsarum: excelsus  
tertiæ, supra excessum primæ, & secundæ; erit excessus  
summæ ex secunda, & tertia, supra primam.

*Hypoth.*

E      A      C      B      D  
|——|——|——|——|——|

Sit prima quantitas AB, maior, quàm secunda BC, qua-  
rum excessus CA: sitq; tertia D, maior, quàm CA.

Dico excessum D, supra CA, esse excessum summæ,  
ex D, & BC, supra BA.

*Præpar.*

Adponatur penes CB, & ipsi CA superponatur quanti-  
tas CE, æqualis ipsi D.

*Demonstr.*

Quoniam EA, est excessus EC supra CA; idest, excelsus  
D, supra CA: necnon est excessus EB, supra BA; idest,  
summæ ex D, & BC, supra BA: per se patet, id quod pro-  
positum est.

Quare &amp;c.

*Theor. 10. Prop. 10.*

**I**n æqualium radicum, potestas maioris, vnà cum alter-  
nis nominibus eiusdem basis, demptis reliquis, æqueor-  
dinata relinquitur potestas differentiæ.

C

Hy-



*Hypoth.*

Sint radices inæquales,  $t$  maior,  $a$  minor: quarum in tabula nominum, in basi tertia, potestas tertia maioris radicis  $t^3$ , vnà cum alterno nomine  $3ta^2$ , demptis reliquis nominibus  $3t^2a$ , &  $a^3$ , relinquitur quantitas  $t^3 - 3t^2a + 3ta^2 - a^3$ ; sit autem differentia radicum  $t - a$ .

Dico  $t^3 - 3t^2a + 3ta^2 - a^3$ , potestatem tertiam esse  $t - a$ .

Oportet autem priùs demonstrare, in basibus præcedentibus, videlicet in secunda.

Dico itaque primò  $t^2 - 2ta + a^2$ , esse secundam potestatem  $t - a$ .

*Demonstr.*

def. 8. |  $u; t: t; t^2: a; ta: t - a; t^2 - ta.$

& 2. h. |  $u; a: t; ta: a; a^2: t - a; ta - a^2.$

|  $t; a: t^2; ta: ta; a^2: t^2 - ta; ta - a^2.$

ex 14.5 |  $ta$ , est maior, quàm  $a^2$ .

|  $t^2 - ta$ , est maior, quàm  $ta - a^2$ .

9. h. |  $t^2 - ta$ , dempta  $ta - a^2$ , relinquitur  $t^2 - 2ta + a^2$ .

2. h. |  $u; t - a: t - a; t^2 - 2ta + a^2.$

def. 6. |  $t^2 - 2ta + a^2$  secunda est potestas  $t - a$ .

Quod &amp;c.

def. 8. |  $u; t: t^2; t^3: ta; t^2a: a^2; ta^2: t^2 - 2ta + a^2;$

& 2. h. |  $t^3 - 2t^2a + ta^2.$

|  $u; a: t^2; t^2a: ta; ta^2: a^2; a^3: t^2 - 2ta + a^2;$   
 $t^2a - 2ta^2 + a^3.$

 $t; a:$



# PRIMUM.

19

2. h.  $t; a: t_3 - 2t_2a + ta_2, t_2a - 2ta_2 + a_3.$   
 ex 14.5  $t_2 - 2t_2a + ta_2, \text{ maior est, quàm } t_2a - 2ta_2 + a_3.$   
 25. 5.  $t_2a + a_3, \text{ maior, quàm } 2ta_2.$   
 9. h.  $t_3 - 2t_2a + ta_2, \text{ dempta } t_2a - 2ta_2 + a_3,$   
 relinquitur  $t_3 - 3t_2a + 3ta_2 - a_3.$   
 2. h.  $u; t - a: t_2 - 2ta + a_2; t_3 - 3t_2a + 3ta_2 - a_3.$   
 def. 6.  $t_3 - 3t_2a + 3ta_2 - a_3, \text{ tertia est potestas } + -$   
 a. Quod &c.  
 Quare &c.



C 2

Pe





Petrus Mengolus, Adm. R. D. Iacobo Venturolo,  
Scholarum Piarum Primario Arithmetices  
Præceptori S. D.





*Vos tibi primum ostendi characteres, & numeros, libenter vidisse te significasti, & cum tua Schola profectu multiplicibus exemplis confirmasti. Immortales tibi ante omnia gratias debeo, quod mea qualiacunque inuenta respexeris, & in tua Schola fructum conuerteris. Itaque pro redditione gratiarum, eandem rem tibi aliquando gratam, iterum & plenius communico. Tu ergo libellum hunc in tuos usus ita conuerteres. Primum per numerosam inductionem exemplorum, duo theoremata confirmabis præcedentis libelli, 8. & 10. quibus ars producendi potestates à duorum nominum aggregatis, vel relictis radicibus demonstratur. deinde singula in præsentis libello proposita. necnon alia plura, quæ tùm indico, tùm ipse tuo opte poteris ingenio adijcere. Vale.*

GEO.



# GEOMETRIÆ SPECIOSÆ ELEMENTVM SECVNDVM.

## DEFINITIONES.

1.  Vantitas vtcunque diuifa in duas partes, dicetur, Tota, & significabitur, caractere *t*.
2.  Et partes Totæ, dicentur, Abscissa, & Residua: & significabitur abscissa, caractere *a*; & residua, *r*.

3. Potestates totæ, dicentur, Tota secunda, *t2*; Tota tertia, *t3*; & deinceps: & potestates abscissæ dicentur, Abscissa secunda, *a2*; Abscissa tertia, *a3*; & deinceps: item potestates residuæ, dicentur, Residua secunda, *r2*; Residua tertia, *r3*; & deinceps.

4. Si quadam quantitate, diuifa vtcunque in partes, abscissam, & residuam; concipiatur à rationali, per ipsas partes, abscissam primùm, deinde residuam, ordinata proportionalium tabula: & eadem quantitate rursus diuifa vtcunque; concipiatur ab eadem rationali, altera proportionalia-



tionalium tabula: quantitates, quarum in vtrisque eadem appellationes, & iidem characteres; dicentur, inuicem Synonymæ.

5. Item synonymarum æquemultiplices, dicentur, Synonymæ.

6. Ideoq; si etiam tabulæ nominum fuerint ordinate; quantitates; quarum eadem sunt nomina, dicentur Synonymæ.

7. Vnitas ad omnes numeros, pro rationali semper habebitur. Vnde conuenienter significabatur rationalis, caractere *u*.

8. Cuiusque numeri, factis omnibus integris abscissionibus, omnium, totidemque synonymorum, summa, dicetur, Massa: & significabitur, littera maiuscula *O*, ante synonymorum characterem scripta: vt massa ex omnibus abscissis, *O. a.* & massa ex omnibus triplis biprimis, *O. 3a2r.*

9. Si cuiusque numeri, factis partibus, fuerit ordinata quædam tabula proportionalium, vel nominum; & loco cuiuslibet proportionalium, concipiatur massa suorum synonymorum: transformabitur tabula proportionalium in aliam, quæ dicetur, Tabula Speciosa.

10. In qua ordinatæ quantitates, dicentur, Species.

11. Tabula verò nominum transformabitur in aliam, quæ dicetur, Tabula Subquadratrix.

12. In qua ordinatæ quantitates, dicentur Subquadratrices.

13. Si



13. Si quælibet subquadratrix quantitas, multiplicata fuerit per numerum vnitatem maiorem; quàm sit ordo suæ basis: producta quantitas, dicetur, Quadratrix.

14. Quod si, velut ex subquadratricibus, ita ex quadratricibus, tabula fuerit ordinata; dicetur Tabula Quadratrix.

15. Si duorum numerorum duæ speciosæ tabulæ fuerint ordinatæ: massæ, quarum in vtriusque sunt eadem appellationes, & iidem characteres, dicentur inuicem Homonymæ.

16. Item homonymarum massarum æquemultiplices, dicentur, Homonymæ.

17. Ideoque etiam in duabus subquadratricibus tabulis, aut in duabus quadratricibus, massæ, dicentur, Homonymæ.

18. Si tres numeri fuerint deinceps vnitatem differentes; & medius dicatur, tota: maior quidem, dicetur, Sesequitota; & significabitur, characterē *q*.

19. Minor verò, Semitota: & significabitur, characterē *m*.

20. Et sicut medij numeri potestates dicuntur totæ, secunda, tertia, & deinceps: ita maioris numeri potestates, dicentur, Sesequitotæ; secunda *q2*, tertia *q3*, & deinceps.

21. Minoris autem, Semitotæ; secunda *m2*, tertia *m3*, & deinceps.

22. Et sicut medij numeri dicuntur Massæ, Species, Subquadratrices, & Quadratrices: ita maioris numeri, di-

cen-



24 ELEMENTVM  
centur, Sesquimassæ, Sesquispecies, Sesquisubquadratri-  
ces, & Sesquiquadratrices.

23. Et minoris, dicentur, Semimassæ, Semispecies, Se-  
misubquadratrices, & Semiquadratrices.

24. Item, sicut totæ incrementum, est vnitas, ad com-  
ponendam sesquitotam; & decrementum, est vnitas, ad  
relinquendam semitotam: ita cuiuslibet totæ, dicetur, In-  
crementum, numerus addendus, ad componendam ses-  
quitotam æqueordinatam.

25. Et Decrementum, subtrahendus, ad relinquendam  
semitotam æqueordinatam.

26. Item cuiuslibet massæ Incrementum, dicetur, suf-  
ficiens numerus, ad componendam homonymam sesqui-  
massam.

27. Et Decrementum, ad relinquendam homony-  
mam semimassam.



Ta



# SECUNDVM

25

## Tabula Speciosa.

O.u  
O.a O.r  
O.a2 O.ar O.r2  
O.a3 O.a2r O.ar2 O.r3  
O.a4 O.a3r O.a2r2 O.ar3 O.r4  
O.a5 O.a4r O.a3r2 O.a2r3 O.ar4 O.r5

## Tabula Subquadratrix.

O.u  
O.a O.r  
O.a2 O.2ar O.r2  
O.a3 O.3a2r O.3ar2 O.r3  
O.a4 O.4a3r O.6a2r2 O.4ar3 O.r4  
O.a5 O.5a4r O.10a3r2 O.10a2r3 O.5ar4 O.r5

## Tabula Quadratrix.

O.u  
O.2a O.2r  
O.3a2 O.6ar O.3r2  
O.4a3 O.12a2r O.12ar2 O.4r3  
O.5a4 O.20a3r O.30a2r2 O.20ar3 O.5r4  
O.6a5 O.30a4r O.60a3r2 O.60a2r3 O.30ar4 O.6r5

## Postulatum unicum.

Postuletur, vt massam assumere concedatur homonymam, & proportionalem ad propositam quamdam, sicut numeri, aut vnitas ad inuicem.

D

Theor.



*Theor. 1. Prop. 1.*

**I**N tabula speciosa, cuiusque numeri, & in qualibet basi, species prima, & vltima, sunt æquales; item secunda, & penultima; tertia, & tritultima; & sic deinceps: item sesquiespecies; & semispecies homonymæ: & specierum incrementa, & decrementa. Similiter subquadratrices, in sua tabula: & quadratrices, in sua.

*Hypoth. 1.*

Sint in tabula speciosa, cuiusq; numeri, & in tertia basi, prima species  $O.a_3$ , & vltima  $O.r_3$ .

Dico,  $O.a_3$ ,  $O.r_3$ , esse æquales.

*Demonstr.**def. 8. b.*

Nā cuiusq; numeri, quot sunt abscissiones, tot sunt abscissæ, totidemq; residuæ: & abscissæ sunt, vnitas, binarius, & deinceps; & residuæ sunt, totidem ordinati, contrario tamen ordine, sed deinceps, vsque ad binarium, & vnitatem. Quare vnaquæq; abscissa, vni residuæ est æqualis: & abscissa tertia, residuæ tertiæ; ad quas eadem rationalis, triplicatas habet easdem rationes: & omnes abscissæ tertiæ, omnibus residuis tertijs sunt æquales; idest,  $O.a_3$ ,  $O.r_3$ , sunt æquales. Quod &c.

*p. p.**Hypoth. 2.*

Sint deinde, in eadē tertia basi, secunda species  $O.a_2r$ , & penultima  $O.ar_2$ .

Dico,  $O.a_2r$ ,  $O.ar_2$ , esse æquales.

De



*Demonstr.*  
<sup>sup.</sup> Singulæ  $a$ , singulis  $r$ , sunt æquales: & singulæ  $a_2$ , singulis  $r_2$ : item singulæ biprimæ  $a_2r$ , singulis vnifecundis  $ar_2$ , sunt æquales; ad quas  $u$ , rationes habet compositas ex iisdem rationibus: quare omnes biprimæ  $O.a_2r$ , omnibus vnifecundis  $O.ar_2$ , sunt æquales. Quod &c.

*Hypoth. 3.*  
 Sint fefquispecies  $O.a_2r$ ,  $O.ar_2$ : vel sint semispecies. Dico,  $O.a_2r$ ,  $O.ar_2$ , esse æquales.

*Demonstratio.*  
<sup>def. 22. b.</sup> Quæ sunt vnus cuiusquam numeri fefquispecies; sunt alius, vnitate maioris numeri species: <sup>sup.</sup> sed species  $O.a_2r$ ,  $O.ar_2$ , sunt æquales: ergo fefquispecies  $O.a_2r$ ,  $O.ar_2$ , sunt æquales. Quod &c.

<sup>def. 23. b.</sup> Item quæ sunt vnus cuiusquam numeri semispecies; sunt alius, vnitate minoris numeri species: <sup>sup.</sup> sed species sunt æquales: ergo & semispecies. Quod &c.

Dico  $O.a_2r$ , &  $O.ar_2$  incrementa esse æqualia, & decrementa æqualia.

*Demonstr.*  
<sup>sup.</sup> Nam ab æqualibus speciebus  $O.a_2r$ ,  $O.ar_2$ , æquales demptæ semispecies homonymæ, relinquunt æqualia decrementa. Quod &c.

<sup>sup.</sup> Et ab æqualibus fefquispeciebus, æquales dem-



demptæ species homonymæ, relinquunt æqualia incrementa. Quod &c.

*Hypoth. 4.*

Sint in tabula subquadratrice, in tertia basi, subquadratrices, secunda  $O.3a2r$ , & penultima  $O.3ar2$ .

Dico  $O.3a2r$ ,  $O.3ar2$ , esse æquales.

*Demonstr.*

*def. 10. p.* | Quoniam in tabula multipliciū, in tertia basi, secundus numerus 3, & penultimus 3, ex iisdem vtrisque unitatibus, & numeris aggregati, sunt æquales: æquemultiplicant species æquales,  $O.a2r$ ,  $O.ar2$ ; & subquadratrices producunt æquales,  $O.3a2r$ ,  $O.3ar2$ . Quod &c.

Vnde patet, quod & sesquisubquadratrices sunt æquales; & semisubquadratrices æquales; & subquadratricum æqualia sunt incrementa; & æqualia decrementsa. Quæ &c.

*Hypoth. 5.*

Sint denique in tabula quadratrice, in tertia basi, quadratrices, secunda  $O.12a2r$ , & penultima  $O.12ar2$ .

Dico,  $O.12a2r$ , &  $O.12ar2$ , esse æquales.

*Demonstr.*

*def. 13. h.* | Cum sint enim æqualium subquadratricum æquemultiplices; inter se sūt æquales. Quod &c.

Vnde constat, quod & sesquiquadratrices sunt æquales; & semiquadratrices æquales; & quadratricum æqualia sunt incrementa; & æqualia decrementsa. Quæ &c.

Quare &c.

*Theor.*



*Theor. 2. Prop. 2.*

**I**N tabula speciosa, cuiusque numeri, in duobus quibusque lateribus, una species, habet pro incremento, massas aggregatas, in utrolibet latere, si quæ sunt præcedentes, atque totam unitate minùs ordinatam, quàm sit ipsum latus: massas inquam, multiplicatas per numeros tabulæ multiplicium, in basi acceptos, unitate minùs ordinata, quàm sit alterum latus.

*Hypoth. 1.*

Esto in tabula speciosa, in primo, & in quintultimo latere, species  $O. a4$ : quam in quintultimo latere primam, nullæ species præcedunt: & esto quarta tota  $t4$ .

Dico  $O. a4$ , incrementum esse  $t4$ .

*Demonstrat.*

*def. 18. h.* Eadem abscissiones totæ, quibus unitas, binarius, & deinceps abscinduntur; etiam sesquitotæ, sunt abscissiones: & eadem utrarumque sunt abscissæ; necnon abscissæ quartæ. Sed præter abscissiones totæ, una est ulterior abscissio sesquitotæ, qua ipsa tota abscinditur: & pro qua post abscissas quartas totæ, & sesquitotæ communes, *def. 26. h.* accedit tota quarta, sesquitotæ propria: quæ speciei  $O. a4$ , est incrementum, ad sesquispeciem componendam. Quod &c.

*Hypoth. 2.*

Esto in tabula speciosa, in quarto, & in ultimo latere, species  $O. r3$ : quam in ultimo latere

quar-



quartam, species præcedunt, tertia  $O.r2$ , secunda  $O.r$ , prima  $O.u$ : & esto tota vnitate minùs ordinata, quàm sit vltimum latus: quæ profectò, in ordine continuè proportionalium totarum, est ipsa rationalis, atq; vnitas  $u$ . Et quoniam  $O.r3$ , est & in quarto latere, sumatur basis tabulæ multiplicium, vnitate minùs ordinata, nempe tertia, cuius numeri 3, 3.

Dico  $O.r3$ , incrementum esse,  $O.3r2 + O.3r + O.u + u$ .

*Demonstr.*

Eadem abscissiones, totæ sunt, & sesquiotæ: pro quibus vna pars incrementi  $O.r3$  taxabitur. Præter abscissiones totæ, vna est vltior abscissio sesquiotæ, pro qua pars altera eiusdem incrementi taxabitur. Rursum prima pars incrementi, tot ex partibus componitur, quot sunt abscissiones, totæ, & sesquiotæ communes.

Est autem pro vna abscissione, totæ, & sesquiotæ, communi, eadem quidem abscissa, sed non eadem residua. Cumque totæ residua est  $r$ , sesquiotæ residua est  $r + u$ : quoniam & ipsa sesquiotota vnitate maior est, quàm tota. Cum ergo totæ residua tertia est  $r3$ ; sesquiotæ est,  $r3 + 3r2u + 3ru2 + u3$ . Et quoniam ratio æqualitatis, quantumlibet multiplicata, semper est eadem: & quantumlibet composita, non variat rationes, quibuscum componitur: huiusmodi autem

tem



def. p. p. | tem est  $u$  ad  $u$ , ad  $u_2$ , ad  $u_3$ : eadem ergo  
 - inoffi | quantitas est  $u_3$ , atque  $u$ : &  $3ru_2$ , quæ  $3r$ : &  
 - inoffi |  $3r_2u$ , quæ  $3r_2$ : &  $r_3 + 3r_2u + 3ru_2 + u_3$ ,  
 - nemori | quæ  $r_3 + 3r_2 + 3r + u$ . & sesquitotæ residua  
 - resumi | tertia, est  $r_3 + 3r_2 + 3r + u$ . Sed totæ resi-  
 - de: resu | dua tertia, est  $r_3$ : ergo cuiusque residuæ incre-  
 - morali | mentum est  $3r_2 + 3r + u$ . Et omnium residua-  
 - | rum, idest,  $O.r_3$ , omnia incrementa sunt  $O.3r_2$   
 - | +  $O.3r + O.u$ : totidem, quot sunt abscissiones  
 - | communes, totæ, & sesquitotæ: & pars prima  
 - | incrementi taxanda.

Pro vltiori abscissione propria sesquitotæ, tota fit ab-  
 scissa, cuius residua vnitas: & massæ  $O.r_3$ , vltior residua  
 fit  $u_3$ , idest  $u$ : pars altera incrementi taxanda. Quibus  
 ex partibus, totum componitur incrementū speciei  $O.r_3$ ,  
 quod est,  $O.3r_2 + O.3r + O.u + u$ . Quod &c.

*Hypoth. 3.*

Esto in tabula speciosa, in quarto, & in quintultimo la-  
 tere, species  $O.a_4r_3$ : quam in quintultimo latere præce-  
 dunt species,  $O.a_4r_2$ ,  $O.a_4r$ ,  $O.a_4$ : & esto tota  $t_4$ , vni-  
 tate minùs ordinata, quàm sit latus quintultimum: & esto  
 basis tertia multiplicium, vnitae minùs ordinata, quàm sit  
 latus quartum; in qua basi, numeri sunt 3, & 3.

Dico  $O.a_4r_3$ , incrementum esse,  $O.3a_4r_2 + O.3a_4r$   
 +  $O.a_4 + t_4$ .

De



*Demonstr.*

Pro communibus enim totæ, & sesquitotæ abscissionibus; vna est pars incrementi: & pro abscissione vltiori, propria sesquitotæ; est altera. Et prioris partis incrementi, tot sunt particulæ, quot sunt abscissiones communes; nempe, quot abscissæ, quot residuæ, quot quadrtertiae: & singulæ particulæ, singula sunt incrementa quadrtertiarum totæ, ad componendas quadrtertias sesquitotæ.

Porro totæ, & sesquitotæ, pro eadem abscissione, eadem est abscissa; sed non eadem residua: & eadem est abscissa quarta; sed non eadem residua tertia. cumque residua tertia totæ, est  $r_3$ ; residua tertia sesquitotæ, est  $r_3 + 3r_2 + 3r + u$ : & cum quadrtertia totæ, est  $a_4r_3$ ; quadrtertia sesquitotæ est  $a_4r_3 + 3a_4r_2 + 3a_4r + a_4$ : & incrementum quadrtertiae, totæ, ad componendam quadrtertiam sesquitotæ, est  $3a_4r_2 + 3a_4r + a_4$ . Et omnia simul incrementa quadrtertiarum totæ, ad componendas omnes quadrtertias sesquitotæ, sunt  $O. 3a_4r_2 + O. 3a_4r + O. a_4$ , prior pars incrementi  $O. a_4r_3$ .

Pro vltiori abscissione propria sesquitotæ, abscissa est  $t$ , residua  $u$ : & abscissa quarta  $t_4$ , residua tertia  $u_3$ : & quadrtertia vltior propria sesquitotæ, est  $t_4u_3$ , vel  $t_4$ : & est posterior pars incrementi  $O. a_4r_3$ . Ex quibus partibus integrum componitur incrementum  $O. a_4r_3$ , quod est,  
 $O. 3a_4r_2$



$O. 3a4r2 + O. 3a4r + O. a4 + t4$ . Quod &c.

*Hypoth. 4.*

Est in tabula speciosa, in quinto, & in quartultimo latere, species  $O. a3r4$ : quam in quinto latere, præcedūt species,  $O. a2r4$ ,  $O. ar4$ ,  $O. r4$ : & esto tota  $t4$ , vnitate minùs ordinata, quàm sit latus quintum: & esto basis tertia multiplicium, vnitate minùs ordinata, quàm sit latus quartultimum; in qua basi sunt numeri 3, 3.

Dico  $O. a3r4$ , incrementum esse,  $O. 3a2r4 + O. 3ar4 + O. r4 + t4$ .

*Demonst.*

|       |                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | $O. 3a4r2 : O. 3a2r4$ .                                                                                                                                                                                |
|       | $O. 3a4r : O. 3ar4$ .                                                                                                                                                                                  |
| p. b. | $O. a4 : O. r4$ .                                                                                                                                                                                      |
|       | $O. 3a4r2 + O. 3a4r + O. a4 : O. 3a2r4 + O. 3ar4 + O. r4$ .                                                                                                                                            |
| p. h. | Sed $O. a4r3$ , & $O. a3r4$ æqualia sunt incrementa: & est $O. a4r3$ incrementum $O. 3a4r2 + O. 3a4r + O. a4 + t4$ . Ergo etiam $O. a3r4$ incrementum est $O. 3a2r4 + O. 3ar4 + O. r4 + t4$ . Quod &c. |
| sup.  | Quare &c.                                                                                                                                                                                              |

*Theor. 3. Prop. 3.*

**I**N tabula speciosa, cuiusque numeri, in duobus quibusque lateribus, vna species, habet pro decremento, massas in vno latere præcedentes, multiplicatas per numeros

E

tabu-



tabulæ multiplicium, in basi acceptos, vnitate minùs ordinata, quàm sit alterum latus: proximam quidem massam, & alternas aggregatas; reliquas verò subtractas. Sed si nullæ sunt præcedentes; quòd species in ipso latere sit prima: pro decremento, habet semitotam, vnitate minùs ordinatam, quàm sit alterum latus.

*Hypoth. 1.*

Esto in tabula speciosa, in quinto, & in quartultimo latere, species  $O.a_3r_4$ , quam præcedentes, in quartultimo latere, sunt species,  $O.a_3r_3$ ,  $O.a_3r_2$ ,  $O.a_3r$ ,  $O.a_3$ : quartæ autem basis tabulæ multipliciũ sint numeri 4, 6, 4.

Dico species  $O.a_3r_4$ , decrementum esse  $O.4a_3r_3 - O.6a_3r_2 + O.4a_3r - O.a_3$ .

*Demonstr.*

*def. 19. b* | Eadem abscissiones, quibus vnitas, binarius, & deinceps abscinduntur, etiam semitotæ sunt abscissiones; præter vnã propriam totæ, quæ ipsa abscinditur semitota, & vnitas relinquitur.

*10. p.* | Quantum ad communes attinet abscissiones, cum eadem sint abscissæ, totæ, & semitotæ; non eadem sunt residuæ: cumque totæ residua sit  $r$ ; semitotæ residua est  $r - u$ : & cum totæ residua quarta, sit  $r_4$ ; semitotæ residua quarta est  $r_4 - 4r_3 + 6r_2 - 4r + u$ : cum deniq; totæ triquarta sit  $a_3r_4$ ; semitotæ triquarta est  $a_3r_4 - 4a_3r_3 + 6a_3r_2 - 4a_3r + a_3$ .

Quantum ad non communem attinet abscissionem, si  
resi-



resida vnitas, vnitate minuatur, profectò nihil remanet: eritque  $r$  quidem, vnitas; sed  $r - a$ , nihil: & erit  $r^4$ , vnitas; sed  $r^4 - 4r^3 + 6r^2 - 4r + w$ , nihil: & triquarta quidem totæ, erit  $a^3r^4$ ; sed semitotæ alia vltior quasi triquarta  $a^3r^4 - 4a^3r^3 + 6a^3r^2 - 4a^3r + a^3$ , nihil. Ideoque perinde est, proprias computare semitotæ triquartas, pro communibus; atque vnā amplius adijcere triquartam nullam, pro non communi abscissione. Quare omnes triquartæ, semitotæ, sunt  $O.a^3r^4 - O.4a^3r^3 + O.6a^3r^2 - O.4a^3r + O.a^3$ ; reuera pauciores, quàm ipsius totæ sunt abscissiones; sed perinde æquales, atque si totidem numerarentur. Totæ autem, triquartæ omnes, sunt  $O.a^3r^4$ ; reuera totidem, quot sunt eius abscissiones. Et vtrarumque differentia,  $O.4a^3r^3 - O.6a^3r^2 + O.4a^3r - O.a^3$ , est decrementum speciei  $O.a^3r^4$ . Quod &c.

*Hypoth. 2.*

Esto in tabula speciosa, in quarto, & in quintultimo latere, species  $O.a^4r^3$ : quam præcedentes in quarto latere, sunt species,  $O.a^3r^3$ ,  $O.a^2r^3$ ,  $O.ar^3$ ,  $O.r^3$ : quartæ autem basis tabulæ multiplicium, numeri sunt 4, 6, 4.

Dico speciei  $O.a^4r^3$ , decrementum esse  $O.4a^3r^3 - O.6a^2r^3 + O.4ar^3 - O.r^3$ .

*Demonstr.*

$$p. h. \quad | \quad O.6a^3r^2 : O.6a^2r^3.$$

$$| \quad O.4a^3r : O.4ar^3.$$

$$| \quad O.a^3 : O.r^3.$$

$$| \quad O.4a^3r^3 - O.6a^3r^2 + O.4a^3r - O.a^3 : O.$$

E 2

4a<sup>3</sup>r<sup>3</sup>



p. h.  $4a_3r_3 - O.6a_2r_3 + O.4ar_3 - O.r_3$ .  
 sup. Sed  $O.a_3r_4$ , &  $O.a_4r_3$ , decrementa sunt æqualia : & est  $O.a_3r_4$ , decrementum  $O.4a_3r_3 - 6a_3r_2 + O.4a_3r - O.a_3$  : ergo etiam  $O.a_4r_3$ , decrementum est  $O.4a_3r_3 - O.6a_2r_3 + O.4ar_3 - O.r_3$ . Quod &c.

*Hypoth. 3.*

Esto in quartultimo latere, prima species  $O.a_3$  : & esto semitota tertia  $m_3$ .

Dico, decrementum  $O.a_3$ , esse  $m_3$ .

*Demonstr.*

Pro communibus enim totæ, & semitotæ abscissionibus, eadem vtrarumq; sunt abscissæ, & in proposita specie  $O.a_3$ , residuæ nullæ : pro vltiori verò abscissione, totæ propria, vltima est abscissa, vnitæ minor, quàm tota, id est, semitota  $m$  : & vltima abscissa tertia, propria totæ, est  $m_3$ . Quare speciei  $O.a_3$ , decrementum est  $m_3$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 4. Prop. 4.*

**T**ota quælibet, est æqualis, aggregatis omnibus minus ordinatarum abscissarum speciebus, & vnitati, acceptis secundum numeros multiplices, in basi sibi æqueordinata iacentes.

*Hypoth.*

Esto tota quinta  $15$  ; qua minus ordinatæ abscissæ,  $a_4$ ,  $a_3$ ,  $a_2$ ,  $a$ ,  $u$  ; quarum species,  $O.a_4$ ,  $O.a_3$ ,  $O.a_2$ ,  $O.a$ ,  $O.u$  :



$O.u$ : & esto basis quinta multiplicium, cuius numeri, 5, 10, 10, 5.

Dico  $t5$ :  $O.5a4 + O.10a3 + O.10a2 + O.5a + O.u + u$ .

*Demonstratio.*

$p. h.$  |  $O.a5$ , &  $O.r5$ , æqualia sunt incrementa: quo-  
 $2. h.$  | rum alterum,  $t5$ ; alterum,  $O.5a4 + O.10a3$   
 |  $+ O.10a2 + O.5a + O.u + u$ . Quòd &c.  
 | Quare &c.

*Theor. 5. Prop. 5.*

**D**emonstrare, qualiter acceptis totis, quæque massa est æqualis.

*Methodus Demonstrationis.*

Oportet in demonstrando, procedere, à prioribus basibus tabulæ speciosæ, ad posteriores; & in singulis basibus, ab exterioribus speciebus, ad interiores.

Porro in singulis basibus, pro prima, & vltima specie, vna est demonstratio; item pro secunda, & penultima; pro tertia, & tritultima. Nam, verbi gratia, secunda, qualiter acceptis totis demonstrabitur æqualis; taliter acceptis, æqualis erit etiã penultima: quia constat, secundam, & penultimam, esse æquales.

Sub hoc vno titulo, theorematata conueniunt innumera-  
 bilia: cum enim tabula speciosa, sit producibilis in infinitum, habet massas innumerabiles; idest, semper plures,  
 quàm



quàm quot quisque assignauerit.

Vna tamen est omnium communis methodus demonstrandi, & duo sunt argumenta: vnum, ab æqualibus cuiusdam speciei incrementis; alterum ab æqualibus decrementis.

Pro vltiori methodi enarratione, dabimus triginta sex theoremata; quæ sufficiunt, pro vertice, & basibus tabulæ speciosæ, vsque ad decimam inclusiue: quædam demonstrata per vtrumque argumentum; quædam solùm per alterum; quædam denique sine demonstratione.

1.  $O.u : t - u.$

*Demonstr. 1.*

4. *h.* |  $O.u + u : t.$

|  $O.u : t - u.$  Quod &c.

*Demonstr. 2.*

|  $O.a.$  decrementa sunt æqualia.

3. *h.* |  $O.u : m.$

*def. 19. h.* |  $m : t - u.$

|  $O.u : t - u.$  Quod &c.

2.  $O.2a : t2 - t.$

*Demonstr. 1.*

4. *h.* |  $O.2a + O.u + u : t2.$

|  $O.2a : t2 - O.u - u.$

*sup. 1.* |  $O.u : t - u.$

*p. h.* |  $O.2a : t2 - t.$  Quod &c.

*De-*



*Demonstr. 2.*

$$\begin{array}{l|l}
 3. h. & O.a2, \text{ decrementa sunt } \text{æqualia}. \\
 & O.2a - Ou : m2. \\
 & O.2a : m2 + O.u. \\
 \text{def. 21. h.} & m2 : t2 - 2t + u. \\
 \text{sup. p.} & O.u : t - u. \\
 & O.2a : t2 - t. \text{ Quod \&c.}
 \end{array}$$


---

$$3. O.6a2 : 2t3 - 3t2 + t.$$

*Demonstr. 1.*

$$\begin{array}{l|l}
 4. h. & O.3a2 + O.3a + O.u + u : t3. \\
 & O.6a2 - O.6a + O.2u + 2 : 2t3. \\
 & O.6a2 : 2t3 - O.6a - O.2u - u. \\
 \text{sup. 2.} & O.6a : 3t2 - 3t. \\
 \text{sup. p.} & O.2u : 2t - 2. \\
 & O.6a2 : 2t3 - 3t2 + t. \text{ Quod \&c.}
 \end{array}$$

*Demonstr. 2.*

$$\begin{array}{l|l}
 3. h. & O.a3, \text{ decrementa sunt } \text{æqualia}. \\
 & O.3a2 - O.3a + O.u : m3. \\
 & O.6a2 - O.6a + O.2u : 2m3. \\
 & O.6a2 : 2m3 + O.6a - O.2u. \\
 \text{def. 21. h.} & 2m3 : 2t3 - 6t2 + 6t - 2. \\
 \text{sup. 2.} & O.6a : 3t2 - 3t. \\
 \text{sup. p.} & O.2u : 2t - 2. \\
 & O.6a2 : 2t3 - 3t2 + t. \text{ Quod \&c.}
 \end{array}$$


---

4. O.



4.  $O.6ar : t3 \dashv t.$ *Demonstr. 1.* $O.a2r$ , incrementa sunt æqualia.2. *h.*  $O.2ar + O.r + t : O.a2 + t2.$  $O.12ar \rightarrow O.6r \rightarrow 6t : O.6a2 \rightarrow 6t2.$  $O.12ar : O.6a2 \dashv O.6r \rightarrow 6t2 \dashv 6t.$ *sup. 3.*  $O.6a2 : 2t3 \dashv 3t2 \rightarrow t.$ *sup. 2.*  $O.6r : 3t2 \dashv 3t.$  $O.12ar : 2t3 \dashv 2t.$  $O.6ar : t3 \dashv t.$  Quod &c.*Demonstr. 2.* $O.a2r$ , decrementa sunt æqualia.3. *h.*  $O.2ar \dashv O.r : O.a2.$  $O.12ar \dashv O.6r : O.6a2.$  $O.12ar : O.6a2 \rightarrow O.6r.$ *sup. 3.*  $O.6a2 : 2t3 \dashv 3t2 \rightarrow t.$ *sup. 2.*  $O.6r : 3t2 \dashv 3t.$  $O.12ar : 2t3 \dashv 2t.$  $O.6ar : t3 \dashv t.$  Quod &c.5.  $O.4a3 : t4 \dashv 2t3 \rightarrow t2.$ *Demonstr.*4. *h.*  $O.4a3 \rightarrow O.6a2 \rightarrow O.4a \rightarrow O.u \rightarrow u : t4.$ *sup. p.*  $O.u : t \dashv u.$ *sup. 2.*  $O.4a : 2t2 \dashv 2t.$ *sup. 3.*  $O.6a2 : 2t3 \dashv 3t2 \rightarrow t.$ 

O.4a3



$$\begin{array}{|l} O.4a3 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2 : t4. \\ O.4a3 : t4 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2. \text{ Quod \&c.} \end{array}$$

6.  $O.12a2r : t4 \rightarrow t2.$  *Demonst. 1.*

$$\begin{array}{|l} O.a3r, \text{ incrementa sunt } \text{æqualia}. \\ 2. h. \quad O.3a2r \rightarrow O.3ar \rightarrow O.r \rightarrow t : O.a3 \rightarrow t3. \\ O.12a2r \rightarrow O.12ar \rightarrow O.4r \rightarrow 4t : O.4a3 \rightarrow 4t3. \\ \text{sup. 4.} \quad O.12ar : 2t3 \rightarrow 2t. \quad O.4r : 2t2 \rightarrow 2t. \\ \text{et 2.} \quad O.4a3 : t4 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2. \\ \text{sup 5.} \quad O.12a2r + 2t3 + 2t2 : t4 + 2t3 + t2. \\ O.12a2r : t4 \rightarrow t2. \text{ Quod \&c.} \end{array}$$

*Demonst. 2.*

$$\begin{array}{|l} O.a3r, \text{ decrementa sunt } \text{æqualia}. \\ 3. h. \quad O.3a2r \rightarrow O.3ar \rightarrow O.r : O.a3. \\ O.12a2r \rightarrow O.12ar \rightarrow O.4r : O.4a3. \\ \text{sup. 4.} \quad O.12ar : 2t3 \rightarrow 2t. \\ \text{sup. 2.} \quad O.4r : 2t2 \rightarrow 2t. \\ \text{sup. 5.} \quad O.4a3 : t4 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2. \\ O.12a2r \rightarrow 2t3 \rightarrow 2t2 : t4 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2. \\ O.12a2r : t4 \rightarrow t2. \text{ Quod \&c.} \end{array}$$

7.  $O.3oa4 : 6t5 \rightarrow 15t4 \rightarrow 10t3 \rightarrow t.$

*Demonst.*

$$\begin{array}{|l} 4. h. \quad O.5a4 + O.1oa3 + O.1oa2 + O.5a + O.u \rightarrow u : t5. \\ O.6oa4 + O.12oa3 + O.12oa2 + O.6oa + O.12u \\ \text{sup. 2.} \quad \rightarrow 12 : 12t5. \quad O.6oa : 3ot2 \rightarrow 3ot. \\ \text{sup. 3.} \quad O.12oa2 : 4ot3 \rightarrow 6ot2 + 2ot. \\ \text{sup. 5.} \quad O.12oa3 : 3ot4 \rightarrow 6ot3 + 3ot2. \end{array}$$

F

$O.12u$



$\text{sup. p.} \quad \begin{array}{l} O.12u : 12t --- 12. \\ O.60a4 + 30t4 --- 20t3 + 2t : 12t5. \\ O.30a4 + 15t4 --- 10t3 + t : 6t5. \\ O.30a4 : 6t5 --- 15t4 + 10t3 --- t. \text{ Quod \&c.} \end{array}$

---

8.  $O.60a3r : 3t5 --- 5t3 + 2t.$

*Demonstr.*

$\begin{array}{l} O.a4r, \text{ decrementa sunt } \text{æqualia}. \\ 3. h. \quad \begin{array}{l} O.4a3r --- O.6a2r + O.4ar --- O.r : O.a4. \\ O.120a3r --- O.180a2r + O.120ar --- O.30r : \\ O.30a4. \\ \text{sup. 6.} \quad O.180a2r : 15t4 --- 15t2. \\ \text{sup. 4.} \quad O.120ar : 20t3 --- 20t. \\ \text{sup. 2.} \quad O.30r : 15t2 --- 15t. \\ \text{sup. 7.} \quad \begin{array}{l} O.30a4 : 6t5 --- 15t4 + 10t3 --- t. \\ O.120a3r --- 15t4 + 20t3 --- 5t : 6t5 --- 15t4 + \\ 10t3 --- t. \\ O.120a3r : 6t5 --- 10t3 + 4t. \\ O.60a3r : 3t5 --- 5t3 + 2t. \text{ Quod \&c.} \end{array} \end{array}$

---

9.  $O.30a2r2 : t5 --- t.$

*Demonstr.*

$\begin{array}{l} O.a3r2, \text{ decrementa sunt } \text{æqualia}. \\ 3. h. \quad \begin{array}{l} O.3a2r2 --- O.3ar2 + O.r2 : O.2a3r --- O.a3. \\ O.180a2r2 --- 180ar2 + O.60r2 : O.120a3r + \\ O.60a3. \\ \text{sup. 6.} \quad O.180ar2 : 15t4 --- 15t2. \end{array} \end{array}$

$O.60r2 :$



- <sup>sup.</sup>3. |  $O.6or2 : 2ot3 --- 3ot2 + 1ot.$   
<sup>sup.</sup>8. |  $O.12oa3r : 6t5 --- 1ot3 + 4t.$   
<sup>sup.</sup>5. |  $O.6oa3 : 15t4 --- 3ot3 + 15t2.$   
|  $O.18oa2r2 --- 15t4 + 2ot3 --- 15t2 + 1ot : 6t5.$   
|  $--- 15t4 + 2ot3 --- 15t2 + 4t.$   
|  $O.18oa2r2 : 6t5 --- 6t.$   
|  $O.3oa2r2 : t5 --- t. Quod &c.$

- 
10.  $O.12a5 : 2t6 --- 6t5 + 5t4 --- t2.$   
11.  $O.6oa4r : 2t6 --- 5t4 + 3t2.$   
12.  $O.6oa3r2 : t6 --- t2.$   
13.  $O.42a6 : 6t7 --- 21t6 + 21t5 --- 7t3 + t.$   
14.  $O.84a5r : 2t7 --- 7t5 + 7t3 --- 2t.$   
15.  $O.21oa4r2 : 2t7 --- 7t3 + 5t.$   
16.  $O.42oa3r3 : 3t7 + 7t3 --- 1ot.$   
17.  $O.24a7 : 3t8 --- 12t7 + 14t6 --- 7t4 + 2t2.$   
18.  $O.168a6r : 3t8 --- 14t6 + 21t4 --- 1ot2.$   
19.  $O.168a5r2 : t8 --- 7t4 + 6t2.$   
20.  $O.84oa4r3 : 3t8 + 7t4 --- 1ot2.$   
21.  $O.90.a8 : 1ot9 --- 45t8 + 6ot7 --- 42t5 + 2ot3$   
 $--- 3t.$   
22.  $O.36oa7r : 5t9 --- 3ot7 + 63t5 --- 5ot3 + 12t.$   
23.  $O.126oa6r2 : 5t9 --- 63t5 + 10ot3 --- 42t.$   
24.  $O.252oa5r3 : 5t9 + 21t5 --- 11ot3 + 84t.$   
25.  $O.63oa4r4 : t9 + 2ot3 --- 21t.$   
26.  $O.2oa9 : 21t10 --- 1ot9 + 15t8 --- 14t6 + 1ot4$   
 $--- 3t2.$



27.  $O.180a8r:2t10---15t8+42t6---5ot4+21t2.$   
 28.  $O.360a7r2:t10---21t6+5ot4---3ot2.$   
 29.  $O.840a6r3:t10+7t6---5ot4+42t2.$   
 30.  $O.1260a5r4:t10+2ot4---21t2.$   
 31.  $O.66a10:6t11---33t10+55t9---66t7+66t5---$   
 $33t3+5t.$   
 32.  $O.660a9r:6t11---55t9+198t7---33ot5+231t3$   
 $---5ot.$   
 33.  $O.990a8r2:2t11---66t7+22ot5---231t3+75t.$   
 34.  $O.1320a7r3:t11+11t7---11ot5+198t3---10ot.$   
 35.  $O.2310a6r4:t11+55t5---231t3+175t.$   
 36.  $O2772a5r5:t11---22t5+231t3---21ot.$

Et in infinitum, eadem methodo supra tradita, potest demonstrari, qualiter acceptis totis, quæque massa est æqualis.

*Theor. 6. Prop. 6.*

**D**emonstrare, qualiter acceptis semitotis, quæque massa est æqualis.

*Meth. Demonstr.*

Oportet præsupponere theoremata demonstrata in præcedenti, sua cuiusque massæ propria: deinde totas resolvere in semitotas, per *def. 19. h.* & per *8. p.* vt sequitur.

$$1: m+n.$$

$$2: m2+2m+n.$$

13:



$$t3 : m3 + 3m2 + 3m + u.$$

$$t4 : m4 + 4m3 + 6m2 + 4m + u.$$

$$t5 : m5 + 5m4 + 10m3 + 10m2 + 5m + u.$$

$$t6 : m6 + 6m5 + 15m4 + 20m3 + 15m2 + 6m + u.$$

$$t7 : m7 + 7m6 + 21m5 + 35m4 + 35m3 + 21m2 + 7m + u.$$

$$t8 : m8 + 8m7 + 28m6 + 56m5 + 70m4 + 56m3 + 28m2 + 8m + u.$$

$$t9 : m9 + 9m8 + 36m7 + 84m6 + 126m5 + 126m4 + 84m3 + 36m2 + 9m + u.$$

$$t10 : m10 + 10m9 + 45m8 + 120m7 + 210m6 + 252m5 + 210m4 + 120m3 + 45m2 + 10m + u.$$

$$t11 : m11 + 11m10 + 55m9 + 165m8 + 330m7 + 462m6 + 462m5 + 330m4 + 165m3 + 55m2 + 11m + u.$$

Vnde, pro triginta sex theorematibus propositis in præcedenti, & demonstrabilibus, alia triginta sex proponemus, in præsentibus, demonstrabilia, videlicet.

1.  $O.u : m.$

2.  $O.2a : m2 + m.$

3.  $O.6a2 : 2m3 + 3m2 + m.$

4.  $O.6ar : m3 + 3m2 + 2m.$

5.  $O.4a3 : m4 + 2m3 + m2.$

6.  $O.12a2r : m4 + 4m3 + 5m2 + 2m.$

7.  $O.30a4 : 6m5 + 15m4 + 10m3 - m.$

8.  $O.60a3r : 3m5 - 15m4 - 25m3 - 15m2 - 2m.$

9.  $O.$



9.  $O.30a2r2 : m5 + 5m4 + 10m3 + 10m2 + 4m.$   
 10.  $O.12a5 : 2m6 + 6m5 + 5m4 - m2.$   
 11.  $O.60a4r : 2m6 + 12m5 + 25m4 + 20m3 + 3m2 - 2m.$   
 12.  $O.60a3r2 : m6 + 6m5 + 15m4 + 20m3 + 14m2 + 4m.$   
 13.  $O.42a6 : 6m7 + 21m6 + 21m5 - 7m3 + m.$   
 14.  $O.84a5r : 2m7 + 14m6 + 35m5 + 35m4 + 7m3 - 7m2 - 2m.$   
 15.  $O.210a4r2 : 2m7 + 14m6 + 42m5 + 70m4 + 63m3 + 21m2 - 2m.$   
 16.  $O.420a3r3 : 3m7 + 21m6 + 63m5 + 105m4 + 112m3 + 84m2 + 32m.$   
 17.  $O.24a7 : 3m8 + 12m7 + 14m6 - 7m4 + 2m2.$   
 18.  $O.168a6r : 3m8 + 24m7 + 70m6 + 84m5 + 21m4 - 28m3 - 10m2 + 4m.$   
 19.  $O.168a5r2 : m8 + 8m7 + 28m6 + 56m5 + 63m4 + 28m3 - 8m2 - 8m.$   
 20.  $O.840a4r3 : 3m8 + 24m7 + 84m6 + 168m5 + 217m4 + 196m3 + 116m2 + 32m.$   
 21.  $O.90a8 : 10m9 + 45m8 + 60m7 - 42m5 + 20m3 - 3m.$   
 22.  $O.360a7r : 5m9 + 45m8 + 150m7 + 210m6 + 63m5 - 105m4 - 50m3 + 30m2 + 12m.$   
 23.  $O.1260a6r2 : 5m9 + 45m8 + 180m7 + 420m6 + 567m5 + 315m4 - 110m3 - 150m2 - 12m.$   
 24.  $O.2520a5r3 : 5m9 + 45m8 + 180m7 + 420m6 + 651m5$



SECUNDVM.

47.

- 651m5 + 735m4 + 520m3 + 60m2 -- 96m.
25. O.630a4r4: m9 + 9m8 + 36m7 + 84m6 + 126m5  
+ 126m4 + 104m3 + 96m2 + 48m.
26. O.20a9: 2m10 + 10m9 + 15m8 -- 14m6 + 10m4  
-- 3m2.
27. O.180a8r: 2m10 + 20m9 + 75m8 + 120m7 + 42m6  
-- 84m5 -- 50m4 + 40m3 + 21m2 -- 6m.
28. O.360a7r2: m10 + 10m9 + 45m8 + 120m7 +  
189m6 + 126m5 -- 55m4 -- 100m3 + 24m.
29. O.840a6r3: m10 + 10m9 + 45m8 + 120m7 +  
217m6 + 294m5 + 265m4 + 60m3 -- 108m2 --  
64m.
30. O.1260a5r4: m10 + 10m9 + 45m8 + 120m7 +  
210m6 + 252m5 + 230m4 + 200m3 + 144m2 +  
48m.
31. O.66a10: 6m11 + 33m10 + 55m9 -- 66m7 +  
66m5 -- 33m3 + 5m.
32. O.660a9r: 6m11 + 66m10 + 275m9 + 495m8 +  
198m7 -- 462m6 -- 330m5 + 330m4 + 231m3  
-- 99m2 -- 50m.
33. O.990a8r2: 2m11 + 22m10 + 110m9 + 330m8 +  
594m7 + 462m6 -- 242m5 -- 550m4 -- 11m3  
+ 231m2 + 42m.
34. O.1320a7r3: m11 + 11m10 + 55m9 + 165m8 +  
341m7 + 539m6 + 583m5 + 165m4 -- 352m3  
-- 220m2 + 32m.
35. O.2310a6r4: m11 + 11m10 + 55m9 + 165m8 +  
330m7



$$330m7 + 462m6 + 517m5 + 605m4 + 484m3 - 88m2 - 232m.$$

$$36. 0.2772a5r5 : m11 + 11m10 + 55m9 + 165m8 + 330m7 + 462m6 + 440m5 + 220m4 + 176m3 + 528m2 + 384m.$$

Sicut autem possibile est, ultra decimam basim speciosæ tabulæ, in demonstrando procedere, in præcedenti; & ostendere, qualiter accepis totis quæque massa est æqualis: ita possibile est in præsentī procedere; & demonstrare, qualiter accepis semitotis, quæque massa est æqualis.

*Theor. 7. Prop. 7.*

**D**emonstrare, qualiter accepis sesquiotis, quæque massa est æqualis.

*Meth. Demonstr.*

Oportet præsupponere theoremata, demonstrata sub titulo *prop. 5. h.* sua cuiusque propria: deinde totas resolvere in sesquiotas per *def. 18. h.* & per *10. p.* ut sequitur.

$$t : q - u.$$

$$t2 : q2 - 2q + u.$$

$$t3 : q3 - 3q2 + 3q - u.$$

$$t4 : q4 - 4q3 + 6q2 - 4q + u.$$

$$t5 : q5 - 5q4 + 10q3 - 10q2 + 5q - u.$$

$$t6 : q6 - 6q5 + 15q4 - 20q3 + 15q2 - 6q + u.$$

$$t7 : q7 - 7q6 + 21q5 - 35q4 + 35q3 - 21q2 + 7q - u.$$

$$t8 : q8 - 8q7 + 28q6 - 56q5 + 70q4 - 56q3 + 28q2 - 8q + u.$$



$$t9: q9 - 9q8 + 36q7 - 84q6 + 126q5 - 126q4 + 84q3 - 36q2 + 9q - u.$$

$$t10: q10 - 10q9 + 45q8 - 120q7 + 210q6 - 252q5 + 210q4 - 120q3 + 45q2 - 10q + u.$$

$$t11: q11 - 11q10 + 55q9 - 165q8 + 330q7 - 462q6 + 462q5 - 330q4 + 165q3 - 55q2 + 11q - u.$$

Vnde, pro triginta sex theorematibus, propositis in 5. h. alia triginta sex proponemus, in præsentibus demonstrabilia, videlicet.

1.  $O.u: q - 2.$
2.  $O.2a: q2 - 3q + 2.$
3.  $O.6a2: 2q3 - 9q2 + 13q - 6.$
4.  $O.6ar: q3 - 3q2 + 2q.$
5.  $O.4a3: q4 - 6q3 + 13q2 - 12q + 4.$
6.  $O.12a2r: q4 - 4q3 + 5q2 - 2q.$
7.  $O.30a4: 6q5 - 45q4 + 130q3 - 180q2 + 119q - 30.$
8.  $O.60a3r: 3q5 - 15q4 + 25q3 - 15q2 + 2q.$
9.  $O.30a2r2: q5 - 5q4 + 10q3 - 10q2 + 4q.$
10.  $O.12a5: 2q6 - 18q5 + 65q4 - 120q3 + 119q2 - 60q + 12.$
11.  $O.60a4r: 2q6 - 12q5 + 25q4 - 20q3 + 3q2 + 2q.$
12.  $O.60a3r2: q6 - 6q5 + 15q4 - 10q3 + 14q2 - 4q.$
13.  $O.42a6: 6q7 - 63q6 + 273q5 - 630q4 + 833q3 - 630q2 + 253q - 42.$
14.  $O.84a5r: 2q7 - 14q6 + 35q5 - 35q4 + 7q3 + 7q2 - 2q.$

G

15. O.



15.  $O.210a4r2:2q7---14q6+42q5---70q4+63q3$   
 $---21q2---2q.$
16.  $O.420a3r3:3q7---21q6+63q5---105q4+112q3$   
 $---84q2+32q.$
17.  $O.24a7:3q8---36q7+182q6---504q5+833q4$   
 $---840q3+506q2---168q+24.$
18.  $O.168a6r:3q8---24q7+70q6---84q5+21q4+$   
 $28q3---10q2---4q.$
19.  $O.168a5r2:q8---8q7+28q6---56q5+63q4---$   
 $28q3---8q2+8q.$
20.  $O.840a4r3:3q8---24q7+84q6---168q5+217q4$   
 $---196q3+116q2---32q.$
21.  $O.90a8:10q9---135q8+780q7---2520q6+$   
 $4998q5+6300q4+5060q3---2520q2+717q$   
 $---90.$
22.  $O.360a7r:5q9---45q8+150q7---210q6+$   
 $63q5+105q4---50q3---30q2+12q.$
23.  $O.1260a6r2:5q9---45q8+180q7---420q6+$   
 $567q5---315q4---110q3+150q2---12q.$
24.  $O.2520a5r3:5q9---45q8+180q7---420q6+$   
 $651q5---735q4+520q3---60q2---96q.$
25.  $O.630a4r4:q9---9q8+36q7---48q6+126q5---$   
 $126q4+104q3---96q2+48q.$
26.  $O.20a9:2q10---30q9+195q8---720q7+1666q6$   
 $---2520q5+2530q4-1680q3+717q2-180q+20$
27.  $O.180a8r:2q10---20q9+75q8---120q7+$   
 $42q6+84q5---50q4---40q3+21q2+6q.$
28. O.



# SECUNDVM.

51

$$28. \text{O.}360a7r2:q10 \text{ --- } 1099+4598 \text{ --- } 12097+18996 \\ \text{--- } 12695 \text{ --- } 5594+10093 \text{ --- } 249.$$

$$29. \text{O.}840a6r3:q10 \text{ --- } 1099+4598 \text{ --- } 12097+21796 \\ \text{--- } 29495+26594 \text{ --- } 6093 \text{ --- } 10892+649.$$

$$30. \text{O.}1260a5r4:q10 \text{ --- } 1099+4598 \text{ --- } 12097+ \\ 21096 \text{ --- } 25295+23094 \text{ --- } 20093+14492 \text{ --- } 489.$$

$$31. \text{O.}66a10:6911 \text{ --- } 99910+71599 \text{ --- } 297098+ \\ 785497 \text{ --- } 1386096+1669895 \text{ --- } 1386094+ \\ 788793 \text{ --- } 297092+6659 \text{ --- } 66.$$

$$32. \text{O.}660a9r:6911 \text{ --- } 66910+27599 \text{ --- } 49598+ \\ 19897+46296 \text{ --- } 33095 \text{ --- } 33094+23193+ \\ 9992 \text{ --- } 509.$$

$$33. \text{O.}990a8r2:2911 \text{ --- } 22910+11099 \text{ --- } 33098+ \\ 59497 \text{ --- } 46296 \text{ --- } 24295+55094 \text{ --- } 1193 \text{ --- } \\ 23192+429.$$

$$34. \text{O.}1320a7r3:q11 \text{ --- } 11910+5599 \text{ --- } 16598+ \\ 34197 \text{ --- } 53996+58395 \text{ --- } 16594 \text{ --- } 35293+ \\ 22092+329.$$

$$35. \text{O.}2310a6r4:q11 \text{ --- } 11910+5599 \text{ --- } 16598+ \\ 33097 \text{ --- } 46296+51795 \text{ --- } 60594+48493+8892 \\ \text{--- } 2329.$$

$$36. \text{O.}2772a5r5:q11 \text{ --- } 11910+5599 \text{ --- } 16598+ \\ 33097 \text{ --- } 46296+44095 \text{ --- } 22094+17693 \text{ --- } \\ 52892+3849.$$

Sicut autem possibile est, ultra decimam basim speciose  
tabulæ demonstrare, qualiter acceptis totis quæque massa  
est æqualis, iuxta methodum 5. b. ita possibile est, etiam in

G 2

præ-



præsenti procedere in infinitum, & demonstrare, etiam  
vltra decimam basim, qualiter acceptis sesquiotis, quæ-  
que massa est æqualis.

*Theor. 8. Prop. 8.*

**D**emonstrare, qualiter acceptis primi lateris specie-  
bus, quæque massa est æqualis.

*Meth. Demonstr.*

Sub hoc vno titulo, innumerabilia theoremata censer-  
possent, quorum vna communis est methodis demon-  
strandis, per 5. *h.* resoluendo massas, in totas sibi æquales;  
& per 4. *h.* resoluendo totas, in species primi lateris sibi  
æquales.

Pro vltiori methodi enarratione, proponemus vi-  
ginti quinque theoremata, vnum cum demonstratione, &  
reliqua sine demonstratione: quæ possunt facillè demon-  
strari, secundum methodum assignatam.

1.  $O2ar : O.a2 + O.a.$

*Demonstr.*

5. *h.*  $O.6ar : t3 --- t.$

4. *h.*  $t3 : O.3a2 + O.3a + O.u + u.$

$t : O.u + u.$

$O.6ar : O.3a2 + O.3a.$

$O.2ar : O.a2 + O.a.$  Quod, &c.

2.  $O.6a2r : O.2a3 + O.3a2 + O.a.$

3.  $O.4a3r : O.a4 + O.2a3 + O.a2.$

4.  $O.$



4.  $O.6a2r2: O.a4 + O.2a3 + O.2a2 + O.a.$
5.  $O.30a4r: O.6a5 + O.15a4 + O.10a3 - O.a.$
6.  $O.60a3r2: O.6a5 + O.15a4 + O.20a3 + O.15a2 + O.4a.$
7.  $O.12a5r: O.2a6 + O.6a5 + O.5a4 - O.a2.$
8.  $O.30a4r2: O.2a6 + O.6a5 + O.10a4 + O.10a3 + O.3a2 - O.a.$
9.  $O.20a3r3: O.a6 + O.7a5 + O.5a4 + O.5a3 + O.4a2 - O.2a.$
10.  $O.42a6r: O.6a7 + O.21a6 + O.21a5 - O.7a3 + O.a.$
11.  $O.84a5r2: O.4a7 + O.14a6 + O.28a5 + O.35a4 + O.14a3 - O.7a2 - O.4a.$
12.  $O.420a4r3: O.12a7 + O.42a6 + O.84a5 + O.105a4 + O.98a3 + O.63a2 + O.16a.$
13.  $O.24a7r: O.3a8 + O.12a7 + O.14a6 - O.7a4 + O.2a2.$
14.  $O.84a6r2: O.3a8 + O.12a7 + O.28a6 + O.42a5 + O.21a4 - O.14a3 - O.10a2 + O.2a.$
15.  $O.168a5r3: O.3a8 + O.12a7 + O.28a6 + O.42a5 + O.49a4 + O.42a3 + O.4a2 - O.12a.$
16.  $O.10a4r4: O.3a8 + O.12a7 + O.28a6 + O.42a5 + O.42a4 + O.28a3 + O.32a2 + O.23a.$
17.  $O.90a8r: O.10a9 + O.45a8 + O.60a7 - O.42a5 + O.20a3 - O.3a.$
18.  $O.360a7r2: O.10a9 + O.45a8 + O.120a7 + O.210a6 + O.126a5 - O.105a4 - O.100a3 + O.30a2 + O.24a.$

19. 0.



19.  $O.840a6r3 : O.10a9 + O.45a8 + O.120a7 +$   
 $O.210a6 + O.294a5 + O.315a4 + O.60a3 ---$   
 $O.150a2 --- O.64a.$
20.  $O.1260a5r4 : O.10a9 + O.45a8 + O.120a7 +$   
 $O.210a6 + O.252a5 + O.210a4 + O.200a3 +$   
 $O.165a2 + O.48a.$
21.  $O.20a9r : O.2a10 + O.10a9 + O.15a8 --- O.14a6$   
 $+ O.10a4 --- O.3a2.$
22.  $O.90a8r2 : O.2a10 + O.10a9 + O.30a8 + O.60a7$   
 $+ O.42a6 --- O.42a5 --- O.50a4 + O.20a3 + O.21a2$   
 $--- O.3a.$
23.  $O.120a7r3 : O.a10 + O.5a9 + O.15a8 + O.30a7 +$   
 $O.49a6 + O.63a5 + O.15a4 --- O.50a3 --- O.20a2$   
 $+ O.12a.$
24.  $O.210a6r4 : O.a10 + O.5a9 + O.15a8 + O.30a7 +$   
 $O.42a6 + O.42a5 + O.55a4 + O.65a3 --- O.8a2 ---$   
 $O.37a.$
25.  $O.252a5r5 : O.a10 + O.5a9 + O.15a8 + O.30a7 +$   
 $O.42a6 + O.42a5 + O.20a4 --- O.5a3 + O.48a2 +$   
 $O.54a.$

Aliaque possunt in infinitum proponi theoremata, & demonstrari, quibus pateat, qualiter acceptis primi lateris speciebus, quæque massa est æqualis.

*Theor. 9. Prop. 9.*

**D**emonstrare, quæ, & qualiter acceptæ totæ species in eadem basi vicinas, aliququaliter acceptas, æquales faciant.

Ex



Ex innumerabilibus theorematibus, quæ sunt huius tituli, proponimus viginti quinque: & ex his quatuor solummodo demonstramus; quæ sufficiunt, ad ostendendam methodum.

1.  $O.2a2+t2 : O.4ar+t.$

*Demonstr.*

|       |                               |                       |
|-------|-------------------------------|-----------------------|
| 5. b. | $O.6a2 : 2t3 -- 3t2+t.$       |                       |
|       | $O.6a2+3t2 -- t : 2t3.$       |                       |
| 5. b. | $O.6ar : t3 -- t.$            | $O.12ar : 2t3 -- 2t.$ |
|       | $O.12ar+2t : 2t3.$            |                       |
|       | $O.6a2+3t2 -- t : O.12ar+2t.$ |                       |
|       | $O.6a2+3t2 : O.12ar+3t.$      |                       |
|       | $O.2a2+t2 : O.4ar+t.$         | Quod &c.              |

2.  $O.2a3+t3 : O.6a2r+t2.$

*Demonstr.*

|       |                                 |                         |
|-------|---------------------------------|-------------------------|
| 5. b. | $O.4a3 : t4 -- 2t3+t2.$         | $O.4a3+2t3 -- t2 : t4.$ |
| 5. b. | $O.12a2r : t4 -- t2.$           | $O.12a2r+t2 : t4.$      |
|       | $O.4a3+2t3 -- t2 : O.12a2r+t2.$ |                         |
|       | $O.4a3+2t3 : O.12a2r+2t2.$      |                         |
|       | $O.2a3+t3 : O.6a2r+t2.$         | Quod &c.                |

3.  $O.6a4+t4+t : O.24a3r+4t3.$

*Demonstr.*

|       |                                   |            |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 5. b. | $O.30a4 : 6t5 -- 15t4+10t3 -- t.$ |            |
|       | $O.30a4+15t4 -- 10t3+t : 6t5.$    |            |
| 5. b. | $O.60a3r : 3t5 -- 5t3+2t.$        |            |
|       | $O.60a3r+5t3 -- 2t : 3t5.$        |            |
|       |                                   | $O.120a3r$ |



$$\begin{array}{l}
 5. b. \quad O.120a3r+10t3-4t:6t5. \\
 O.30a4+15t4-10t3+t:O.120a3r+10t3-4t. \\
 O.30a4+15t4+5t:O.120a3r+20t3. \\
 O.6a4+3t4+t:O.24a3r+4t3. \text{ Quod \&c.}
 \end{array}$$

$$4. \quad O.12a3r+t3:O.18a2r2+t.$$

*Demonstr.*

$$\begin{array}{l}
 5. b. \quad O.60a3r:3t5-5t3+2t. \\
 O.60a3r+5t3-2t:3t5. \\
 5. b. \quad O.30a2r2:t5-t. \\
 O.30a2r2+t:t5. \\
 O.90a2r2+3t:3t5. \\
 O.60a3r+5t3-2t:O.90a2r2+3t. \\
 O.60a3r+5t3:O.90a2r2+5t. \\
 O.12a3r+t3:O.18a2r2+t. \text{ Quod, \&c.} \\
 5. \quad O.6a5+3t5+2t2:O.30a4r+5t4. \\
 6. \quad O.12a4r+t4:O.24a3r2+t2. \\
 7. \quad O.6a6+3t6+4t3:O.36a5r+6t5+t. \\
 8. \quad O.12a5r+t5+t:O.30a4r2+2t3. \\
 9. \quad O.18a4r2+t3:O.24a3r3+t. \\
 10. \quad O.6a7+3t7+7t4:O.42a6r+7t6+3t2. \\
 11. \quad O.12a6r+t6+2t2:O.36a5r2+3t4. \\
 12. \quad O.18a5r2+t4:O.30a4r3+t2. \\
 13. \quad O.30a8+15t8+56t5+9t:O.80a7r+40t7+40t3. \\
 14. \quad O.60a7r+5t9+25t3:O.210a6r2+21t5+9t. \\
 15. \quad O.30a6r2+2t5+3t:O.60a5r3+5t3.
 \end{array}$$

16. O.



16.  $O.120a5r3 + 10t3 : O.150a4r4 + t5 + 9t.$   
 17.  $O.10a9 + 5t9 + 28t6 + 12t2 : O.90a8r + 13t8 + 30t4.$   
 18.  $O.60a8r + 5t8 + 50t4 : O.240a7r2 + 28t6 + 27t2.$   
 19.  $O.90a7r2 + 7t6 + 18t2 : O.210a6r3 + 25t4.$   
 20.  $O.120a6r3 + 10t4 : O.180a5r4 + t6 + 9t2.$   
 21.  $O.6a10 + 3t10 + 24t7 + 24t3 : O.60a9r + 10t9 + 36t5 + 5t.$   
 22.  $O.60a9r + 5t9 + 90t5 + 25t : O.270a8r2 + 36t7 + 84t3.$   
 23.  $O.90a8r2 + 8t7 + 57t3 : O.240a7r3 + 40t5 + 25t.$   
 24.  $O.120a7r3 + 15t5 + 25t : O.210a6r4 + t7 + 39t3.$   
 25.  $O.30a6r4 + 6t3 : O.36a5r5 + t5 + 5t.$

Et alia huiusmodi proponi possunt innumerabilia : quibus in singulis demonstrari poterit, quæ, & qualiter acceptæ totæ, species in eadem basi vicinas, aliququaliter acceptas, æquales faciant.

*Theor. 10. Prop. 10.*

**D**emonstrare, quæ, & qualiter acceptæ semitotæ, species in eadem basi vicinas, aliququaliter acceptas, æquales faciant.

Pro innumerabilibus theorematis huius tituli, viginti-quinque proponimus, & vnum demonstramus, ad ostensionem methodi.

1.  $O.2a2 + m2 + m : O.4ar.$

H

De-



Demonstr.

6. h.  $O.6a2 : 2m3 + 3m2 + m.$   
 $O.6a2 --- 3m2 --- m : 2m3.$   
 6. h.  $O.6ar : m3 + 3m2 + 2m.$   
 $O.12ar : 2m3 + 6m2 + 4m.$   
 $O.12ar --- 6m2 --- 4m : 2m3.$   
 $O.6a2 --- 3m2 --- m : O.12ar --- 6m2 --- 4m.$   
 $O.6a2 : O.12ar --- 3m2 --- 3m.$   
 $O.2a2 : O.4ar --- m2 --- m.$   
 $O.2a2 + m2 + m : O.4ar$  Quod &c.
2.  $O.2a3 + m3 + 2m2 + m : O.6a2r.$   
 3.  $O.6a4 + 3m4 + 8m3 + 6m2 + m : O.24a3r.$   
 4.  $O.12a3r + m3 + 3m2 + 2m : O.18a2r2.$   
 5.  $O.6a5 + 3m5 + 10m4 + 10m3 + 2m2 : O.30a4r + m.$   
 6.  $O.12a4r + m4 + 4m3 + 5m2 + 2m : O.24a3r2.$   
 7.  $O.6a6 + 3m6 + 12m5 + 15m4 + 4m3 : O.36a5r +$   
 $3m2 + m.$   
 8.  $O.12a5r + m5 + 5m4 + 8m3 + 4m2 : O.30a4r2.$   
 9.  $O.18a4r2 + m3 + 3m2 + 2m : O.24a3r3.$   
 10.  $O.6a7 + 3m7 + 14m6 + 21m5 + 7m4 + m : O.42a6r$   
 $+ 7m3 + 3m2.$   
 11.  $O.12a6r + m6 + 6m5 + 12m4 + 8m3 : O.36a5r2 + m2$   
 $+ 2m.$   
 12.  $O.18a5r2 + m4 + 4m3 + 5m2 + 2m : O.30a4r3.$   
 13.  $O.30a8 + 15m8 + 80m7 + 140m6 + 56m5 +$   
 $20m2 + 9m : O.240a7r + 70m4 + 40m3.$   
 14.  $O.60a7r + 5m7 + 35m6 + 84m5 + 70m4 :$   
 $O.210a6m$



$$O.210a6m + 10m3 + 30m2 + 4m.$$

$$15. O.30a6r2 + 2m5 + 10m4 + 15m3 + 5m2 : O.60a5r3 + 2m.$$

$$16. O.120a5r3 + 20m2 + 16m : O.150a4r4 + m5 + 5m4.$$

$$17. O.10a9 + 5m9 + 30m8 + 60m7 + 28m6 + 20m3 + 12m2 : O.90a8r + 42m5 + 30m4 + 3m.$$

$$18. O.60a8r + 5m8 + 40m7 + 112m6 + 112m5 + 18m : O.240a7r2 + 20m4 + 80m3 + 7m2.$$

$$19. O.90a7r2 + 7m6 + 42m5 + 80m4 + 40m3 : O.210a6r3 + 27m2 + 22m.$$

$$20. O.120a6r3 + 20m3 + 36m2 + 16m : O.180a5r4 + m6 + 6m5 + 5m4.$$

$$21. O.6a10 + 3m10 + 20m9 + 45m8 + 24m7 + 30m4 + 24m3 : O.60a9r + 42m6 + 36m5 + 9m2 + 5m.$$

$$22. O.60a9r + 5m9 + 45m8 + 144m7 + 168m6 + 72m2 + 16m : O.270a8r2 + 36m5 + 180m4 + 24m3.$$

$$23. O.90a8r2 + 8m7 + 56m6 + 128m5 + 80m4 + 2m : O.240a7r3 + 63m3 + 61m2.$$

$$24. O.120a7r3 + 40m4 + 76m3 + 12m2 : O.210a6r4 + m7 + 7m6 + 6m5 + 24m.$$

$$25. O.30a6r4 + 8m2 + 8m : O.36a5r5 + m5 + 5m4 + 4m3.$$

Et omnino in qualibet basi speciosa tabula, proponi, & demonstrari potest, quæ, & qualiter acceptæ semitotæ, species vicinas, aliquantulum acceptas, æquales faciant.



Ther. 11. Prop. 11.

**D**emonstrare, quæ, & qualiter acceptæ sesquitotæ, species in eadem basi vicinas, aliquammodo acceptas, æquales faciant.

Sub hoc titulo vigintiquinque proponimus theorematæ, ex quibus vnum demonstramus, ad ostensionem methodi.

$$1. \quad O.2a2 + q2 + 2 : O.3ar + 3q.$$

*Demonstr.*

$$7. b. \quad \left\{ \begin{array}{l} O.6a2 : 2q3 \text{ --- } 9q2 + 13q \text{ --- } 6. \\ O.6a2 + 3q2 + 6 : 2q3 \text{ --- } 6q2 + 13q. \end{array} \right.$$

$$7. b. \quad \left\{ \begin{array}{l} O.6ar : q3 \text{ --- } 3q2 + 2q. \\ O.12ar : 2q3 \text{ --- } 6q2 + 4q. \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} O.12ar + 9q : 2q3 \text{ --- } 6q2 + 13q. \\ O.6a2 + 3q2 + 6 : O.12ar + 9q. \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} O.2a2 + q2 + 2 : O.4ar + 3q. \text{ Quod \&c.} \end{array} \right.$$

$$2. \quad O.2a3 + q3 + 5q : O.6a2r + 4q2 + 2.$$

$$3. \quad O.6a4 + 3q4 + 30q2 + 6 : O.24a3r + 16q3 + 23q.$$

$$4. \quad O.12a3r + q3 + 2q : O.18a2r2 + 3q2.$$

$$5. \quad O.6a5 + 3q5 + 50q3 + 31q : O.30a4r + 20q4 + 58q2 + 6.$$

$$6. \quad O.12a4r + q4 + 5q2 : O.24a3r2 + 4q3 + 2q.$$

$$7. \quad O.6a6 + 3q6 + 75q4 + 93q2 + 6 : O.36a5r + 24q5 + 116q3 + 37q.$$

$$8. \quad O.12a5r + q5 + 8q3 : O.30a4r2 + 5q4 + 4q2.$$

$$9. \quad O.18a4r2 + q3 + 2q : O.24a3r3 + 3q2.$$

10. O.



# SECUNDVM.

61

10.  $O.6a7 + 3q7 + 105q5 + 217q3 + 41q : O.42a6r$   
 $+ 28q6 + 203q4 + 129q2 + 6.$
11.  $O.12a6r + q6 + 12q4 + 2q : O.36a5r2 + 6q5 + 8q3$   
 $+ q2.$
12.  $O.18a5r2 + q4 + 5q2 : O.30a4r3 + 4q3 + 2q.$
13.  $O.30a8 + 15q8 + 700q6 + 2170q4 + 820q2 + 30 :$   
 $O.240a7r + 160q7 + 1624q5 + 1720q3 + 231q.$
14.  $O.60a7r + 5q7 + 84q5 + 30q2 : O.210a6r2 + 35q6$   
 $+ 70q4 + 10q3 + 4q.$
15.  $O.90a6r2 + 6q5 + 45q3 : O.180a5r3 + 30q4 + 15q2$   
 $+ 6q.$
16.  $O.120a5r3 + 5q4 + 16q : O.150a4r4 + q5 + 20q2.$
17.  $O.10a9 + 5q9 + 300q7 + 1302q5 + 820q3 + 93q :$   
 $O.90a8r + 60q8 + 812q6 + 1290q4 + 348q2$   
 $+ 10.$
18.  $O.60a8r + 5q8 + 112q6 + 80q3 : O.240a7r2$   
 $+ 40q7 + 112q5 + 20q4 + 7q2 + 18q.$
19.  $O.180a7r2 + 14q6 + 105q4 + 44q : O.420a6r3$   
 $+ 84q5 + 80q3 + 54q2.$
20.  $O.120a6r3 + 6q5 + 36q2 : O.180a5r4 + q6 + 5q4$   
 $+ 20q3 + 16q.$
21.  $O.6a10 + 3q10 + 225q8 + 1302q6 + 1230q4$   
 $+ 279q2 + 6 : O.60a9r + 40q9 + 696q7 + 1548q5.$
22.  $O.60a9r + 5q9 + 144q7 + 180q4 + 16q : O.270a8r2$   
 $+ 45q8 + 168q6 + 36q5 + 24q3 + 72q2.$
23.  $O.90a8r2 + 8q7 + 128q5 + 61q2 + 2q : O.240a7r3$   
 $+ 56q6 + 80q4 + 63q3.$

24. O.



$$24. O.120a7r3 + 7q6 + 76q3 : O.210a6r4 + q7 + 6q5 + 40q4 + 12q2 + 24q.$$

$$25. O.30a6r4 + 5q4 + 8q : O.36a5r5 + q5 + 4q3 + 8q2.$$

Possunt hæc, & alia huiusmodi, sub hoc titulo demonstrari, in infinitum, iuxta traditam methodum: ut omnino pateat, quæ, & qualiter acceptæ scquitotæ, species in eadem basi vicinas, aliquantiter acceptas æquales faciant.

*Theor. 12. Prop. 12.*

**D**emonstrare, quæ, & qualiter acceptæ primi lateris species, binas quasque species in eadem basi vicinas, aliquantiter acceptas, æquales faciant.

Sub hoc etiam titulo, vigintiquinque proponimus theoremata, ex quibus vnum demonstramus, ad ostensionem methodi.

$$1. O.a2 + O.a : O.2ar. \text{ Demonstratum est in 8. h.}$$

$$2. O.2a3 + O.3a2 + O.a : O.6a2r. \text{ Demonstr. ibidem.}$$

$$3. O.a4 + O.2a3 + O.a2 : O.4a3r. \text{ Demonstr. ibidem.}$$

$$4. O.4a3r + O.a2 + O.a : O.6a2r2.$$

*Demonstr.*

$$8. h. \quad O.4a3r : O.a4 + O.2a3 + O.a2.$$

$$O.4a3r + O.a2 + O.a : O.a4 + O.2a3 + O.2a2 + O.a.$$

$$8. h. \quad O.6a2r2 : O.a4 + O.2a3 + O.2a2 + O.a.$$

$$O.4a3r + O.a2 + O.a : O.6a2r2. \text{ Quod \&c.}$$

$$5. O.6a5 + O.15a4 + O.10a3 : O.30a4r + O.a.$$

$$6. O.6a4r + O.2a3 + O.3a2 + O.a : O.12a3r2.$$

$$7. O.2a6 + O.6a5 + O.5a4 : O.12a5r + O.a2.$$

$$8. O.$$



# SECUNDVM. 63

8.  $O.12a5r + O.5a4 + O.10a3 + O.4a2 : O.30a4r2$   
 $+ O.a.$
9.  $O.30a4r2 + O.8a5 + O.5a2 : O.40a3r3 + O.3a.$
10.  $O.6a7 + O.21a6 + O.21a5 + O.a : O.42a6r$   
 $+ O.7a3.$
11.  $O.12a6r + O.6a5 + O.15a4 + O.8a3 : O.36a5r2$   
 $+ O.3a2 + O.2a.$
12.  $O.9a5r2 + O.2a3 + O.3a2 + O.a : O.15a4r3.$
13.  $O.3a8 + O.12a7 + O.14a6 + O.2a2 : O.24a7r$   
 $+ O.7a4.$
14.  $O.12a7r + O.7a6 + O.21a5 + O.14a4 + O.a :$   
 $O.42a6r2 + O.7a3 + O.6a2.$
15.  $O.6a6r2 + O.2a4 + O.4a3 + O.a2 : O.12a5r3$   
 $+ O.a.$
16.  $O.24a5r3 + O.4a2 + O.5a : O.30a4r4 + O.a4$   
 $+ O.2a3.$
17.  $O.10a9 + O.45a8 + O.60a7 + O.20a3 : O.90a8r$   
 $+ O.42a5 + O.3a.$
18.  $O.30a8r + O.20a7 + O.70a6 + O.56a5 + O.10a2 +$   
 $O.9a : O.120a7r2 + O.35a4 + O.40a3.$
19.  $O.90a7r2 + O.42a5 + O.105a4 + O.40a3 :$   
 $O.210a6r3 + O.20a2 + O.22a.$
20.  $O.120a6r3 + O.20a3 + O.45a2 + O.16a :$   
 $O.180a5r4 + O.6a5 + O.15a4.$
21.  $O.2a10 + O.10a9 + O.15a8 + O.10a4 : O.20a9r +$   
 $O.14a6 + O.3a2.$
22.  $O.20a9r + O.15a8 + O.60a7 + O.56a6 + O.20a3$   
 $+ O.24a2:$



- $+0.24a2 : 0.90a8r2 + 0.42a5 + 0.60a4 + 0.3a.$   
 23.  $0.90a8r2 + 0.56a6 + 0.168a5 + 0.80a4 + 0.27a:$   
 $0.240a7r3 + 0.120a3 + 0.61a2.$   
 24.  $0.120a7r3 + 0.40a4 + 0.115a3 + 0.12a2:$   
 $0.210a6r4 + 0.7a6 + 0.21a5 + 0.49a.$   
 25.  $0.30a6r4 + 0.8a2 + 0.13a : 0.36a5r5 + 0.5a4$   
 $+ 0.10a3.$

Et alia deinceps proponi possunt, & demonstrari: & vniuersaliter possibile est demonstrare, quæ, & qualiter acceptæ primi lateris species, binas quasque species, in eadem basi vicinas, aliququaliter acceptas, æquales faciant.

*Theor. 13. Prop. 13.*

**I**N tabula subquadratrice cuiusque numeri, & in qualibet basi, subquadratrices, & æque ordinata tota, totam componunt, vnitatem plus ordinatam.

*Hypoth.*

In tabula subquadratrice, in secunda basi, sint subquadratrices  $0.a2, 0.2a3, 0.r2$ : sitque tota secunda,  $t2$ ; tota tertia,  $t3$ .

Dico  $0.a2 + 0.2ar + 0.r2 + t2 : t3$ .

*Demonstr.*

def. 6. p.  $| u; t : t2; t3.$

2. p.  $| u; t - u : t2; t3 - t2.$

Ergo  $t3 - t2$ , est toties  $t2$ , quoties est  $t - u$ : idest, quoties relinquitur ipse numerus  $t$ , vnitatem dempta. Sed cuiusque numeri tot sunt abscissiones, quotus ipse relinquitur,



quitur, vnitare dempta: nam binarij, vna tantum est abscissio, qua vnitas abscinditur; ternarij, duæ, quibus vnitas, & binarius abscinduntur; & sic deinceps: ergo  $t_3 --- t_2$ , est toties  $t_2$ , quot sunt ipsius  $t$  abscissiones.

Pro singulis autem abscissionibus.

6. p.  $a_2 + 2 ar + r_2 : t_2.$

Ergo pro omnibus.

$O.a_2 + O.2 ar + O.r_2 : t_3 --- t_2.$

Ergo communiter addendo  $t_2$ .

$O.a_2 + O.2 ar + O.r_2 + t_2 : t_3.$  Quod &c.

Quare &c.

*Theorema 14. Prop. 14.*

**T**Ota quælibet, est æqualis quadratrici, in primo latere, in basi proximè minus ordinata iacenti, vna cum alijs massis, in primo latere, in basibus inferioribus, & vertice, acceptis aliququaliter, & vnitare.

*Hypoth.*

Esto tota tertia  $t_3$ .

Dico  $t_3$ , esse æqualem quadratrici in primo latere, in secunda basi, vna cum alijs, &c.

*Demonstr.*

4. h.  $t_3 : O.3 a_2$ , vna cum alijs, &c.

def. 8. p.  $a_2$  est in primo latere in secunda basi tabulæ proportionarium.

def. 11. p.  $a_2$  est ibidem in tabula nominum.

def. 9. 2.  $O.a_2$  est ibidem in tabula speciosa.

I

$O.a_2$ .



def.11.2. |  $O.a2$  est ibidem in tabula subquadratrice.  
 def.13.2. |  $O.3a2$  est ibidem in tabula quadratrice.  
 |  $13$  est æqualis quadratrici, in primo latere, in se-  
 | cunda basi, vna cum alijs, &c. Quod &c.  
 Quare &c.

*Theorema 15. Prop. 15.*

**Q**ualibet subquadratrix, in primo latere, vna cum tota æque ordinata, atque sua basis, est æqualis subquadratrici, in secundo latere, in sua basi iacenti, vna cum massis, in secundo latere, in basibus inferioribus, acceptis aliquantulum, & tota.

*Hypoth.*

Est subquadratrix  $O.a3$ , in primo latere, in tertia basi.

Dico  $O.a3$ , vnâ cum tota tertia, æqualem esse subquadratrici, in secundo latere, in tertia basi iacenti, vna cum alijs, &c.

*Præpar.*

Assumatur species, in secundo latere, in quarta basi, secunda, & quartultima,  $O.a3r$ .

*Demonstr.*

|  $O.a3r$  incrementa sunt equalia.  
 2. h. |  $O.a3$ , vna cum &c:  $O.3a2r$ , vna cum alijs &c.  
 7. p. |  $a2r$  est secunda in tertia basi tabulæ proportion-  
 | alium.  
 def.11.p. |  $3a2r$  est ibidem in tabula nominum.  
 def.11.2. |  $O.3a2r$  est ibidem in tabula subquadratrice.

$O.a3,$



S E C V N D V M.

67

$O. a_3$ , vna &c. est æqualis subquadratrici, in secundo latere, in tertia basi, vna cum alijs, &c.  
Quod &c.

Quare &c.

Theor. 16. Prop. 16.

**S**I aliquot quantitatuum, secunda ad tertiam, fuerit sicut prima cum vltima ad secundam dempta vltima; & tertia ad quartam, sicut prima cum dupla vltima ad secundam dempta dupla vltima; & quarta ad quintam sicut prima cum tripla vltima ad secundam dempta tripla vltima; & sic deinceps vsque ad vltimam: erit prima cum secunda ad secundam cum tertia, sicut prima cum vltima ad secundam; & secunda cum tertia ad tertiam cum quarta, sicut prima cum dupla vltima ad secundam dempta vltima; & tertia cum quarta ad quartam cum quinta, sicut prima cum tripla vltima ad secundam dempta dupla vltima; & sic deinceps.

Hypoth.

Sint aliquot quantitates  $a, b, c, d, e$ .

$b; c: a+e; b--e$ .

$c; d: a+2e; b--2e$ .

$d; e: a+3e; b--3e$ .

Dico  $a+b; b+c: a+e; b$ .

Demonstr.

hypoth.  $| a+e; b--e: b; c$ .

conuertendo, componendo, & permutando.

I 2

$a+b$



2. p. |  $a+b; b+c: a+e; b.$  Quod &c.

Dico  $b+c; c+d: a+2e; b--e.$

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $b; c: a+e; b--e.$

2. p. |  $b+c; c: a+b; b--e.$

*hypoth.* |  $c; d: a+2e; b--2e.$

2. p. |  $c; c+d: a+2e; a+b.$

p. p. |  $b+c; c+d: a+2e; b--2e.$  Quod &c.

Dico  $c+d; d+e: a+3e; b--2e.$

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $c; d: a+2e; b--2e.$

2. p. |  $c+d; d: a+b; b--2e.$

*hypoth.* |  $d; e: a+3e; b--3e.$

2. p. |  $d; d+e: a+3e; a+b.$

p. p. |  $c+d; d+e: a+3e; b--2e.$  Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 17. Prop. 17.*

**S**I aliquot quantitatū, secunda ad tertiam fuerit, sicut prima cum vltima ad secundam dempta vltima; & tertia ad quartam, sicut prima cum dupla vltima ad secundam dempta dupla vltima; & sic deinceps vsque ad vltimam: fuerit autem & prima æqualis vltimæ: erunt totidem quantitates & vna amplius, prima seorsim, prima cum secunda, secunda cum tertia, tertia cum quarta, & deinceps bine aggregatæ, & demum seorsim vltima; quarum secunda ad tertiam, est vt prima cum vltima ad secundam dempta



dempta vltima; & tertia ad quartam, vt prima cum dupla vltima ad secundam dempta dupla vltima; & sic deinceps vsque ad vltimam.

*Hypoth.*

Sint tres quantitates  $a, b, c$ , quarum  
 $b; c: a - c; b - c.$

$a: c.$

Dico quatuor quantitates esse  $a, a - b, b + c, c$ , quarum  
 $a + b; b + c: a + c; a + b - c.$

*Demonstr.*

16. h.  $a + b; b + c: a + c; b.$

*hypoth.*  $a: c.$   
 $a + b - c: b.$

$a + b; b + c: a + c; a + b - c.$  Quod &c.

Dico  $b + c; c: a + 2c; a + b - 2c.$

*hypoth.*  $b; c: a + c; b - c.$

2. p.  $b + c; c: a + b; b - c.$

*hypoth.*  $b - c: a + b.$

$c: b - c.$

$2c: b.$

$a + 2c: a + b.$

$a + b - 2c: b - c.$

$b + c; c: a + 2c; a + b - 2c.$  Quod &c.

Quare &c.

*Theor.*



**I**N vnaquaque basi tabulæ multiplicium, prior quantitas ad posteriorem vicinam, est vt ordo prioris à prima, ad ordinem posterioris ab vltima.

*Demonstr.*

Quoniam in secunda basi tabulæ multiplicium, sunt tres quantitates, quarum secunda ad tertiam, est vt prima cum tertia ad secundam dempta tertia; & prima est æqualis tertiæ; & in tertia basi, sunt ordinatæ quatuor quantitates ex secunda basi desumptæ, prima seorsim, prima & secunda, secunda & tertia, & tertia seorsim: ergo etiam in tertia basi, secunda quãtitas ad tertiam, est vt prima cum quarta ad secundam dempta quarta; & tertia ad quartam, est vt prima cum dupla quarta, ad secundam dempta dupla quarta: & sic deinceps ostendetur in singulis basibus.

Est autem in vnaquaque basi tabulæ multiplicium, prima quantitas vnitas, & vltima vnitas: & secunda quantitas est ordo basis, idemque ordo ipsius quantitatis ab vltima. Ergo in quarta basi, prima quantitas, quæ est quintultima, ad secundam, quæ est quartultima, est vt vnitas ad quaternariũ: secunda ergo ad triultimam, est vt binarius ad ternarium; tertia ad penultimam, vt ternarius ad binarium; quarta ad vltimam, vt quaternarius ad vnitatem. Similiter ostendetur in singulis basibus.

Quare &c.

*Theor.*



*Theor. 19. Prop. 19.*

**P**roportionalium, & multiplicium tabulis congruentibus, quæque proportionalis, habet numeros denominatores, reciprocè proportionales, vt in suis cornibus multiplices.

*Demonstr.*

Proportionalium assumatur bitertia, cuius denominatores binarius, & ternarius. Est autem bitertia in quinta basi quarta tritultima: cuius cornua sunt in quarta basi, alterum in quarto, alterum in tritultimo latere: idest alterum cornu est, in quarta basi, quarta quantitas; alterum, tritultima. Sed in quarta basi, quarta est penultima, & tritultima est tertia: & in tabula multiplicium, tertia ad penultimam, est vt ternarius ad binarium: ergo cum bitertiae denominatores sint, prior binarius, & posterior ternarius; eiusdem in cornibus multiplices reciprocè sunt proportionales, prior ad posteriorem, vt ternarius ad binarium. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 20. Prop. 20.*

**I**N tabula specierum, in eadem basi, vicinæ species, multiplicatae per numeros suorum ordinum, prioris à prima, & posterioris ab vltima, sunt æquales, additis tamen vtriusque massis, in inferioris ordinis basibus, & in earumdem



dem lateribus, versus tabulæ verticem diuergentibus, aliqu-  
qualiter acceptis, atque totis minùs ordinatis, quàm sit ip-  
sa basis.

*Hypoth.*

Sint species in quinta basi, secunda quintultima, &  
tertia quartultima.

Dico duplam secundam quintultimam, æqualem esse  
quadruplæ tertiæ quartultimæ, additis tamen vtrimque  
alijs &c.

*Præpar.*

6. p. | Assumatur, in sexta basi, species tertia quintul-  
tima, cuius denominatores numeri, quaternar-  
ius, & binarius.

*Demonstr.*

Tertiæ & quintultimæ speciei æqualia sunt incrementa:

2. h. | alterum ex massis compositum in tertio latere,  
multiplicatis per numeros quartæ basis multipli-  
cium, quaternarium, & reliquos; quarum vna est  
in quinta basi quartultima, per quaternarium mul-  
tiplicata: alterum ex massis in quintultimo latere,  
2. h. | multiplicatis per numeros secundæ basis multi-  
plicium, nempe binarium; quarum vna est, in  
quinta basi, secunda, multiplicata per binarium: &  
reliquæ massæ, in vtroque incremento, sunt infe-  
riores, & demum totæ inferiores, quàm quinta.  
| Ergo dupla secunda quintultima, est æqualis qua-  
dru-



druplæ tertiæ quartultimæ, additis vtrimque alijs &c.

Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 21. Prop. 21.*

**I**N tabula subquadraticum, in eadem basi, subquadratrices vicinæ sunt æquales, additis tamen vtrimque massis, in inferioris ordinis basibus, & in earumdem lateribus, versus tabulæ verticem diuergentibus, aliququaliter acceptis, atque totis, minùs ordinatis, quàm sit ipsa basis. Similiter & vicinæ quadratrices sunt æquales, additis tamen &c.

*Hypoth.*

Sint subquadratrices, in quinta basi, vicinæ, producta ex secunda quintultima specie per secundum quintultimum multiplicem, & producta ex tertia quartultima specie, per tertium quartultimum multiplicem,  $O.544r$ , &  $O.1043r2$ .

Dico  $O.544r$ , additis &c:  $O.1043r2$ , additis &c.

*Prepar.*

Assumatur, in sexta basi, species tertia quintultima, cuius denominatores, quaternarius, & binarius, nempe  $O.44r2$ : quibuscum numeris, reciprocè proportionales sunt multiplices, in eiusdem speciei cornibus iacentes, 5 ad 10. Fiat itaque, vt 2 ad 5, ita  $O.244r$ , vna cum alijs &c. ad  $O.544r$ , vna cum alijs &c. item vt 4 ad 10, ita  $O.443r2$ , vnà cum alijs &c. ad  $O.1043r2$ , vna cum alijs &c.

K

*Demonstr.*



*Demonstr.*

20. b. | O. 2a4r, vna cum alijs &c: O. 4a3r2, vna cū alijs &c.  
 2. p. | O. 2a4r, vna cum alijs &c; O. 4a3r2, vna cum &c:  
           O. 5a4r, vna cum &c; O. 10a3r2, vna cum &c.  
 9. 5. | O. 5a4r, vna cum &c: O. 10a3r2, vna cum &c.  
           Quod &c.

Dico O. 30a4r, vna cum &c: O. 60a3r2, vna cum &c.

*Prepar.*

post. vn. | O. 5a4r, vna cum &c. & O. 10a3r2, vna cum &c.  
           sextuplicetur, & fiant O. 30a4r, vna cum &c. &  
           O. 60a3r2, vna &c.

*Demonstr.*

sup. | O. 5a4r, vna &c: O. 10a3r2, vna &c.  
 9. 5. | O. 30a4r, vna &c: O. 60a3r2, vna &c. Quod &c.  
           Quare &c.

*Theor. 22. Prop. 22.*

**Q**uælibet quadratrix, est æqualis totæ vnitatē plus ordinatæ, demptis, additisque aliquāliter acceptis totis, non plus ordinatis, quā sit eius basis.

*Demonstr.*

Estet inductione per 5. h.

21. b. | Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqualis  
           quadratrici, sibi in eadem basi vicinæ, additis v-  
           trisque alijs inferiorum basium speciebus, aliqua-  
 21. b. | liter acceptis, & totis. Et quadratrix vicina, alte-  
           ri vicinæ est æqualis, additis vtrisque alijs infe-  
           rio-



15. *h.* riorum basium speciebus, & totis: & demum pri-  
 14. *h.* mæ quadratrici eiusdem basis: & prima quadra-  
 trix vna cum alijs primi lateris quadratricibus in-  
 feriorum basium, & vnitate, est æqualis totæ, vni-  
 tate plus ordinatæ, quàm sit ipsa basis. Similiter  
*sup.* aliæ inferiorum basium species, alijs speciebus, &  
 demum totis, sunt æquales, non plus ordinatis,  
 5. *h.* quàm sit basis quadratricis primò sumptæ. Quare  
 demum quadratrix primò sumpta, est æqualis to-  
 tæ vnitate plus ordinatæ, quàm sit eius basis, dem-  
 ptis, additisque aliquo modo acceptis totis, non plus  
 ordinatis, quàm sit eius basis.

*Theor. 23. Prop. 23.*

**I**N tabula multiplicium, summa numerorum cuiusque  
 basis, est tota potestas binarij, quotus est ordo basis.

*Demonstr.*

Nam in tabula proportionalium, si rationalis, & radices

- def. 8. p.* fuerint æquales inter se: etiam reliquæ omnes  
 quantitates, & rationali, & radicibus, & ad inui-  
 cem æquales erunt. quia ratio æqualitatis, quan-  
 tumlibet multiplicata, & secum ipsa composita,  
 semper est æqualitas. Quare si rationalis, & radi-  
 ces fuerint unitates: omnes proportionales erunt  
 unitates. eritque tabula nominum, eadem, quæ  
*def. 11. p.* tabula multiplicium: quia vnitas non multiplicat  
*def. 10. p.* et cuiusque basis nominum summa, eadem erit

K 2

quæ



8. p. | quæ summa eiusdem basis multiplicium. Sed cuiusque basis nominum summa est potestas aggregati radicum, æqueordinata cum basi. Ergo cuiusque basis multiplicium summa, est potestas aggregati vnitatum, idest binarij, æqueordinata cum basi.

*Theor. 24. Prop. 24.*

**P**otestas binarij multiplicata per suum ordinis numerum, minor est æqueordinata potestate ternarij.

*Hypoth.*

Esto binarius  $b$ , ternarius  $t$ . Constat  $b$ , minorem esse, quàm  $t$ .

Dico  $2b2$ , minorem esse, quàm  $t2$ .

$3b3$ , minorem, quàm  $t3$ .

$4b4$ , minorem quàm  $t4$ . Et deinceps.

*Demonstr.*

*def. 8. p.* |  $t; b: t2; tb: tb; b2: t2 -- tb; tb -- b2$ .

*¶ 2. p.* |  $t, b$ , sunt numeri inter se primi.

*23. 7.* |  $t, b$ , sunt minimi in sua ratione.

|  $t2 -- tb$ , non est minor, quàm  $t$ .

|  $tb -- b2$ , non est minor, quàm  $b$ .

|  $t2 -- b2$ , non est minor quàm  $t+b$ .

*hypoth.* |  $b$ , est minor, quàm  $t$ .

|  $2b$ , est minor, quàm  $t+b$ .

|  $2b$ , est minor, quàm  $t2 -- b2$ .

*hypoth.* |  $2$ , est  $b$ .

$2b,$



$2b$ , est  $b_2$ .  
 $b_2$ , est minor, quàm  $12$  ---  $b_2$ .  
 $2b_2$ , est minor, quàm  $12$ . Quod &c.  
 $2b_2$ , est  $b_3$ .  
 $b_3$ , est minor, quàm  $12$ .  
 $3b_3$ , est minor, quàm  $312$ .  
 $312$ , est  $t_3$ .  
 $3b_3$ , est minor, quàm  $t_3$ . Quod &c.  
 $3b_4$ , est minor, quàm  $2t_3$ .  
*sup.*  $b_3$ , est minor, quàm  $12$ .  
*hypoth.*  $b$ , est minor, quàm  $t$ .  
 $b_4$ , est minor, quàm  $t_3$ .  
 $4b_4$ , est minor, quàm  $3t_3$ .  
 $3t_3$ , est  $t_4$ .  
 $4b_4$ , est minor, quàm  $t_4$ . Quod &c.  
 Et similiter deinceps ostendetur in infinitum.  
 Quare &c.

Theorema 25. Prop. 25.

**I**N tabula multiplicium, quisque numerus multiplicans  
 numerum vnitatem maiorem, quàm sit ordo suæ basis, fa-  
 cit numerum minorem tota potestate ternarij, quotus est  
 numerus multiplicatus.

*Hypoth.*

Esto, numerus  $a$ , in tabula multiplicium, in quinta  
 basi: & esto ternarius  $t$ .

Dico  $6a$ , minorem esse, quam  $t6$ .

*Prepar.*



*Præpar.*Accipiatur binarius  $b$ .*Demonstr.*

32. *h.* } Numerus  $a$ , & alij quintæ basis, componunt  $b_5$ .  
*def. 6. p.* } Ergo  $a$ , minor est, quàm  $b_5$ . Sed  $b_5$ , minor  
 est, quàm  $b_6$ . Ergo  $a$ , multò minor est, quàm  
 24. *h.* }  $b_6$ . Ergo  $6a$ , minor est quàm  $6b_6$ . Sed  $6b_6$ ,  
 minor est, quàm  $16$ . Ergo  $6a$ , minor est quàm  
 }  $16$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 26. Prop. 26.*

**Q**uælibet quadratrix, pro radice binario, minor est,  
 quàm sesquitota; maior, quàm semitota, vnitatem  
 plus ordinatæ, quàm sit eius basis. Porro qua-  
 dratrix iacens in vertice tabulæ, est æqualis semitotæ.

*Hypoth.*

Esto, pro radice binario, quælibet quadratrix  $a$ , in  
 quarta basi.

Dico  $a$  maiorem esse, quàm  $m_5$ ; & minorem, quàm  
 95.

6. *h.* } Porro constat quod  $O.u$ , pro quacunque ra-  
 dice, est æqualis ipsi  $m$ .

*Præpar.*

*def. 8. h.* } Pro radice binario, vnica tantum est abscissio,  
 qua vnitas abscinditur, & vnitas relinquitur: &  
*def. 8. p.* } vnica tabula proportionaliū, in qua omnes pro-  
 por-



def. 8. h. | portiones sunt unitates: & synonymæ propor-  
 def. 10. h. | tionales solitariae: unde tabula specierum est ea-  
 def. 11. p. | dem, quæ proportionalium ex unitatibus. Dein-  
 def. 11. h. | de vnica est tabula nominum, eadem, quæ multi-  
 | plicium: unde tabula subquadratricum, eadem  
 | est, quæ nominum, & multiplicium. Accipiat  
 | itaque subquadratrix  $b$ , in quarta basi, quadra-  
 | trici  $a$ , synonyma.

*Demonstr.*

prepar. |  $b$ , est in tabula multiplicium, in quarta basi.

def. 13. h. |  $a : 5 b$ .

def. 19. h. | pro binario,  $m$ , est unitas.

def. 6. p. |  $m 5$ , est unitas.

def. 10. p. |  $5 b$ , est maior unitate.

def. 18. h. |  $a$ , est maior, quàm  $m 5$ . Quod &c.

25. h. | Pro binario,  $q$ , est ternarius.

25. h. |  $5 b$ , est minor, quàm  $q 5$ .

25. h. |  $a$ , est minor, quàm  $q 5$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 27. Prop. 27.*

**Q** Vælibet potestas à binario, maior est numero sui ordinis.

*Hypoth.*

Esto binarius  $b$ .

*Demonstr.*

Unitas est minor, quàm  $b$ , ergo binarius, minor est,  
quàm



quàm  $2b$ : sed  $2b$ : est  $b^2$ : ergo binarius, minor est, quàm  $b^2$ .  
 Ergo vnitas, multò minor est, quàm  $b^2$ . Ergo ternarius,  
 minor est, quàm  $2b^2$ . Sed  $2b^2$ , est  $b^3$ . Ergo ternarius,  
 minor est, quàm  $b^3$ . Et sic deinceps ostendetur, quòd po-  
 testas à binario, maior est, quàm sui ordinis numerus.

*Theor. 28. Prop. 28.*

**Q**uælibet quadratrix primi lateris, pro radice binario,  
 minor est, quàm potestas binarij, vnitate plus or-  
 dinata, quàm sit eius basis.

*Hypoth.*

Esto, in primo latere, in quarta basi, quadratrix  $a$ , pro  
 radice binario: & esto binarius  $b$ .

Dico  $a$ , minorem esse, quàm  $b^5$ .

*Prepar.*

Accipiatur in primo latere, in quarta basi, subquadra-  
 trix  $c$ , pro radice binario.

*Demonstr.*

ex 26. h |  $c: u$ .

def. 11. h |  $a: 5c$ .

|  $a: 5$ .

27. h. |  $5$ , minor est, quàm  $b^5$ .

|  $a$ , minor est, quàm  $b^5$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor.*



*Theor. 29. Prop. 29.*

**C** Viuslibet quadratricis, primi vel ultimi lateris, incrementum, minus est incremento totæ, vnitatis plus ordinatæ, quàm sit eius basis: & quælibet quadratrix, primi vel ultimi lateris, minor est quàm tota, vnitatis plus ordinata: & sesquiquadratrix, minor est quàm sesquiquota.

*Meth. Demonstr.*

Tria proposita, oportet primùm demonstrare, in prioribus basibus tabulæ, deinde in posterioribus.

Dico  $O.2a$  incrementum, minus esse incremento  $t2$ : &  $O.2a$ , minorem esse, quàm  $t2$ : & sesqui- $O.2a$ , minorem esse, quàm  $q2$ .

*Demonstr.*

2. h. |  $O.2a$  incrementum est  $O.2+2$ .

8. p. |  $t2$  incrementum est  $2t+n$ .

2. h. |  $O.2 : 2t - 2$ .

|  $O.2+2 : 2t$ .

|  $O.2+2$ , minor est, quàm  $2t+n$ .

|  $O.2a$  incrementum, minus est incremento

|  $t2$ . Quod &c.

28. h. |  $O.2a$ , pro binario, minor est, quàm  $t2$ .

|  $O.2a$ , pro ternario, minor est, quàm  $t2$ .

| Similiter, pro quaternario, & pro singulis numeris demonstrabitur, quòd  $O.2a$  minor est, quàm  $t2$ : & sesqui- $O.2a$ , minor est, quàm

|  $q2$ . Quod &c.

L

Dico



Dico  $O.3a2$  incrementum, minus esse incremento  $t3$ : &  $O.3a2$ , minorem esse, quàm  $t3$ : & sesqui- $O.3a2$ , minorem esse, quàm  $q3$ .

*Demonstr.*

2. h. |  $O.3a2$  incrementum, est  $O.6a + O.3 + 3$ .  
 8. p. |  $t3$  incrementum, est  $3t2 + 3t + u$ .  
 sup. |  $O.6a$ , minor est, quàm  $3t2$ .  
 ex sup. |  $O.3 + 3$ , minor est, quàm  $3t + u$ .  
 |  $O.3a2$  incrementum, minus est incremento  $t3$ .  
 | Quod &c.  
 28. h. |  $O.3a2$ , pro binario, minor est, quàm  $t3$ .  
 |  $O.3a2$ , pro ternario, minor est quàm  $t3$ : necnon  
 | pro alio quolibet numero: & sesqui- $O.3a2$ ,  
 | minor est, quàm  $q3$ . Quæ &c.

Dico  $O.4a3$  incrementum, minus esse incremento  $t4$ : &  $O.4a3$ , minorem esse, quàm  $t4$ : & sesqui- $O.4a3$ , minorem, quàm  $q4$ .

*Demonstr.*

2. h. |  $O.4a3$  incrementum, est  $O.12a2 + O.12a$   
 |  $\rightarrow O.4 + 4$ .  
 8. p. | Incrementum  $t4$ , est  $4t3 + 6t2 + 4t + u$ .  
 sup. |  $O.12a2$ , minor est, quàm  $4t3$ .  
 sup. |  $O.12a$ , minor est, quàm  $6t2$ .  
 ex sup. |  $O.4 + 4$ , minor est, quàm  $4t + u$ .  
 | Incrementum  $O.4a3$ , minus est incremento  $t4$ .  
 | Quod &c.  
 28. h. |  $O.4a3$ , pro binario, minor est, quàm  $t4$ .  
 |  $O.4a3$ ,



$O.4a3$ , pro ternario, minor est, quàm  $14$ : necnon pro quaternario, & pro alijs deinceps numeris: & sesqui-  
 $O.4a3$ , minor est, quàm  $q4$ . Quæ &c.

Similiter ostendetur de omnibus primi, & ultimi lateris quadratricibus.

Quare &c.

*Theor. 30. Prop. 30.*

**C** Viuslibet quadratricis incrementum, maius est incremento semitotæ, unitate plus ordinatæ, quàm sit eius basis; & minus est incremento sesquitotæ, pariter plus ordinatæ. Deinde quælibet quadratrix, maior est, quàm prædicta semitota; & minor, quàm prædicta sesquitota.

*Meth. Demonstr.*

Quatuor proposita primùm demonstrare oportet, in prioribus basibus tabulæ, deinde in posterioribus.

Dico incrementum  $O.2a$ ; maius esse, incremento  $m2$ ; & minus esse, incremento  $q2$ : &  $O.2a$ , maiorem esse, quàm  $m2$ ; minorem, quàm  $q2$ .

*Demonstr.*

2. b. | Incrementum  $O.2a$ , est  $O2+2$ .

3. p. | Incrementum  $m2$ , est  $2m+u$ .

3. p. | Incrementum  $q2$ , est  $2q+u$ .

7. b. |  $O.2: 2m$ .

|  $O.2+2$ , est maior, quàm  $2m+u$ .

| Incrementum  $O.2a$ , est maius incremento  $m2$ .

Quod &c.

L 2

$O.2$



def. 19.  $O.2+2: 2m+2: 2t.$   
 & 18. b.  $O.2+2$ , est minor, quàm  $2q.$   
 $O.2+2$ , est minor, quàm  $2q+u.$   
 Incrementum  $O.2a$ , est minus incremento  $q2.$   
 Quod &c.

26. b.  $O.2a$ , pro binario, est maior, quàm  $m2$ ; minor,  
 quàm  $q2.$   
 $O.2a$ , pro ternario, est maior, quàm  $m2$ ; mi-  
 nor, quàm  $q2$ : item pro quaternario, & pro  
 reliquis numeris. Quod &c.

Dico  $O.3a2$  incrementum, maius esse incremento  
 $m3$ ; minus incremento  $q3$ : &  $O.3a2$ , maiorem esse,  
 quàm  $m3$ ; minorem, quàm  $q3.$

*Demonstr.*

6. b. Incrementum  $O.3a2$ , est  $O.6a+O.3+3.$

8. p. Incrementum  $m3$ , est  $3m2+3m+u.$

8. p. Incrementum  $q3$ , est  $3q2+3q+u.$

sup.  $O6a$ , est maior, quàm  $3m2.$

sup.  $O.3: 3m.$

$O.3+3$ , maior est. quàm  $3m+u.$

Incrementum  $O.3a2$ , est maius incremento  $m3.$

Quod &c.

sup.  $O.6a$ , est minor, quàm  $3q2.$

sup.  $O.3+3$ , est minor, quàm  $3q+u.$

Incrementum  $O.3a2$ , est minus incremento  $q3.$

Quod &c.

26. b.  $O.3a2$ , pro binario, est maior, quàm  $m3$ ; minor,  
 quàm  $q3.$   $O.3a2,$



$O.3a2$ , pro ternario, est maior, quàm  $m3$ ; minor, quàm  $q3$ : necnon pro quaternario, & reliquis deinceps numeris. Quod &c.

Dico  $O.6ar$  incrementum, maius esse incremento  $m3$ ; minus incremento  $q3$ : &  $O.6ar$ , maiorem esse, quàm  $m3$ ; minorem, quàm  $q3$ .

*Demonstr.*

2. h. Incrementum  $O.6ar$ , est  $O.6r+6t$ .  
 8. p. Incrementum  $m3$ , est  $3m2+3m+u$ .  
 8. p. Incrementum  $q3$ , est  $3q2+3q+u$ .  
 $O.6r$ , maior est, quàm  $3m2$ .  
 $6t$ , maior est, quàm  $3m+u$ .  
 Incrementum  $O.6ar$ , maius est incremento  $m3$ .  
 Quod &c.
29. h.  $O.2r+2t$ , minor est, quàm  $q2$ .  
 $O.6r+6t$ , minor est, quàm  $3q2+3q+u$ .  
 Incrementum  $O.6ar$ , minus est incremento  $q3$ .  
 Quod &c.
26. h.  $O.6ar$ , pro binario, est maior, quàm  $m3$ ; minor, quàm  $q3$ .  
 $O.6ar$ , pro ternario, & pro reliquis numeris, est maior, quàm  $m3$ , minor, quàm  $q3$ . Quod &c.

Dico  $O.4a3$  incrementum, maius esse incremento  $m4$ ; minus incremento  $q4$ : &  $O.4a3$ , maiorem esse, quàm  $m4$ ; minorem, quàm  $q4$ .

*De-*



*Demonstr.*2. h. | Incrementū  $O.4a3$ , est  $O.12a2 \rightarrow O.12a + O.4 + 4$ .8. p. | Incrementum  $m4$ , est  $4m3 + 6m2 + 4m + u$ .8. p. | Incrementum  $q4$ , est  $4q3 + 6q2 + 4q + u$ .sup. |  $O.12a2$ , maior est, quā  $4m3$ .sup. |  $O.12a$ , maior, quā  $6m2$ .sup. |  $O.4 : 4m$ .4 maior, quā  $u$ .Incrementum  $O.4a3$ , maius incremento  $m4$ .

Quod &amp;c.

sup. |  $O.12a2$ , minor est, quā  $4q3$ .sup. |  $O.12a$ , minor, quā  $6q2$ .sup. |  $O.4 + 4 : 4m + 4 : 4t$ . $O.4 + 4$ , minor est, quā  $4q + u$ .Incrementum  $O.4a3$ , minus incremento  $q4$ .

Quod &amp;c.

26. h. |  $O.4a3$ , pro binario, maior est, quā  $m4$ ; minor, quā  $q4$ . $O.4a3$ , pro ternario, & pro alio quolibet numero, maior est, quā  $m4$ ; minor quā  $q4$ . Quod &c.Dico  $O.12a2r$  incrementum, maius esse incremento  $m4$ ; minus incremento  $q4$ : &  $O.12a2r$ , maiorem esse, quā  $m4$ ; minorem, quā  $q4$ .*Demonstr.*2. h. | Incrementum  $O.12a2r$ , est  $O.24ar + O.12r + 12t$ .8. p. | Incrementum  $m4$ , est  $4m3 + 6m2 + 4m + u$ .

In-



8. p. Incrementum  $q4$ , est  $4q3 + 6q2 + 4q + u$ .  
 sup.  $O.24ar$ , maior est, quàm  $4m3$ .  
 sup.  $O.12r$ , maior, quàm  $6m2$ .  
 $12t$ , maior, quàm  $4m + u$ .  
 Incrementum  $O.12a2r$ , maius est incrementò  $m4$ .  
 Quod &c.  
 sup.  $O.24ar$ , minor est, quàm  $4q3$ .  
 29. b.  $O.12r + 12t$ , minor, quàm  $6q2 + 4q + u$ .  
 Incrementum  $O.12a2r$ , minus incremento  $q4$ .  
 Quod &c.  
 26. b.  $O.12a2r$ , pro binario, maior, quàm  $m4$ ; minor  
 est, quàm  $q4$ .  
 $O.12a2r$ , pro ternario, maior est, quàm  $m4$ ; mi-  
 nor, quàm  $q4$ , necnon quo alio quolibet nu-  
 mero. Quod &c.

Dico  $O.5a4$ , incrementum, maius esse incrementò  $m5$ ;  
 minus incremento  $q5$ : &  $O.5a4$ , maiorem esse, quàm  $m5$ ;  
 minorem, quàm  $q5$ .

*Demonstr.*

2. b. Incrementum  $O.5a4$ , est  $O.20a3 + O.30a2$   
 $+ O.20a + O.5 + 5$ .  
 8. p. Incrementum  $m5$ , est  $5m4 + 10m3 + 10m2$   
 $+ 5m + u$ .  
 8. p. Incrementum  $q5$ , est  $5q4 + 10q3 + 10q2 + 5q + u$ .  
 sup.  $O.20a3$ , maior est, quàm  $5m4$ .  
 sup.  $O.30a2$  maior est, quàm  $10m3$ .  
 sup.  $O.20a$ , maior est, quàm  $10m2$ .

$O.5$



*sup.* |  $O.5+5$ , maior est, quàm  $5m+u$ .  
Incrementum  $O.5a4$ , maius est incremento  $m5$ .  
Quod &c.

*sup.* |  $O.20a3$ , minor est, quàm  $5q4$ .

*sup.* |  $O.30a2$ , minor est, quàm  $10q3$ .

*sup.* |  $O.20a$ , minor est, quàm  $10q2$ .

*sup.* |  $O.5+5$  minor est, quàm  $5q+u$ .

Incrementum  $O.5a4$ , minus est incremento  $q5$ .  
Quod &c.

26. b. |  $O.5a4$ , pro binario, maior est, quàm  $m5$ ; minor,  
quàm  $q5$ .

$O.5a4$ , pro ternario, & reliquis numeris, maior  
est, quàm  $m5$ ; minor, quàm  $q5$ . Quod &c.

Dico  $O.20a3r$ , incrementum, maius esse incremento  
 $m5$ ; minus incremento  $q5$ : &  $O.20a3r$ , maiorem esse, quàm  
 $m5$ ; minorem, quàm  $q5$ .

*Demonstr.*

2. b. |  $O.20a3r$  incrementum, est  $O.60a2r + O.60ar +$   
 $O.20r + 20t$ .

8. p. | Incrementum  $m5$ , est  $5m4 + 10m3 + 10m2 + 5m$   
 $+u$ .

8. p. | Incrementum  $q5$ , est  $5q4 + 10q3 + 10q2 + 5q + u$ .

*sup.* |  $O.60a2r$ , maior est, quàm  $5m4$ .

*sup.* |  $O.60ar$ , maior est, quàm  $10m3$ .

*sup.* |  $O.20r$ , maior est, quàm  $10m2$ .

$20t$ , maior est, quàm  $5m+u$ .

Incrementum  $O.20a3r$ , maius est incremento  $m5$ .  
Quod &c.

0.60



*sup.* |  $O.60a2r$ , minor est, quàm  $5q4$ .

*sup.* |  $O.60ar$ , minor est, quàm  $10q3$ .

29. *b.* |  $O.2or+2ot$ , minor est, quàm  $10q2+5q+u$ .

Incrementum  $O.20a3r$ , minus est incremento  $q5$ .

Quod &c.

26. *b.* |  $O.20a3r$ , pro binario, maior est, quàm  $m5$ ; minor, quàm  $q5$ .

$O.20a3r$ , pro ternario, & reliquis numeris, maior est, quàm  $m5$ ; minor, quàm  $q5$ . Quod &c.

Dico  $O.30a2r2$  incrementum, maius esse incremento  $m5$ ; minus incremento  $q5$ : &  $O.30a2r2$ , maiorem esse, quàm  $m5$ ; minorem, quàm  $q5$ .

*Demonstr.*

2. *b.* | Incrementum  $O.30a2r2$ , est  $O.60ar2+O.3or2+3ot2$ .

8. *p.* | Incrementum  $m5$ , est  $5m4+10m3+10m2+5m+u$ .

8. *p.* | Incrementum  $q5$ , est  $5q4+10q3+10q2+5q+u$ .

*sup.* |  $O.60ar2$ , maior est, quàm  $5m4$ .

*sup.* |  $O.3or2$ , maior est, quàm  $10m3$ .

$O.3ot2$ , maior est, quàm  $10m2+5m+u$ .

Incrementum  $O.30a2r2$ , maius est incremento  $m5$ . Quod &c.

*sup.* |  $O.60ar2$ , minor est, quàm  $5q4$ .

29. *b.* |  $O.3or2+3ot2$ , minor est, quàm  $10q3$ .

Incrementum  $O.30a2r2$ , minus est incremento  $q5$ . Quod &c.

M

O.30



26. h. | O.30a2r2, pro binario, maior est, quàm m5;  
 minor, quàm q5.  
 | O.30a2r2, pro ternario, alioue quolibet nume-  
 ro, maior est, quàm m5; minor, quàm q5.  
 | Quod &c.

Similiter ostendetur de omnibus quadratricibus in infi-  
 nitum, hac semper methodo seruata.

Quare &c.

*Theor. 31. Prop. 31.*

**Q**uælibet quadratrix est æqualis semitotæ vnitate plus  
 ordinatæ, additis, demptisque semitotis, aliqua-  
 liter acceptis, non plus ordinatis, quàm sit eius  
 basis.

*Demonstr.*

Patet inductione per 6.h.

22. h. | Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqua-  
 | listotæ, vnitate plus ordinatæ, demptis, additisq;  
 | aliquàliter acceptis totis, non plus ordinatis, quàm  
 6. h. | sit eius basis. Tota verò vnitate plus ordinata, est  
 | æqualis semitotæ pariter ordinatæ, vnà cum semi-  
 | totis non plus ordinatis, aliquàliter acceptis, &  
 | vnitate: & reliquæ totæ non plus ordinatæ, sunt  
 | æquales semitotis, non plus ordinatis, aliquàliter  
 | acceptis, & vnitati.

Quare quælibet quadratrix est æqualis semitotæ vnita-  
 te plus ordinatæ additis &c.

*Theor.*



*Theor. 32. Prop. 32.*

**Q**uælibet quadratrix est æqualis sesquiotæ, vnitæ, plus ordinatæ, demptis, additisque sesquiotis, aliququaliter acceptis, non plus ordinatis, quàm sit eius basis.

*Demonstr.*

Patet inductione per 7.h.

22. h.

Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqualis totæ, vnitæ plus ordinatæ, demptis, additisque aliququaliter acceptis totis, non plus ordinatis, quàm sit eius basis. Tota verò, vnitæ plus ordinatæ, æqualis est sesquiotæ, pariter ordinatæ, demptis, additisque alijs, acceptis aliququaliter sesquiotis non plus ordinatis: & reliquæ totæ non plus ordinatæ, sunt sesquiotis additis, & subtractis, non plus ordinatis æquales. Ergo quælibet quadratrix, est æqualis sesquiotæ vnitæ plus ordinatæ, demptis, additisque alijs, acceptis aliququaliter sesquiotis, non plus ordinatis, quam sit eius basis.

*Theor. 33. Prop. 33.*

**Q**uælibet quadratrix media, est æqualis quadratrici, in eadem basi, primæ, vna cum alijs primi lateris speciebus, aliququaliter acceptis. Et subquadratrix, subquadratrici.

*Demonstr.*

Patet inductione per 8.h.

M 2

De-



12. h. | Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqualis totæ, vnitæ plus ordinatæ, quàm sit eius basis, demptis, additisue alijs totis, aliquàliter acceptis,
14. h. | non plus ordinatis, quàm sit eius basis. Tota autē vnitæ plus ordinata, est æqualis quadratrici primæ, in æqueordinata basi iacenti, vna cum alijs speciebus, in primo latere, in inferioribus basibus, aliquàliter acceptis. Et reliquæ inferiores totæ, similiter inferioribus quadratricibus, & speciebus sunt æquales, aliquàliter acceptis. Quare quælibet quadratrix media, est æqualis primæ, in eadem basi, iacenti quadratrici, vnâ cum alijs primi lateris speciebus, aliquàliter acceptis. Et subquadratrix, subquadratrici.
2. p.

*Theor. 34. Prop. 34.*

**Q**uælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadem basi, vicinæ, additis vtriusque totis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Et subquadratrix, subquadratrici.

*Demonstr.*

Patet inductione per 9. h.

21. h. | Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ, additis vtriusque alijs inferiorum basium speciebus, aliquàliter acceptis, & totis non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Sunt autem aliæ inferiorum basium species, æquales totis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa
22. h.



2. p. | Ipsa basis, aliquo modo acceptis. Ergo quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ additis utrimque; totis, non plus ordinatis quàm sit ipsa basis. Et subquadratrix subquadratrici.

*Theorema 35. Prop. 35.*

**Q**uælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ, additis utrimque semitotis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Et subquadratrix, subquadratrici.

*Demonstr.*

Patet inductione per 10. h.

34. h. | Deinde sic. Quælibet quadratrix est æqualis quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ, additis utrimque; totis non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Totæ autem non plus ordinatæ, semitotis non plus ordinatis, acceptis aliquo modo, sunt æquales. Ergo quælibet quadratrix est æqualis quadratrici in eadem basi sibi vicinæ, additis utrimque semitotis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Et subquadratrix, subquadratrici.

*Theor. 36. Prop. 36.*

**Q**uælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ, additis utrimque sesquiotis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Et subquadratrix, subquadratrici.

*De-*



*Demonstr.*

Patet inductione per 11. h.

34. h. | Deinde sic. Quælibet quadratrix est æqualis  
 quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ, additis  
 vtrunque totis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa  
 7. h. | basis. Totæ autem, non plus ordinatæ, sesquito-  
 tis, non plus ordinatis, acceptis aliquàliter, sunt  
 æquales. Ergo quælibet quadratrix, est æqualis  
 quadratrici, in eadē basi, sibi vicinæ, additis vtrim-  
 que totis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis.  
 2. p. | Et subquadratrix, subquadratrici.

*Theor. 37. Prop. 37.*

Q Vælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, sibi, in  
 eadem basi, vicinæ, additis vtrunque primi lateris  
 speciebus, inferiorum basium. Et subquadratrix, subqua-  
 dratrici.

*Demonstr.*

Patet inductione per 12. h.

34. h. | Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqualis  
 quadratrici, sibi, in eadē basi vicinæ, additis vtrunq;  
 totis, nō plus ordinatis, quàm sit ipsa basis, aliqua-  
 14. h. | liter acceptis. quæ tote, sunt æquales speciebus in-  
 feriorū basium, primi lateris, aliquàliter acceptis.  
 Ergo quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici  
 sibi in eadem basi vicinæ, additis vtrunq; primi la-  
 2. p. | teris speciebus, inferiorum basium. Et subqua-  
 dratrix, subquadratrici.

Pe-





Petrus Mengolus, Illustrissimo D. Fabio Alaman-  
dino, Nobili Bononiensi, Domino suo maximè  
recolendo, beatè viuere.



*E* quasi proportionibus, inauditum  
hucusque Geometricum elementum,  
ad theoremata, ceteroqui difficilli-  
ma, facili negotio soluenda, cum in-  
stituerim: ex ijs, qui meam scholam  
frequentarunt, prater te, Iuuenis Illustrissime, ne-  
minem habeo satis dispositum; qui rem subtilissi-  
mam valeat intelligere. Cumque verear, si forte  
possit intelligi, quod legendum omnibus propono;  
nisi prius ipse oretenus, alicui eius doctrina satis  
capaci, meam sententiam explicuerim: apud te  
precator accessi; ut dignareris ( licet vacationum  
tempore admodum necessario ) ruralibus partim  
delicijs, partim negotijs quidquam detrahere; pri-  
uatique meis lucubrationibus auditor interuenire.  
Pro tua benignitate statim, quod postulabam, im-  
ple-



pleuisti: & concessum tibi diuinitus intellectum, subtilissimum, inuentis meis, ea intentione adhibuisti; ut & me ipsum inuentorem, & praelectorem, in plurimis etiam praeuenires. Plurimas itaque tibi primum gratias profiteor: quod tam humiliter, & liberaliter, me de studijs meis priuatis tecum patiariis communicare. Deinde illas easdem lucubrationes, unà cum alijs praecedentium elementorum, plenius tractatas, praelegendas offero, scriptis praesentibus; antequam totum opus publici iuris esse incipiat: non quasi gratiam redditurus; sed in mei erga te obsequij monumentum.

Vale.




GEO.





# GEOMETRIÆ SPECIOSÆ ELEMENTVM TERTIVM.

## DEFINITIONES.



1. **R**atio indeterminata determinabilis, quæ in-  
determinari, potest esse maior, quam data,  
quælibet, quatenus ita determinabilis, di-  
cetur Quasi infinita.

2. Et quæ potest esse minor, quàm data quælibet, qua-  
tenus ita determinabilis, dicetur, Quasi nulla.

3. Et quæ potest esse minor, quàm data quælibet ma-  
ior inæqualitas; & maior, quàm data quælibet minor inæ-  
qualitas, quatenus ita determinabilis, dicetur, Quasi æqua-  
litas. Vel aliter. quæ potest esse propior æqualitati,  
quàm data quælibet non æqualitas, quatenus talis, dice-  
tur, Quasi æqualitas.

4. Et quæ potest esse minor, quàm data quælibet ma-  
ior, propositâ quadam ratione; & maior, quàm data quæ-  
libet minor, propositâ eâdem ratione, quatenus ita deter-

N

mina-



minabilis, dicetur, Quasi eadem ratio. Vel aliter, quæ potest esse propior cuidam propositæ rationi, quàm data quælibet alia non eadem, quatenus talis, dicetur, Quasi eadem.

5. Et rationum quasi earundem inter se, termini dicentur, Quasi proportionales.

6. Et quasi æqualitatum, dicentur, Quasi æquales.



Theor.



*Theor. 1. Prop. 1.*

**I** Næqualium rationum maior, permutando, est maior.  
item componendo, & diuidendo, est maior.

*Demonstr.*

def. 8. 5. | Maioris enim rationis antecedens, maior est,  
quàm proportionalis, cum reliquis terminis: &  
dempta quantitate, vt proportionalis relinquatur;  
2. p. | permutando, & componendo, & diuidendo, pro-  
8. 5. | portionalis erit, & antecedens; eademq; restituta  
quantitate, erit antecedens maior, quàm propor-  
tionalis, permutatæ, aut compositæ, aut diuisæ  
proportionalitatis. Quod &c.

Quare &c.

*Theorema 2. Prop. 2.*

**I** Næqualium rationum maior, conuertendo, est mi-  
nor.

*Demonstr.*

def. 8. 5. | Nam maioris rationis consequens est minor,  
quàm proportionalis, cum reliquis terminis: fa-  
ctusque conuertendo antecedens, adhuc est mi-  
nor, quàm proportionalis, cum reliquis terminis.  
Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 3. Prop. 3.*

**I** Næqualium rationum maior, per conuersionem ratio-  
nis, est minor.

N 2

Hy-



*Hypoth.* $a; b$ : maior, quàm  $c; d$ . $a$ : maior, quàm  $b$ . $c$ : maior, quàm  $d$ .Dico  $a; a--b$ : minorem esse, quàm  $c; c--d$ .*Demonst.**hyp.* |  $a; b$ : maior, quàm  $c; d$ .*p. b.* |  $a--b; b$ : maior, quàm  $c--d; d$ .*2. b.* |  $b; a--b$ : minor, quàm  $d; c--d$ .*p. b.* |  $a; a--b$ : minor, quàm  $c; c--d$ . Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 4. Prop. 4.***E**X maioribus rationibus, ex æquali, maior est ratio composita: & ex minoribus, minor.*Hypoth.* $a; b$ : maior, quàm  $c; d$ . $e; f$ : maior, quàm  $g; h$ .Dico  $a; b, +e: f$ : maiorem esse, quàm  $c; d, +g; h$ .*Præpar.* $a; b: i; d$ . $e; f: d; l$ . $g; h: d; m$ .*Demonstr.**constr.* |  $a; b: i; d$ .*hypoth.* |  $a; b$ : maior, quàm  $c; d$ .*13. 5.* |  $i; d$ : maior, quàm  $c; d$ .*i: ma-*



10. 5.  $i$ : maior, quàm  $c$ .  
 constr.  $e$ ;  $f$ :  $d$ ;  $l$ .  
 hypoth.  $e$ ;  $f$ : maior, quàm  $g$ ;  $h$ .  
 23. 5.  $d$ ;  $l$ : maior, quàm  $g$ ;  $h$ .  
 constr.  $g$ ;  $h$ :  $d$ ;  $m$ .  
 13. 5.  $d$ ;  $l$ : maior, quàm  $d$ ;  $m$ .  
 10. 5.  $l$ : minor, quàm  $m$ .  
 8. 5.  $i$ :  $l$ : maior, quàm  $c$ ;  $m$ .  
 p. p.  $a$ ;  $b$ ;  $+e$ ;  $f$ :  $i$ ;  $d$ ;  $+d$ ;  $l$ :  $i$ ;  $l$ .  
 p. p.  $c$ ;  $d$ ;  $+g$ ;  $h$ :  $c$ ;  $d$ ;  $+d$ ;  $m$ :  $c$ ;  $m$ .  
 $a$ ;  $b$ ;  $+e$ ;  $f$ : maior, quàm  $c$ ;  $d$ ;  $+g$ ;  $h$ . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 5. Prop. 5.

**M**Aioris inæqualitatis plus multiplicata ratio, maior est, quàm minùs: & minoris, minor.

Hypoth.

- $a$ : maior, quàm  $b$ .  
 3. p.  $a_3$ ;  $b_3$ : triplicata  $a$ ;  $b$ .  
 3. p.  $a_2$ ;  $b_2$ : duplicata  $a$ ;  $b$ .  
 Dico  $a_3$ ;  $b_3$ : maiorem, quàm  $a_2$ ;  $b_2$ .  
 Et  $b_3$ ;  $a_3$ : minorem, quàm  $b_2$ .  $a_2$ .

Demonstr.

- def. 6. p.  $a_3$ ;  $a_2$ :  $a$ ;  $u$ .  
 def. 6. p.  $b_3$ ;  $b_2$ :  $b$ ;  $u$ .  
 8. 5.  $a$ ;  $u$ : maior, quàm  $b$ ;  $u$ .  
 13. 5.  $a_3$ ;  $a_2$ : maior, quàm  $b_3$ ;  $b_2$ .

$a_3$ ;



p. b. |  $a_3 ; b_3$  : maior, quàm  $a_2 ; b_2$ . Quod &c.  
 2. b. |  $b_3 ; a_3$  : minor, quàm  $b_2 ; a_2$ . Quod &c.  
 Quare &c.

---

Theor. 6. Prop. 6.

**S**I prima ad secundam, maiorem habuerit rationem, quàm tertia ad quartam: etiam æqueproportionales cum prima, & tertia, ad æqueproportionales cum secunda, & quarta, maiorem habebunt rationem, si prout sibi respondent, ita sumantur.

Hypoth.

$a ; b$  : maior, quàm  $c ; d$ .

$a ; c$  :  $e ; f$ .

$b ; d$  :  $g ; h$ .

Dico  $e ; g$  : maiorem esse, quàm  $f ; h$ .

Demonstr.

hypoth. |  $a ; b$  : maior, quàm  $c ; d$ .

p. b. |  $a ; c$  : maior, quàm  $b ; d$ .

13. 5. |  $e ; f$  : maior, quàm  $g ; h$ .

p. b. |  $e ; g$  : maior, quàm  $f ; h$ . Quod &c.

Quare &c.

---

Theor. 7. Prop. 7.

**R**atio quasi infinita, conuertendo, est quasi nulla.

Hypoth.

Esto ratio  $A$  ad  $B$ , quasi infinita.

Dico conuertendo,  $B$  ad  $A$ , esse quasi nullam.

Pro-



*Præpar.*

Assumatur quælibet ratio  $c$  ad  $d$ .

*Demonstr.*

*def. 1. b.* Ratio  $A$  ad  $B$ , maior potest esse, quàm  $d$  ad  $c$ :

*2. b.* Ergo convertendo,  $B$  ad  $A$ , minor potest esse,

*def. 2. b.* quàm  $c$  ad  $d$ . Ergo  $B$  ad  $A$ , est ratio quasi nulla.

Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 8. Propos. 8.*

**R**atio quasi infinita, componendo, est quasi infinita:  
item diuidendo, est quasi infinita.

*Hypoth.*

Esto ratio  $A$  ad  $B$ , quasi infinita.

Dico componendo  $A+B$  ad  $B$ , esse quasi infinitam.

*Præpar.*

Assumatur quælibet ratio  $c$  ad  $d$ : quod si  $c$ , est maior, quàm  $d$ ; sit excessus  $e$ .

*Demonstr.*

*8. 5.* Si quidem  $c$  est æqualis, vel minor, quàm  $d$ : pa-

*def. 1.* tet, quod  $A+B$  ad  $B$ , maior potest esse, quàm

*p. b.*  $c$  ad  $d$ . Quod si  $c$  est maior, quàm  $d$ : quoniam

*o. g.*  $A$  ad  $B$ , maior potest esse, quàm  $e$  ad  $d$ : ergo

*præpar.* componendo,  $A+B$  ad  $B$ , maior potest esse, quàm

*def. 1.*  $e+d$  ad  $d$ : sed  $e+d$  est  $c$ : ergo  $A+B$  ad  $B$ , ma-

ior potest esse, quàm  $c$  ad  $d$ . Ergo  $A+B$  ad  $B$ ,

ratio est quasi infinita. Quod &c.

Dico



Dico diuidendo  $A \text{---} B$  ad  $B$ , rationem esse quasi infinitam.

*Demonstr.*

def. 1. | Ratio  $A$  ad  $B$ , potest esse maior, quàm  $c + d$  ad  $d$ :  
 p. h. | Ergo diuidendo  $A \text{---} B$  ad  $B$ , potest esse maior,  
 def. 1. | quàm  $c$  ad  $d$ . Ergo  $A \text{---} B$  ad  $B$ , ratio est quasi  
 infinita. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 9. Pro. 9.*

**R**atio quasi infinita, per conuersionem rationis, est quasi æqualitas.

*Hypoth.*

Esto ratio  $A$  ad  $B$ , quasi infinita.

Dico, per conuersionem rationis,  $A$  ad  $A \text{---} B$ , esse quasi æqualitatem.

*Præpar.*

Assumatur quælibet ratio non æqualitas, cuius maior terminus  $c$ , minor  $d$ .

*Demonstr.*

def. 1. b. | Ratio  $A$  ad  $B$ , potest maior esse, quàm  $c$  ad  
 3. h. |  $c \text{---} d$ : ergo, per conuersionem rationis,  $A$  ad  
 |  $A \text{---} B$ , potest minor esse, quàm  $c$  ad  $d$ : & est  
 | maior æqualitate: ergo  $A$  ad  $A \text{---} B$ , est propior  
 def. 3. b. | æqualitati, quàm sit proposita ratio  $c$  ad  $d$ : ergo  
 | ratio  $A$  ad  $A \text{---} B$ , est quasi æqualitas. Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor.*







3. *h.* | ad  $A$ , potest maior esse, quàm  $c$  ad  $c---d$ : ergo  
 | per conuersionem rationis  $A+B$  ad  $B$  potest mi-  
 | nor esse, quàm  $c$  ad  $d$ : & est maior æqualitate: er-  
*def. 3. h.* | go  $A+B$  ad  $B$ , est propior æqualitati, quàm  $c$  ad  $d$ :  
 | ergo  $A+B$  ad  $B$ , est quasi æqualitas. Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 12. Prop. 12.*

**E**X rationibus quasi infinitis, ex æquali, quasi infinitæ sunt rationes compositæ.

*Hypoth.*

$A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , sunt rationes quasi infinitæ.

Dico ex æquali, ex  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$  compositam, esse quasi infinitam.

*Præpar.*

Assumatur  $e$  ad  $f$ . ratio quælibet.

*Demonstr.*

*def. 1. h.* | Quoniam  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , sunt rationes  
 | quasi infinitæ: posunt esse  $A$  ad  $B$ , maior, quàm  
 4. *h.* |  $e$  ad  $f$ ; &  $C$  ad  $D$ , maior æqualitate. Quare  
 | & utrisque  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , composita ra-  
 | tio, potest esse maior, quàm ex  $e$  ad  $f$ , & ex  
 7. 5. | æqualitate, composita; idest, quàm ipsa  $e$  ad  $f$   
*def. 1. h.* | ratio. Quare ex utrisque  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ ,  
 | composita ratio est quasi infinita. Quod &c.

Quare &c.

*Theor.*



*Theor. 13. Prop. 13.*

**E**X rationibus quasi nullis, ex æquali, quasi nullæ sunt rationes compositæ.

*Hypoth.*

*A* ad *B*, & *C* ad *D*, sunt rationes quasi nullæ.

Dico ex æquali, ex *A* ad *B*, & *C* ad *D* rationem compositam, esse quasi nullam.

*Prepar.*

Assumatur quælibet ratio *e* ad *f*.

*Demonstr.*

Quoniam *A* ad *B*, & *C* ad *D* sunt rationes  
*def. 2. b.* quasi nullæ, possunt esse, *A* ad *B*, minor, quàm  
*e* ad *f*; & *C* ad *D*, minor æqualitate. Quare  
*4. b.* ex utrisque *A* ad *B*, & *C* ad *D*, composita ra-  
 tio, potest esse minor, quàm ex utrisque *e* ad *f*,  
*7. 5.* & ex æqualitate composita; idest, quàm ipsa *e* ad  
*f*. Quare ex utrisque *A* ad *B*, & *C* ad *D*, com-  
*def. 2. b.* posita ratio est quasi nulla. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 14. Prop. 14.*

**R**atio quasi æqualitas, conuertendo, est quasi æqua-  
 litas.

*Hypoth.*

Estio ratio *A* ad *B*, quasi æqualitas.

Dico conuertendo, *B* ad *A*, quasi æqualitatem esse.

O 2

*Præ-*



*Præpar.*

Assumantur duæ quælibet rationes,  $c$  ad  $d$ , maior æqualitate: &  $e$  ad  $f$ , minor.

*Demonstr.*

Quoniam ratio  $c$  ad  $d$ , est maior æqualitate;  
 2. b. | ergo conuertendo,  $d$  ad  $c$ , est minor æqualitate:  
 2. b. | & quoniam  $e$  ad  $f$ , est minor æqualitate; ergo  
 hypoth. | conuertendo  $f$  ad  $e$ , est maior æqualitate. Et  
 def. 3. h. | quoniam  $A$  ad  $B$ , est quasi æqualitas: ergo po-  
 2. b. | test  $A$  ad  $B$ , maior esse, quàm  $d$  ad  $c$ , & minor,  
 | quàm  $f$  ad  $e$ : ergo conuertendo potest  $B$  ad  $A$ ,  
 | minor esse, quàm  $c$  ad  $d$ , & maior, quàm  $e$  ad  $f$ .  
 def. 3. h. | Ergo  $B$  ad  $A$ , est quasi æqualitas. Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 15. Prop. 15.*

**R**atio quasi æqualitas, componendo, est quasi dupla.

*Hypoth.*

Esto ratio  $A$  ad  $B$ , quasi æqualitas.

Dico componendo  $A + B$  ad  $B$ , esse quasi duplam.

*Præpar.*

Assumantur duæ quælibet rationes  $c$  ad  $d$ , maior, quàm dupla: &  $e$  ad  $f$ , maior quidem æqualitate, sed minor, quàm dupla.

*Demonstr.*

constr. | Quoniam  $c$  ad  $d$ , est maior, quàm dupla,  
 p. b. | diuidendo,  $c - d$  ad  $d$ , est maior æqualitate: &  
 quo-



*constr.* | quoniam  $e$  ad  $f$ , est maior æqualitate, sed mi-  
*p. h.* | nor, quàm dupla; diuidendo,  $e - f$  ad  $f$ , est minor  
*def. 3. h.* | æqualitate. Et quoniam  $A$  ad  $B$ , est quasi æqua-  
*p. h.* | litas; potest  $A$  ad  $B$ , minor esse, quàm  $c - d$  ad  
*def. 4. h.* |  $d$ ; & maior, quàm  $e - f$  ad  $f$ . Ergo compo-  
 nendo, potest  $A + B$  ad  $B$ , minor esse, quàm  $c$  ad  
 $d$ ; & maior, quàm  $e$  ad  $f$ . Ergo  $A + B$  ad  $B$ ,  
 est quasi dupla. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 16. Prop. 16.*

**R**atio quasi æqualitas, diuidendo, est quasi nulla.

*Hypoth.*

Esto ratio  $A$  ad  $B$  quasi æqualitas: & esto  $A$  maior,  
quàm  $B$ .

Dico diuidendo  $A - B$  ad  $B$ , esse quasi nullam.

*Prepar.*

Assumatur qualibet ratio  $c$  ad  $d$ .

*Demonstr.*

*hyp.* | Quoniam  $A$  ad  $B$ , est quasi æqualitas; & est  $A$   
 maior, quàm  $B$ ; &  $c + d$  maior, quàm  $d$ : ergo  
*def. 3. h.* | potest  $A$  ad  $B$  ratio, minor esse, quàm  $c + d$  ad  
*p. h.* |  $d$ : ergo diuidendo potest  $A - B$  ad  $B$  ratio, mi-  
*def. 3. h.* | nor esse, quàm  $c$  ad  $d$ : ergo  $A - B$  ad  $B$ , ratio  
 est quasi nulla. Quod &c.

Quare &c.

*Theor.*



*Theor. 17. Prop. 17.*

**R**atio quasi æqualitas, per conuersionem rationis est quasi infinita.

*Hypoth.*

Est ratio quasi æqualitas  $A$  ad  $B$ : & esto  $A$  maior, quàm  $B$ .

Dico, per conuersionem rationis,  $A$  ad  $A \dashv\dashv B$ , rationem esse quasi infinitam.

*Præpar.*

Assumatur quælibet ratio maioris inæqualitatis  $c$  ad  $d$ .

*Demonstr.*

*hyp.* | Quoniam  $A$  ad  $B$ , est quasi æqualitas; & est  $A$   
*def. 3. h.* | maior, quàm  $B$ ; item  $c$  maior, quàm  $c \dashv\dashv d$ : er-  
*3. h.* | go ratio  $A$  ad  $B$ , potest minor esse, quàm  $c$  ad  
 |  $c \dashv\dashv d$ : ergo per conuersionem rationis,  $A$  ad  
 |  $A \dashv\dashv B$  ratio, potest maior esse, quàm  $c$  ad  $d$ : &  
 | est maior omnibus, tum æqualitatis, tum minoris  
*def. p. h.* | inæqualitatis rationibus: ergo  $A$  ad  $A \dashv\dashv B$  ratio  
 | est quasi infinita. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 18. Prop. 18.*

**Q**uæ eidem sunt quasi æqualia, inter se sunt quasi æqualia.

*Hypoth.*

Sunt  $A, B$ , quasi æqualia: item  $B, C$ , quasi æqualia.

Dico  $A, C$ , quasi æqualia esse.

*Præ-*



*Prepar.*

Assumatur quælibet ratio  $d$  ad  $e$ , non æqualitas: cuius maior terminus  $d$ , minor  $e$ . & inter  $d$ ,  $e$ , media sumatur  $f$ .

*Demonstr.*

*def. 3. h.* Quoniam  $A$ ,  $B$ , sunt quasi æqualia, potest  $A$  ad  $B$ , minus esse, quàm  $d$  ad  $f$ : & maius, quàm  $f$  ad  $d$ . Item  $B$  ad  $C$  potest minus esse, quàm  $f$  ad  $e$ , & maius, quàm  $e$  ad  $f$ . Ergo ex æquali, potest  $A$  ad  $C$  minus esse, quàm  $d$  ad  $e$ ; & *def. 3. h.* maius, quàm  $e$  ad  $d$ , ergo  $A$  ad  $C$ , quasi est æqualis. Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 19. Propos. 19.*

**Q**uæ eidem sunt quasi eædem rationes, inter se sunt quasi eædem.

*Hypoth.*

$A$  ad  $B$ , quasi eadem est, quæ  $C$  ad  $D$ : &  $C$  ad  $D$ , quasi eadem, quæ  $E$  ad  $F$ .

Dico  $A$  ad  $B$ , quasi eadem esse quæ  $E$  ad  $F$ .

*Prepar.*

Assumatur quælibet ratio  $g$  ad  $h$ , maior, quàm cui propior potest esse  $E$  ad  $F$ : & quælibet  $i$  ad  $l$ , minor.

*Demonstr.*

*def. 4. h.* Quoniam  $C$  ad  $D$ , quasi eadem est, quæ  $E$  ad  $F$ : potest  $C$  ad  $D$ , minor esse, quàm  $g$  ad  $h$ ; & *2. h.* maior, quàm  $i$  ad  $l$ . Ergo  $g$  ad  $h$ , maior est, quàm



quàm cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ ; &  $i$  ad  $l$ ,  
*def. 4. b.* minor. Et quoniam  $A$  ad  $B$ , quasi est eadem,  
 quæ  $C$ . ad  $D$ : ergo  $A$  ad  $B$ , potest esse minor,  
*constr.* quàm  $g$  ad  $h$ ; & maior, quàm  $i$  ad  $l$ . Sed  $g$  ad  
 $h$  est quælibet assumpta, maior, quàm cui pro-  
 prior potest esse  $E$  ad  $F$ ; &  $i$  ad  $l$ , est quælibet  
*def. 4. b.* assumpta, minor: ergo  $A$  ad  $B$ , est quasi eadem,  
 quæ  $E$  ad  $F$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 20. Prop. 20.*

**Q**uasi proportionales, conuertendo, sunt quasi pro-  
 portionales.

*Hypoth.*

Sint quasi proportionales  $A$  ad  $B$ , vt  $C$  ad  $D$ .

Dico conuertendo, quasi proportionales esse  $B$  ad  $A$ ,  
 vt  $D$  ad  $C$ .

*Prepar.*

Sumatur quælibet  $e$  ad  $f$ , maior, quàm cui  
 propior potest esse  $D$  ad  $C$ ; & quælibet  $g$  ad  $h$ ,  
*2. h.* minor: & erit conuertendo, sumpta  $f$  ad  $e$ , mi-  
 nor, quàm cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ ; &  $h$  ad  
 $g$ , maior.

*Demonstr.*

*hypoth.* Quoniam  $A$  ad  $B$ , quasi est eadem, quæ  $C$   
*def. 4. b.* ad  $D$ : ergo  $A$  ad  $B$ , potest esse minor, quàm  $h$   
*2. h.* ad  $g$ ; & maior, quàm  $f$  ad  $e$ : ergo conuertendo,  
 do,



do,  $B$  ad  $A$ , potest esse maior, quàm  $g$  ad  $h$ ; &  
*def. 4. b.* minor, quàm  $e$  ad  $f$ : ergo  $B$  ad  $A$ , quasi eadem  
 est, quæ  $D$  ad  $C$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 21. Prop. 21.*

**E**X quasi iisdem rationibus, ex æquali, quasi eadem  
 sunt rationes compositæ.

*Hypoth.*

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| $A$ | $B$ | $C$ | $D$ |
| $E$ | $F$ | $G$ | $H$ |
| $i$ | $n$ | $r$ | $k$ |
| $l$ | $o$ | $p$ | $m$ |
|     |     | $q$ |     |

$A$  ad  $B$ , quasi eadem ratio est, quæ  $C$  ad  $D$ : &  $E$  ad  
 $F$ , quasi eadem, quæ  $G$  ad  $H$ .

Dico ex æquali, ex  $A$  ad  $B$ , &  $E$  ad  $F$  compositam,  
 quasi eandem esse, quæ ex  $C$  ad  $D$ , &  $G$  ad  $H$  compo-  
 sita.

*Prepar.*

Assumatur  $i$  ad  $k$ , quælibet ratio maior, quàm cui  
 propior potest esse, ex  $C$  ad  $D$ , &  $G$  ad  $H$  composita:  
 item assumatur quælibet  $l$  ad  $m$ , minor. Deinde fiant  
 $i$  ad  $n$ , &  $l$  ad  $o$ , sicut cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ :  
 item  $p$  ad  $k$ , &  $q$  ad  $m$ , sicut cui propior potest esse  $G$   
 ad  $H$ . Denique sumatur inter  $n, p$ , media quælibet quan-  
 titas  $r$ : & inter  $o, q$ , media quælibet  $s$ .

$P$

*De-*



Demonstr.

constr.

Quoniam  $i$  ad  $k$ , maior est, quàm cui propior potest esse, ex  $C$  ad  $D$ , &  $G$  ad  $H$  composita; & est  $i$  ad  $n$ , cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ , &  $p$  ad  $k$ , cui propior potest esse  $G$  ad  $H$ : ergo  $i$  ad  $k$ , maior est, quàm, quæ ex  $i$  ad  $n$ , & ex  $p$  ad  $k$ , composita. Ergo  $n$ , maior est, quàm  $p$ . Si enim  $n$ , esset æqualis ipsi  $p$ : ex  $i$  ad  $n$ , & ex æqualitate, & ex  $p$  ad  $k$ , cõposita ratio  $i$  ad  $k$ , esset eadem, quæ ex ea, cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ , ex æqualitate, & ex ea, cui propior potest esse  $G$  ad  $H$ , composita est; contra assumptum. Quod si  $n$ , esset minor, quàm  $p$ : ex  $i$  ad  $n$ , & minori inæqualitate, &  $p$  ad  $k$ , composita ratio  $i$  ad  $k$ , esset minor, quàm quæ ex ea, cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ , ex æqualitate, & ex ea, cui propior potest esse  $G$  ad  $H$ , composita est; contra idem assumptum.

constr.

Ergo  $n$ , maior est, quàm  $p$ : &  $r$ , minor, quàm  $n$ ; & maior quàm  $p$ : habetque  $i$  ad  $r$ , maiorem rationem, quàm  $i$  ad  $n$ ; idest maiorem, quàm, cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ : habet quoque  $r$  ad  $k$ , maiorem, quàm  $p$  ad  $k$ ; idest, maiorem, quàm, cui propior potest esse  $G$  ad  $H$ .

constr.

Similiter, quoniam  $l$  ad  $m$ , minor est, quàm, cui propior potest esse ex  $C$  ad  $D$ , &  $G$  ad  $H$  composita: & est  $l$  ad  $o$ , eadem, cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ : &  $q$  ad  $m$ , eadem, cui propior



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
| <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>H</i> |
| <i>i</i> | <i>n</i> | <i>r</i> | <i>p</i> |
| <i>t</i> | <i>o</i> | <i>s</i> | <i>q</i> |
|          |          |          | <i>m</i> |

4. b. | prior potest esse *G* ad *H*: ergo *l* ad *m*, minor  
est, quàm quæ est ex *l* ad *o*, & *q* ad *m* compo-  
sita. Ergo *o*, minor est, quàm *q*. demonstrari  
enim potest vt supra, quod si *o*, esset æqualis, vel  
p. b. | maior, quàm *q*: esset *l* ad *m* ratio non minor,  
4. b. | quàm cui propior potest esse, ex *C* ad *D*, & *G* ad  
*H* composita; contra assumptum.

constr. | Cum itaque *o*, sit minor, quàm *q*: erit *s*, ma-  
8. 5. | ior, quàm *o*; minor, quàm *q*: habetque *l* ad *s*,  
minorem rationem, quàm *l* ad *o*; idest, minorem,  
8. 5. | quàm, cui propior potest esse *C* ad *D*. habet quo-  
que *s* ad *m*, minorem rationem, quàm *q* ad *m*:  
idest, minorem, quàm, cui propior potest esse  
*G* ad *H*.

sup. | Itaque *i* ad *r*, maior est, quàm, cui propior  
hyp. | potest esse *C* ad *D*: & *l* ad *s*, minor. Sed *A* ad  
def. 4. b. | *B*, quasi eadem est, quæ *C* ad *D*: ergo *A* ad *B*,  
potest esse minor, quàm *i* ad *r*, & maior, quàm  
sup. | *l* ad *s*. Similiter *r* ad *k* maior est, quàm, cui pro-  
hypoth. | prior potest esse *G* ad *H*; & *s* ad *m*, minor: & est  
def. 4. b. | *E* ad *F*, quasi eadem, quæ *G* ad *H*: ergo *E* ad  
*F* potest esse minor, quàm *r* ad *k*; & maior,  
4. b. | quàm *s* ad *m*. Ergo ex æquali, potest ex *A* ad *B*,



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
| <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>H</i> |
| <i>i</i> | <i>n</i> | <i>r</i> | <i>p</i> |
| <i>l</i> | <i>o</i> | <i>s</i> | <i>q</i> |
|          |          |          | <i>m</i> |

& *E* ad *F* composita, minor esse, quàm, quæ  
 ex *i* ad *r*, & *r* ad *k*, componitur, *i* ad *k*; &  
 maior, quàm, quæ ex *l* ad *s*, & *s* ad *m*, compo-  
 nitur, *l* ad *m*. Est autem *i* ad *k*, sumpta quæ-  
 libet maior, quàm cui propior potest esse compo-  
 sita ex *C* ad *D*, & *G* ad *H*; & *l* ad *m*, minor.  
 Ergo composita ex *A* ad *B*, & *E* ad *F*, quasi  
 eadem est, quæ composita ex *C* ad *D*, & *G* ad *H*.  
 Quod &c.

Quare &c.

Theor. 22. Prop. 22.

**Q**uasi proportionales, permutando, sunt quasi pro-  
 portionales. *Hypoth.*

Sint quasi proportionales *A* ad *B*, vt *C* ad *D*.

Dico permutando, quasi proportionales esse *A* ad *C*,  
 vt *B* ad *D*. *Demonstr.*

*hypoth.* | Sunt enim quasi eadem rationes *A* ad *B*, & *B*  
*21. h.* | ad *C*; quæ *B* ad *C*, & *C* ad *D*: ergo ex æquali,  
*def. 5. h.* | *A* ad *C*, & *B* ad *D*, rationes compolite sunt qua-  
 si eadem: Ergo *A* ad *C*, & *B* ad *D*, sunt quasi  
 proportionales. Quod &c.

Quare &c.



*Theor. 23. Prop. 23.*

**R**ationes quasi eadem, componendo, sunt quasi eadem.

*Hypoth.*

$A$  ad  $B$ , quasi eadem esto, quæ  $C$  ad  $D$ .

Dico componendo  $A+B$  ad  $B$ , quasi eandem esse, quæ  $C+D$  ad  $D$ .

*Præpar.*

Assumatur  $e$  ad  $f$ , quælibet ratio maior, quàm cui propior potest esse  $C+D$  ad  $D$ : itē  $g$  ad  $h$ , quælibet maioris inæqualitatis, sed minor.

*Demonstr.*

*constr.* Quoniam  $e$  ad  $f$ , maior est, quàm, cui propior  
*p. h.* potest esse  $C+D$  ad  $D$ : diuidendo,  $e--f$  ad  $f$ ,  
 maior est, quàm cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ .  
*constr.* Item quoniam  $g$  ad  $h$ , minor est, quàm cui pro-  
*p. h.* prior potest esse  $C+D$  ad  $D$ : diuidendo  $g--h$  ad  
 $h$  minor est, quàm cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ .  
*hypoth.* Sed  $A$  ad  $B$ , quasi eadem est, quæ  $C$  ad  $D$ : er-  
*def. 4. h.* go  $A$  ad  $B$ , potest esse minor, quàm  $e--f$  ad  $f$ ; &  
*p. h.* maior, quàm  $g--h$  ad  $h$ . Ergo componendo  
 $A+B$  ad  $B$  potest esse minor, quàm  $e$  ad  $f$ ; &  
*def. 4. h.* maior, quàm  $g$  ad  $h$ . Ergo  $A+B$  ad  $B$ , quasi  
 eadem est, quæ  $C+D$  ad  $D$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor.*



*Theor. 24. Prop. 24.*

**R**ationes quasi eadem, diuidendo, sunt quasi eadem.

*Hypoth.*

Sint rationes quasi eadem  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ .

Dico diuidendo, quasi eadem esse rationes  $A---B$  ad  $B$ , &  $C---D$  ad  $D$ .

*Præpar.*

Assumatur  $e$  ad  $f$ , quælibet ratio maior, quàm cui propior potest esse  $C---D$  ad  $D$ : & assumatur  $g$  ad  $h$ , quælibet minor.

*Demonstr.*

*constr.* Quoniam  $e$  ad  $f$ , maior est, quàm, cui propior potest esse  $C---D$  ad  $D$ ; &  $g$  ad  $h$ , minor: ergo componendo  $e+f$  ad  $f$ , maior est, quàm cui propior potest esse  $C$  ad  $D$ ; &  $g+h$  ad  $h$ , minor.  
*hyp.* Sed  $A$  ad  $B$ , quasi eadem est, quæ  $C$  ad  $D$ : ergo  $A$  ad  $B$  potest minor esse, quàm  $e+f$  ad  $f$ ; & *def. 4. h.* maior, quàm  $g+h$  ad  $h$ . Ergo diuidendo  $A---B$  ad  $B$ , potest minor esse, quàm  $e$  ad  $f$ ; & maior, quàm  $g$  ad  $h$ . Ergo  $A---B$  ad  $B$ , quasi eadem est, quæ  $C---D$  ad  $D$ . Quod &c.  
*p. h.*  
*def. 4. h.*

Quare &c.

*Theor. 25. Prop. 25.*

**R**ationes quasi eadem, per conuersionem rationis, sunt quasi eadem.

*Hypoth.*



*Hypoth.*Sint rationes quasi eadem,  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ .Dico per conuersionem rationis, quasi easdem esse rationes  $A$  ad  $A - B$ , &  $C$  ad  $C - D$ .*Demonstr.*

- hyp.* |  $A; B$ : quasi  $C; D$ .  
 24. *b.* |  $A - B; B$ : quasi  $C - D; D$ .  
 20. *b.* |  $B; A - B$ : quasi  $D; C - D$ .  
 21. *b.* |  $A; A - B$ : quasi  $C; C - D$ . Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 26. Propos. 26.*

**S**I quocunque quantitates fuerint quasi proportionales, colligendo, quasi proportionales erunt, omnes antecedentes, ad omnes consequentes.

*Hypoth.* $A; B$ : quasi  $C; D$ :Dico  $A + C; B + D$ : quasi  $C; D$ .*Demonstr.*

- hypoth.* |  $A; B$ : quasi  $C; D$ .  
 22. *b.* |  $A; C$ : quasi  $B; D$ .  
 23. *b.* |  $A + C; C$ : quasi  $B + D; D$ .  
 22. *b.* |  $A + C; B + D$ : quasi  $C; D$ . Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 27. Pro. 27.*

**S**I prima ad secundam quasi proportionalis fuerit, sicut tertia ad quartam; & quinta ad secundam, quasi sicut sexta



sexta ad quartam: erit prima cum quinta ad secundam,  
quasi sicut tertia cum sexta ad quartam.

*Hypoth.*

$A; B: \text{quasi } C; D.$

$E; B: \text{quasi } F \text{ ad } D.$

Dico  $A + E; B: \text{quasi } C + F; D.$

*Prepar.*

*hypoth.*  $A; B: \text{quasi } C; D.$

22. *h.*  $A; C: \text{quasi } B; D.$

*hypoth.*  $E; B: \text{quasi } F; D.$

22. *h.*  $E; F: \text{quasi } B; D.$

19. *h.*  $A; C: \text{quasi } E; F.$

22. *h.*  $A; E: \text{quasi } C; F.$

23. *h.*  $A + E; E: \text{quasi } C + F; F.$

*hypoth.*  $E; B: \text{quasi } F; D.$

21. *h.*  $A + E; B: \text{quasi } C + F; D. \text{ Quod \&c.}$

Quare &c.

*Theor. 28. Prop. 28.*

**Q**uasi partes, cum quasi æquemultiplicibus, in quasi eadem sunt ratione, si prout sibi mutuò respondent, ita sumantur.

*Hypoth.*

$A; B: \text{quasi tripla.}$

$C; D: \text{quasi tripla.}$

Dico  $A; C: \text{quasi } B; D.$

De-



*Demonstr.*18. b. |  $A; B: \text{quasi } C; D.$ 22. b. |  $A; C: \text{quasi } B; D. \text{ Quod \&c.}$ 

Quare &amp;c.

*Theor. 29. Prop. 29.*

**S**I totam ad totam quasi proportionalis fuerit, ut ablatam ad ablatam: & reliqua ad reliquam, quasi proportionalis erit, ut tota ad totam.

*Hypoth.* $A; B: \text{quasi } C: D.$ Dico  $A---C; B---D: \text{quasi } A; B.$ *Demonstr.**hypoth.* |  $A; B: \text{quasi } C; D.$ 22. b. |  $A; C: \text{quasi } B; D.$ 25. b. |  $A; A---C: \text{quasi } B; B---D.$ 22. b. |  $A---C; B---D: \text{quasi } A; B. \text{ Quod \&c.}$ 

Quare &amp;c.

*Theor. 30. Prop. 30.*

**Q**uantitates quasi proportionales, & per homologiam, sunt quasi proportionales.

*Demonstr.*

Nam conuertendo, quasi proportionales fiunt, 20. h: & colligendo, 26; & 27. h: & æquemultiplicando, & æquepartiando, 28. h: & permutando, 22. h: & diuidendo, 24. h: & componendo, 23. h: & homologas ab ho-

Q

mologis



mologis auferendo, 29. *h.* & per conuersionem rationis, 25. *h.* & ex æquali, 21. *h.* & coniunctis omnifariam argumentis huiusmodi, quocunque ordine, per homologiam, quasi proportionales fiunt.

*Theor. 31. Prop. 31.*

**Q** Vasi æquales, ad quasi æquales, rationes habent, vel quasi infinitas vtrasque, vel quasi nullas, vel quasi easdem inter se.

*Hypoth. comm.*

*A, B sunt quasi æquales.*

*C, D sunt quasi æquales.*

*Hypoth. p. casus.*

*A; C: est quasi infinita.*

*Dico B; D: esse quasi infinitam.*

*Præpar.*

Assumatur *e* ad *f*, quaelibet ratio: vnde fit componendo *e+f* ad *f*: deinde per conuersionem rationis *e+f* ad *e*: & conuertendo *e* ad *e+f*.

*Demonstr.*

*def. 3. b.* | *B; A:* potest maior esse, quàm *e; e+f*.

*def. p. b.* | *A; C:* potest maior esse, quàm *e+f; f*.

*4. b.* | *B; C:* potest maior esse, quàm *e; f*.

*def. p. b.* | *B; C:* ratio est quasi infinita.

*def. p. b.* | *B; C:* potest maior esse, quàm *e+f; f*.

*def. 3. b.* | *C; D:* potest maior esse, quàm *e; e+f*.

*4. b.* | *B; D:* potest maior esse, quàm *e; f*.

*B; D:*



def. p. h. |  $B; D$  : ratio est quasi infinita. Quod &c.

*Hypoth. 2. casus.*

$A; C$  : est quasi nulla.

Dico  $B; D$  : esse quasi nullam.

*Demonstr.*

10. h. |  $C; A$  : quasi infinita.

sup. |  $D; B$  : quasi infinita.

7. h. |  $B; D$  : quasi nulla. Quod &c.

*Hypoth. 3. casus.*

$A; C$  : neq; quasi infinita, neq; quasi nulla est.

Dico  $B; D$  : quasi esse  $A; C$ .

*Demonstr.*

$B$  ad  $D$ , neque est quasi infinita, neque quasi nulla:

sup. | alioquin  $A$  ad  $C$  esset quasi infinita, vel quasi nulla, contra hypothesim.

19. h. |  $A; B$  : quali  $C; D$ .

22. h. |  $A; C$  : quasi  $B; D$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theorema 32. Prop. 32.*

**S**I prima ad secundam, rationem habuerit quasi infinitam; item ad tertiam, rationem quasi infinitam : habebit & ad vtriusque summam, & ad vtriusque differentiam, rationem quasi infinitam.

*Hypoth.*

$A; B$  : quasi infinita.

$A; C$  : quasi infinita.

Q 2

Dico



Dico  $A; B + C$ : quasi infinitam esse.

Et  $A; B - C$ : quasi infinitam esse.

*Demonstr.*

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <i>hypoth.</i> | $A; B$ : quasi infinita.              |
| 8. <i>b.</i>   | $A + B; B$ : quasi infinita.          |
| 9. <i>b.</i>   | $A + B; A$ : quasi æqualis.           |
| <i>hypoth.</i> | $A; C$ : quasi infinita.              |
| 31. <i>b.</i>  | $A + B; C$ : quasi infinita.          |
| 8. <i>b.</i>   | $A + B + C; C$ : quasi infinita.      |
| 9. <i>b.</i>   | $A + B + C; A + B$ : quasi æqualis.   |
| <i>sup.</i>    | $A + B; A$ : quasi æqualis.           |
| 18. <i>b.</i>  | $A + B + C; A$ : quasi æqualis.       |
| 16. <i>b.</i>  | $B + C; A$ : quasi nulla.             |
| 10. <i>b.</i>  | $A; B + C$ : quasi infinita. Quod &c. |
| <i>sup.</i>    | $A + B; C$ : quasi infinita.          |
| 8. <i>b.</i>   | $A + B - C; C$ : quasi infinita.      |
| 7. <i>b.</i>   | $C; A + B - C$ : quasi nulla.         |
| 11. <i>b.</i>  | $A + B; A + B - C$ : quasi æqualis.   |
| <i>sup.</i>    | $A; A + B$ : quasi æqualis.           |
| 18. <i>b.</i>  | $A + B - C; A$ : quasi æqualis.       |
| 17. <i>b.</i>  | $A + B - C; B - C$ : quasi infinita.  |
| 8. <i>b.</i>   | $A; B - C$ : quasi infinita. Quod &c. |
|                | Quare &c.                             |

*Theor. 33. Propos. 33.*

**S**I fuerint tres termini, primus indeterminatus, reliqui  
duo determinati; fuerit autem primus ad secundum  
quali



quasi æqualis: habebit secundus ad tertium eandem rationem, quàm quasi habet primus.

*Hypoth.*

Tres termini sunt, primus indeterminatus  $A$ ; reliqui duo determinati,  $b$ , &  $c$ : & est  $A$  ad  $b$ , quasi æqualis.

Dico  $b$  ad  $c$  eandem esse rationem, quàm quasi habet  $A$  ad  $c$ .

*Præpar.*

Assumatur  $d$ , æqualis ipsi  $c$ .

*Demonst.*

*hypoth.* |  $A$ ;  $b$ : quasi æqualis.

*constr.* |  $c$ ;  $d$ : æqualis.

*def. 4. b.* |  $A$ ;  $b$ : quasi  $c$ ;  $d$ .

*22. b.* |  $A$ ;  $c$ : quasi  $b$ ;  $d$ .

*8. 5.* |  $b$ ;  $d$ :  $b$ ;  $c$ .

*19. b.* |  $A$ ;  $c$ : quasi  $b$ ;  $c$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 34. Prop. 34.*

**T**ota ad unitatem, quasi est infinita.

*Demonstr.*

Nam tota, cum non dicatur, cuius numeri tota sit; est indeterminata: ideoque totæ ad unitatem, ratio est indeterminata. Cumque possit dici, cuius numeri tota sit; est determinabilis: ideoque totæ ad unitatem, ratio est determinabilis. Cum denique possit dici eius numeri tota, qui maior sit, quàm ut ad unitatem, habeat quamlibet rationem



nem datam; qui numerus, ipsa sui ipsius est tota:  
 def. p. b. | erit ratio totæ ad vnitatem, maior, quàm data  
 quælibet. Ergo tota ad vnitatem, quasi est in-  
 finita.

*Theor. 35. Prop. 35.*

**S**esquitota ad vnitatem, quasi est infinita. Item semi-  
 tota.

*Demonstr.*

34. b. | Tota ad vnitatem, quasi est infinita: ergo com-  
 8. b. | ponendo, sesquitota ad vnitatem, quasi est infi-  
 8. b. | nita. Item diuidendo, semitota ad vnitatem, qua-  
 si est infinita.

*Theor. 36. Prop. 36.*

**T**ota, sesquitota, & semitota, quasi sunt æquales  
 inter se.

*Demonstr.*

35. b. | Sesquitota ad vnitatem, quasi est infinita: ergo  
 9. b. | per conuersionem rationis, sesquitota ad totam,  
 34. b. | quasi est æqualis. Rursum tota ad vnitatem quasi  
 9. b. | sit infinita: ergo per conuersionem rationis, tota  
 18. b. | ad semitoram, quasi est æqualis. Ergo sesquito-  
 ta ad semitoram, quasi est æqualis.

*Theor. 37. Prop. 37.*

**T**ota quantumlibet ordinata ad vnitatem, quasi est  
 infinita. Item sesquitota, & semitota.

Dico



# TERTIVM.

127

Dico  $t_3 ; u$  : quasi infinitum.

*Demonstr.*

34. b. |  $t ; u$  : quasi infinita.

def. 6. p. |  $t_3 ; u$  : triplicata  $t ; u$ .

12. b. |  $t_3 ; u$  : quasi infinita. Quod &c.

ex 35. b. | Similiter ostendetur  $q_3 ; u$  : quasi infinita.

Item  $m_3 ; u$  : quasi infinita.

Quare &c.

*Theor. 38. Prop. 38.*

**T**otarum inæqualiter ordinarum, magis ordinata, ad minùs ordinatam, quasi est infinita. Item sesquiotarum, & semiotarum.

*Hypoth.*

$t_5$  magis est ordinata, quàm  $t_3$ .

Dico  $t_5 ; t_3$  : quasi infinitam.

*Demonstr.*

34. b. |  $t ; u$  : quasi infinita.

def. 6. p. |  $t_5 ; t_4 : t ; u$ .

def. 6. p. |  $t_4 ; t_3 : t ; u$ .

13. 5. |  $t_5 ; t_4$  : quasi infinita.

13. 5. |  $t_4 ; t_3$  : quasi infinita.

12. b. |  $t_5 ; t_3$  : quasi infinita. Quod &c.

Similiter ostendetur  $q_5 ; q_3$  : quasi infinita.

Et  $m_5 ; m_3$  : quasi infinita.

Quare &c.

*Theor.*



*Theor. 39. Prop. 39.*

**Æ** Que ordinata, tota, semitota, & sesquitota, sunt quasi æquales.

Dico  $t_3$ ,  $q_3$ ,  $m_3$ , quasi æquales esse.

*Demonstr.*

36. h. |  $t$ ;  $q$ : quasi æqualis.

3. p. |  $t_3$ ;  $q_3$ : triplicata  $t$ ;  $q$ .

21. h. |  $t_3$ ;  $q_3$ : quasi æqualis. Quod &c.

sup. |  $q_3$ ;  $m_3$ : quasi æqualis. Quod &c.

18. h. |  $t_3$ ;  $m_3$ : quasi æqualis. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 40. Prop. 40.*

**T**ota magis ordinata, ad aggregatum ex totis minùs ordinatis, quasi est infinita. Item semitota, ad aggregatum ex semitotis: & sesquitota, ad aggregatum ex sesquitotis.

*Hypoth.*

Esto tota magis ordinata  $t_3$ : qua minùs ordinata  $t_2$ ,  $t$ , & rationalis  $u$ : quarum aggregatum  $5t_2 + 3t + 4u$ .

Dico  $t_3$ ;  $5t_2 + 3t + 4u$ : quasi esse infinitam.

*Demonstr.*

38. h. |  $t_3$ ;  $t_2$ : quasi infinita.

32. h. |  $t_3$ ;  $5t_2$ : quasi infinita.

38. h. |  $t_3$ ;  $t$ : quasi infinita.

32. h. |  $t_3$ ;  $3t$ : quasi infinita.

 $t_3$ ;



37. b. |  $t^3; u$ : quasi infinita.

32. b. |  $t^3; 4u$ : quasi infinita.

32. b. |  $t^3; 5t^2 + 3t + 4u$ : quasi infinita. Quod &c.

Similiter ostendetur,  $m^3; 5m^2 + 3m + 4u$ : quasi infinita. Quod &c.

Item,  $q^3; 5q^2 + 3q + 4u$ : quasi infinita. Quod &c.  
Quare &c.

*Theor. 41. Prop. 41.*

**T**ota magis ordinata, sibi ipsi, & alijs minùs ordinatis, addit s, vel subtractis, quasi est æqualis. Item semitota: & sesquitota.

*Hypoth.*

Tota vel semitota, vel sesquitota magis ordinata esto  $A$ : quacum additæ minùs ordinatæ, sunt  $B$ : & subtractæ  $C$ .

Dico  $A, A+B, A-C, A+B-C$ , quasi æquales esse.

*Demonstr.*

40. b. |  $A; B$ : quasi infinita.

8. b. |  $A+B; B$ : quasi infinita.

9. b. |  $A+B; A$ : quasi æqualis. Quod &c.

40. b. |  $A; C$ : quasi infinita.

9. b. |  $A; A-C$ : quasi æqualis. Quod &c.

32. b. |  $A; B-C$ : quasi infinita.

8. b. |  $A+B-C; B-C$ : quasi infinita.

9. b. |  $A+B-C; A$ : quasi æqualis. Quod &c.

R

$A+B$



18. h. |  $A + B --- C$ ,  $A + B$ ,  $A --- C$ , quasi sunt æquales.  
 | Quod &c.  
 Quare &c.

---

*Theor. 42. Prop. 42.*

**Q** Vælibet quadratrix quasi est æqualis ad totam vnitate plus ordinatam, quàm sit eius basis. item ad semitotam: & ad sesquitotam.

*Hypoth.*

Esto quadratrix  $A$ : & esto tota  $B$ , vnitate plus ordinata, quàm basis quadratricis  $A$ .

Dico  $A$  ad  $B$ , quasi æqualem esse.

*Demonstr.*

22. 2. |  $A$ , est æqualis ipsi  $B$ , demptis, additisque aliqu-  
 hypoth. | qualiter acceptis totis, non plus ordinatis, quàm  
 | basis  $A$ . Sed  $B$ , est tota vnitate plus ordinata,  
 | quàm basis  $A$ : ideòque totæ, non plus ordinatæ,  
 | quàm basis  $A$ , sunt minùs ordinatæ, quàm  $B$ .  
 | Ergo  $A$ ; est æqualis ipsi  $B$ , demptis, additisque  
 | aliququaliter acceptis totis, minùs ordinatis, quàm  
 41. h. |  $B$ . Sed &  $B$ , demptis, additisque aliququaliter ac-  
 | ceptis totis, minùs ordinatis, quàm  $B$ , quasi est  
 18. h. | æqualis ipsi  $B$ . Ergo  $A$ , quasi est æqualis ipsi  $B$ .  
 | Quod &c.

31. 2. | Idem, & eodem modo demonstraretur, si  $B$   
 32. 2. | esset semitota: necnò si  $B$  esset sesquitota. Quæ &c.  
 Quare &c.

---



*Theor. 43. Prop. 43.*

**Q**uælibet quadratrix, ad totas non plus ordinatas, quàm sit eius basis, quomodolibet acceptas, quasi est infinita. item ad semitotas: necnon ad sesquitotas.

*Hypoth.*

Esto quadratrix *A*: & in *B* sint sumptæ totæ quomodolibet, vel semitotæ, vel sesquitotæ.

Dico *A* ad *B* quasi infinitam esse.

*Præpar.*

Sumatur *C*, tota, vnitæ plus ordinata, quàm basis quadratricis *A*: vel semitota, vel sesquitota.

*Demonstr.*

41. *b.* | *C*; *B*: quasi infinita.  
 42. *b.* | *A*; *C*: quasi æqualis.  
 31. *b.* | *A*; *D*: quasi infinita. Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 44. Prop. 44.*

**R**ationis quasi infinitæ diuiso antecedente per datum numerum, ratio est quasi infinita.

*Hypoth.*

*A* ad *B*, quasi est infinita.

Dico subtriplem *A* ad *B*, quasi infinitam esse.

*Præpar.*

Assumatur quælibet ratio *c* ad *d*.

R 2

De-



*Demonstr.*

*hypoth.* |  $A; B$ : quasi infinita.  
*def. p. h.* |  $A; B$ : potest maior esse, quàm  $3c; d$ .  
*p. h.* |  $A; 3c$ : potest maior esse, quàm  $B; d$ .  
 15. 5. |  $A; 3c$ : subtripla  $A; c$ .  
 13. 5. | Subtripla  $A; c$ : potest maior esse, quàm  $B; d$ .  
*p. h.* | Subtripla  $A; B$ : potest maior esse, quàm  $c; d$ .  
*def. p. h.* | Subtripla  $A; B$ : quasi est infinita. Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 45. Prop. 45.*

**R**ationis quasi infinitæ multiplicato consequente,  
ratio est quasi infinita.

*Hypoth.*

$A$  ad  $B$ , quasi est infinita.

Dico  $A$  ad duplam  $B$ , quasi esse infinitam.

*Prepar.*

Assumatur quælibet ratio  $c$  ad  $d$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $A; B$ : quasi infinita.  
*def. p. h.* |  $A; B$ : potest maior esse, quàm  $2c; d$ .  
*p. h.* |  $A; 2c$ : potest maior esse, quàm  $B; d$ .  
 15. 5. |  $B; d$ :  $2B; 2d$ .  
 13. 5. |  $A; 2c$ : potest maior esse, quàm  $2B; 2d$ .  
*p. h.* |  $A; 2B$ : potest maior esse, quàm  $2c; 2d$ :  
 15. 5. |  $2c; 2d$ :  $c; d$ .  
 13. 5. |  $A; 2B$ : potest maior esse, quàm  $c; d$ .  
 $A; 2B$ :



*def.p.h.* |  $A$ ;  $2B$ : quasi est infinita. Quod &c.

Quare &c.

*Theorema 46. Prop. 46.*

**R**atio composita ex duabus rationibus, altera, quasi quadam proposita, altera, quasi infinita; quasi est infinita.

*Hypoth.*

$A$ ;  $B$ : quasi quadam proposita.

$B$ ;  $C$ : quasi infinita.

Dico  $A$ ;  $C$ : quasi esse infinitam.

*Præpar.*

Assumatur quælibet ratio,  $d$  ad  $e$ : item assumatur quælibet  $d$  ad  $f$ , minor, quàm, cui quasi eadem esse dicitur  $A$  ad  $B$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $B$ ;  $C$ : quasi est infinita.

*def.p.h.* |  $B$ ;  $C$ : potest maior esse, quàm  $f$ ;  $e$ .

*def.3.h.* |  $A$ ;  $B$ : potest maior esse, quàm  $d$ ;  $f$ .

*4. h.* |  $A$ ;  $C$ : potest maior esse, quàm  $d$ ;  $e$ .

*def.p.h.* |  $A$ ;  $C$ : quasi est infinita. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 47. Prop. 47.*

**Q**uadratrices in eadem basi iacentes, inter se sunt quasi æquales.

*Hy-*



*Hypoth.*Sint in eadem basi quadratrices  $A, B$ .Dico  $A, B$ , quasi æquales esse.*Præpar.*Sumatur  $C$ , tota, vnitata plus ordinata, quàm sit basis ipsarum  $A, B$ .*Demonstr.*43. b. |  $A; C$ : quasi æqualis.43. b. |  $B; C$ : quasi æqualis.18. b. |  $A; C$ : quasi æqualis. Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 48. Propos. 48.***S**ub quadratrices in eadem basi iacentes, sunt quasi æquales.*Hypoth.*Sint in eadem basi subquadratrices  $A, B$ .Dico  $A, B$ , quasi æquales esse.*Præpar.*Sumantur homonymæ quadratrices  $C, D$ .*Demonstr.*def. 13. 2 |  $C$  ad  $A$ , æquemultiplex est, vt  $D$  ad  $B$ .15. 5. |  $C; A: D; B$ .16. 5. |  $C; D: A; B$ .47. b. |  $C; D$ : quasi æqualis.19. b. |  $A; B$ : quasi æqualis. Quod &c.

Quare &amp;c.



*Theor. 49. Prop. 49.*

**I**N diuersis basibus, quadratrix in magis ordinata, ad quadratricem in minùs ordinata, quasi est infinita.

*Hypoth.*

Sint quadratrices  $A, B$ , in diuersis basibus:  $A$ , in magis ordinata basi, quàm  $B$ .

Dico  $A$  ad  $B$ , quasi esse infinitam.

*Præpar.*

Assumatur tota  $C$ , vnitate plus ordinata, quàm sit basis quadratricis  $A$ : & tota  $D$ , vnitate plus ordinata, quàm sit basis quadratricis  $B$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* | Quoniam  $A$  est in basi magis ordinata, quàm  
 38. *b.* |  $B$ : ergo etiam  $C$  est magis ordinata tota, quàm  
 42. *b.* |  $D$ : ergo  $C$  ad  $D$ , quasi est infinita. Sed  $C, A$ ,  
 31. *b.* | sunt quasi æquales: &  $D, B$ , quasi æquales. Er-  
 | go  $A$  ad  $B$ , quasi est infinita. Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 50. Prop. 50.*

**I**N diuersis basibus, quælibet massa in magis ordinata, ad quamlibet massam, in minùs ordinata, quasi est infinita.

*Hypoth.*

Sint massæ  $A, B$ , in diuersis basibus:  $A$  in magis ordinata basi, quàm  $B$ .

Dico  $A$  ad  $B$ , quasi esse infinitam.

*Præ-*



*Præpar.*

Assumantur quadratrices  $C, D$ :  $C$  quidem homonyma ipsi  $A$ ; &  $D$ , ipsi  $B$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* Quoniam  $A$ , est in basi magis ordinata, quàm  $B$ : etiam  $C$ , est in basi magis ordinata, quàm  $D$ : &  $C$  ad  $D$ , quasi est infinita. Est autem ratio  $A$  ad  $C$ , quædam proposita, quàm habent propositi numeri multiplicantes homonymam speciem: ergo ex æquali,  $A$  ad  $D$ , ratio est quasi infinita. Item  $D$  ad  $B$ , ratio est quædam proposita, quàm habent propositi numeri multiplicantes homonymam speciem: ergo ex æquali,  $A$  ad  $B$ , ratio est quasi infinita. Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. § 1. Prop. § 1.*

**S**pecies in eadem basi iacentes, sunt reciproce quasi proportionales, ut numeri, in tabula multiplicium, similiter iacentes.

*Hypoth.*

Sint in eadem basi species  $A, B$ : & sint numeri similiter iacentes, in tabula multiplicium; & similiter, atque  $A$ ; &  $d$ , similiter, atque  $B$ .

Dico  $A$ ;  $B$ : quasi  $d$ ;  $c$ .*Præpar.*

Sumantur subquadratrices  $E, F$ :  $E$  quidem homonyma ipsi  $A$ ; &  $F$ , ipsi  $B$ .

*De-*



*Demonstr.*

deff. 11. |  
 p. & 2. |  $A; E: u; c.$   
 48. b. |  $E; F: \text{quasi } \text{æqualis}.$   
 deff. 11. |  $F; B: d; u.$   
 p. & 2. |  
 21. b. |  $A; B: \text{quasi } d; c. \text{ Quod \&c. Quare \&c.}$

---

*Theor. 52. Prop. 52.*

**M**assæ in eadem basi iacentes, quasi eamdem habent rationem compositam, ex directa suorum numerorum, & reciproca numerorum in tabula multiplicium similiter iacentiam.

*Hypoth.*

Sint in eadem basi, massæ  $A, B$ : quarum numeri  $c, d$ :  $c$  quidem, qui multiplicans homonymam speciem  $A$ , facit massam  $A$ ; &  $d$ , qui multiplicans homonymam speciem  $B$ , facit massam  $B$ . Et sint numeri  $e, f$ , similiter iacentes in tabula multiplicium;  $e$  quidem, sicut  $A$ ; &  $f$ , sicut  $B$ .

Dico  $A; B: \text{quasi } c; d, + f; e.$

*Præpar.*

Sumantur species homonymæ  $G, H$ :  $G$  quidem ipsi  $A$ ; &  $H$ , ipsi  $B$ .

*Demonstr.*

hypoth. |  $A; G: c; u.$   
 51. b. |  $G; H: \text{quasi } f; e.$   
 hypoth. |  $H; B: u; d.$   
 21. b. |  $A; B: \text{quasi } c; d, + f; e. \text{ Quod \&c. Quare \&c.}$

---



*Problema primum Prop. 53.*

**D**ata ratione; datoque numero pariter pari: sub-  
tuplicatam rationem inuenire, quotus est datus nu-  
merus.

*Hypoth.*

Sit data ratio  $a$  ad  $b$ : datusque numerus  $c$ , pariter  
par.

Oportet rationem inuenire, subtotuplicatam rationis,  
 $a$  ad  $b$ , quotus est  $c$ .

*Constr.*

Subdiuidatur numerus  $c$ , vsque ad vnitatem: & sit  $c$  ad  
 $d$ , duplus: &  $d$  ad  $f$ , duplus: &  $f$  ad vnitatem, duplus.  
Deinde sumatur, inter  $a$ ,  $b$ , media proportionalis  $g$ : &  
inter  $a$ ,  $g$ , media proportionalis  $h$ : & inter  $a$ ,  $h$ , media  
proportionalis  $i$ : vt fiant sumptiones totidem, quot  
sunt, numeri  $c$  diuisiones bifariam, vsque ad vnitatem.

Dico  $a$ ;  $i$ : subtotuplicatam  $a$ ;  $b$ , quotus est  $c$ .

*Demonstr.*

*constr.* |  $a$ ;  $b$ : duplicata  $a$ ;  $g$ , sicut  $c$ ;  $d$ : duplus.

*constr.* |  $a$ ;  $g$ : duplicata  $a$ ;  $h$ , sicut  $d$ ;  $f$ : duplus.

*constr.* |  $a$ ;  $h$ : duplicata  $a$ ;  $i$ , sicut  $f$ ;  $u$ : duplus.

*p. p.* |  $a$ ;  $b$ : multiplicata  $a$ ;  $i$ , sicut  $c$ ;  $u$ : multiplus.

|  $a$ ;  $i$ : subtotuplicata  $a$ ;  $b$ , quotus est  $c$ . Quod erat  
| faciendum.

Quare data ratione, datoque numero | pariter pari,  
subtotuplicatam rationem inuenimus, quotus est datus  
numerus.

---



*Probl. 2. Prop. 54.*

**D**ata ratione inæqualitatis; & proposito numero ordinis potestatum: numerum inuenire, pro quo sesquitota, & semitota æque ordinatæ, sunt ad inuicem propiores æqualitati.

*Hypoth.*

Sit data ratio inæqualitatis  $a$ , ad  $b$ : & sit  $a$ , maior, quàm  $b$ : sitque datus numerus quinaris.

Oportet numerum inuenire, quo quo sesquitota quinta, ad semitotam quintam, minor est, quàm ut  $a$  ad  $b$ : & semitota quinta, ad sesquitotam quintam, maior, quàm ut  $b$  ad  $a$ .

*Constr.*

Sumatur numerus pariter par, nō minor, quàm datus quinaris: & sit sumptus octonarius: & sub-octuplicata ratio inueniatur, rationis  $a$  ad  $b$ ; quæ sit  $a$  ad  $c$ : & sumatur numerus  $d$ , maior ad binarium, quàm ut  $a$  ad  $a$  ---  $c$ : qui, dempto binario, relinquatur  $e$ : & inter  $d$ ,  $e$ , sumatur numerus  $f$ : pro quo, ut radice tota; semitota est  $e$ ; sesquitota  $d$ .

Dico  $d$ 5;  $e$ 5: minorem esse, quàm  $a$ ;  $b$ .

Et  $e$ 5;  $d$ 5: maiorem, quàm  $b$ ;  $a$ .

*Demonstr.*

*constr.* |  $d$ ; 2: maior, quàm  $a$ ;  $a$  ---  $c$ .

3. *b.* |  $d$ ;  $e$ : minor, quàm  $a$ ;  $c$ .

4. *b.* |  $d$ 5;  $e$ 5: minor, quàm  $a$ 5;  $c$ 5.

S 2

45;



5. b. |  $a5; c5$ : minor, quàm  $a8; c8$ .  
 constr. |  $a8; c8$ :  $a; b$ .  
 13. 5. |  $d5; e5$ : minor, quàm  $a; b$ . Quod &c.  
 2. b. |  $e5; d5$ : maior, quàm  $b; a$ . Quod &c.  
 Quare &c.

---

Probl. 3. Prop. 55.

**D**ata ratione; & propositis ordinibus potestatum inæqualibus: numerum inuenire, pro quo, plus ordinata potestas, ad minùs ordinatam, maior est, quàm in data ratione.

*Hypoth.*

Sit data ratio,  $a$  ad  $b$ : sint propositi ordines potestatum inæquales, quinaris, & binarius.

Oportet numerum inuenire, pro quo, potestas quinta ad secundam, maior est, quàm vt  $a$  ad  $b$ .

*Constr.*

Sumatur numerus  $c$ , in serie tertiarum potestatum ab omnibus numeris, maior ad vnitatem, quàm vt  $a$  ad  $b$ : numeri autem  $c$ , fit radix  $d$ .

Dico, pro  $d$  radice,  $d5; d2$ : maiorem esse, quàm  $a; b$ .

*Demonstr.*

constr. |  $c: d3$ .  
 8. 5. & |  $c; u: d3; u: d5; d2$ .  
 def. 6. p. |  $c; u$ : maior, quàm  $a; b$ .  
 constr. |  $c; u$ : maior, quàm  $a; b$ .  
 13. 5. |  $d5; d2$ : maior, quàm  $a; b$ . Quod &c.  
 Quare &c.

---



Probl. 4. Prop. 56.

**D**ata ratione; propositisque ordinibus potestatum inæqualibus: numerum inuenire, pro quo, semitota plus ordinata, ad sesquiotam minùs ordinatam, maior est, quàm in data ratione.

*Hypoth.*

Sit data ratio  $a$  ad  $b$ : sintque propositi ordines potestatum, quinaris, atque ternarius.

Oportet numerum inuenire, pro quo, semitota quinta ad sesquiotam tertiam, maior est, quàm vt  $a$  ad  $b$ .

*Constr.*

Inueniatur per 5 5. *h.* numerus  $c$ , pro quo, semitota  $d$ : & semitota quinta  $d_5$ , ad semitotam tertiam  $d_3$ , maior est, quàm vt  $a+b$  ad  $b$ . Inueniatur deinde per 5 4. *h.* numerus  $e$ , non minor, quàm  $c$ ; pro quo, semitota  $m$ , & sesquiotota  $q$ ; &  $m_3$  ad  $q_3$ , maior est, quàm vt  $a$  ad  $a+b$ .

Dico, pro numero  $e$  radice,  $m_5$ ;  $q_3$ : maiorem esse, quàm  $a$ ;  $b$ .

*Demonstr.*

*constr.* |  $e$ : non minor, quàm  $c$ .

*def. 18. 2* |  $m$ : non minor, quàm  $d$ .

5. *h.* |  $m_5$ ;  $d_5$ : non minor, quàm  $m_3$ ;  $d_3$ .

p. *b.* |  $m_5$ ;  $m_3$ : non minor, quàm  $d_5$ ;  $d_3$ .

*constr.* |  $d_5$ ;  $d_3$ : maior, quàm  $a+b$ ;  $b$ .

13. 5. |  $m_5$ ;  $m_3$ : maior, quàm  $a+b$ ;  $b$ .

*constr.* |  $m_3$ ;  $q_3$ : maior, quàm  $a$ ,  $a+b$ .

4. *b.* |  $m_5$ ;  $q_3$ : maior, quàm  $a$ ;  $b$ . Quod &c. A

Quare &c.



*Probl. 7. Prop. 59.*

**D**ata ratione; & propositis duabus non in eadem basi iacentibus quadratricibus: numerum inuenire, pro quo, quadratrix, quæ iacet in plus ordinata basi, ad alteram, maior est, quàm in data ratione.

*Hypoth.*

Sit data ratio  $a$  ad  $b$ : & propositæ sint quadratrices duæ  $c$ ,  $d$ ;  $c$ , in quinta basi;  $d$ , in secunda.

Oportet numerum inuenire, pro quo,  $c$  ad  $d$ , maior est, quàm ut  $a$  ad  $b$ .

*Constr.*

56. b. | Inueniatur numerus  $e$ , pro quo, semitota  $f$ ,  
| sesquitota  $g$ : &  $f6$  ad  $g3$ , maior sit, quàm ut  
|  $a$  ad  $b$ .

Dico, pro  $e$  radice,  $c$ ;  $d$ : maiorem esse, quàm  $a$ ;  $b$ .

*Demonstr.*

30. 2. |  $c$ , maior est, quàm  $f6$ .

30. 2. |  $d$ , minor est, quàm  $g3$ .

8. 5. |  $c$ ;  $d$ : maior est, quàm  $f6$ ;  $g3$ . Quod &c.

Quare &c.

---

*Probl. 8. Prop. 60.*

**D**ata ratione; & propositis duabus non in eadem basi iacentibus massis: numerum inuenire, pro quo, massa, quæ iacet in plus ordinata basi, ad alteram, maior est, quàm in data ratione.

*Hy-*



*Hypoth.*

Sit data ratio  $a$  ad  $b$ : sintque duæ massæ  $c$ ,  $d$ ; quidem, in quinta basi;  $d$ , in tertia.

Oportet numerum inuenire, pro quo,  $c$  ad  $d$ , maior est, quàm vt  $a$  ad  $b$ .

*Constr.*

59. *h.* | Fiat, vt massa  $c$  ad sibi synonymam quadratricem  $e$ , sic  $a$  ad  $f$ : & vt synonyma ipsi  $d$  quadratrix  $g$ , ad ipsam  $d$ , sic fiat  $h$  ad  $b$ : & inueniatur numerus  $i$ , pro quo, quadratrix  $e$ , ad quadratricem  $g$ , maior est, quàm vt  $f$  ad  $h$ .

Dico pro  $i$  radice, massam  $c$  ad massam  $d$ , maiorem esse, quàm vt  $a$  ad  $b$ .

*Demonstr.*

*constr.* |  $c$ ;  $e$ :  $a$ ;  $f$ .

*constr.* |  $e$ ;  $g$ : maior, quàm  $f$ ;  $h$ .

*constr.* |  $g$ ;  $d$ :  $h$ ;  $b$ .

4. *h.* |  $c$ ;  $d$ : maior, quàm  $a$ ;  $b$ . Quod &c.

Quare &c.

*Probl. 9. Prop. 61.*

**P**ropositis in eadem basi iacentibus duabus massis; & datis duabus rationibus, non iisdem, quàm quasi habent ad inuicem massæ, sed maiore vna, minore altera: numerum inuenire, pro quo, massæ propositiæ rationem habent minorem, quàm data maior, & maiorem, quàm data minor.

T

*Hy-*



*Hypoth.*

Sint massę  $a, d$ : & sit ratio  $i$  ad  $s$ , quàm quasi habet  $a$  ad  $d$ : & sit  $e$  ad  $h$ , maior, quàm  $i$  ad  $s$ ; &  $n$  ad  $r$ , minor.

Oportet numerum inuenire, pro quo,  $a$  ad  $d$ , est minor, quàm  $e$  ad  $h$ ; & maior, quàm  $n$  ad  $r$ .

*Constr.*

Sumatur ipsi  $a$ , synonyma quadratrix  $b$ ; & ipsi  $d$  synonyma  $c$ . Fiat deinde.

$a$ ;  $b$ :  $e$ ;  $f$ :  $i$ ;  $k$ ;  $n$ ;  $o$ .

$c$ ;  $d$ :  $g$ ;  $h$ :  $l$ ;  $s$ :  $p$ ;  $r$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $a$ ;  $d$ : quasi  $i$ ;  $s$ .

*def. 17.5* |  $a$ ;  $b$ ,  $+b$ ;  $c$ ,  $+c$ ;  $d$ : quasi  $i$ ;  $k$ ,  $+k$ ;  $l$ ,  $+l$ ;  $s$ .

*constr.* |  $a$ ;  $b$ :  $i$ ;  $k$ .

*constr.* |  $c$ ;  $d$ :  $l$ ;  $s$ .

$b$ ;  $c$ : quasi  $k$ ;  $l$ .

27. *h.* |  $b$ ;  $c$ : quasi æqualitas.

$k$ ;  $l$ : æqualitas.

*hypoth.* |  $e$ ;  $h$ : maior, quàm  $i$ ;  $s$ .

*def. 17.5* |  $e$ ;  $f$ ,  $+f$ ;  $g$ ,  $+g$ ;  $h$ : maior, quàm  $i$ ;  $k$ ,  $+k$ ;  $l$ ,  $+l$ ;  $s$ .

*constr.* |  $e$ ;  $f$ :  $i$ ;  $k$ .

*constr.* |  $g$ ;  $h$ :  $l$ ;  $s$ .

$f$ ;  $g$ : maior, quàm  $k$ ;  $l$ .

$f$ : maior, quàm  $g$ .

*hypoth.* |  $n$ ;  $r$ : minor, quàm  $i$ ;  $s$ .

*def. 17.5* |  $n$ ;  $o$ ,  $+o$ ;  $p$ ,  $+p$ ;  $r$ : minor, quàm  $i$ ;  $k$ ,  $+k$ ;  $l$ ,  $+l$ ;  $s$ .

*constr.* |  $n$ ;  $o$ :  $i$ ;  $k$ .

$p$ ;  $r$ :



*constr.* |  $p; r: l; s.$   
 |  $o; p:$  minor, quàm  $k; l.$   
 |  $o:$  minor, quàm  $p.$

*Constr.*

58. *h.* | Assumatur alterutra  $f$  ad  $g$ , vel  $p$  ad  $o$ , mi-  
 | nor: & sit assumpta  $f$  ad  $g$ . Et inueniatur nume-  
 | rus  $t$ , pro quo, quadratrix  $b$  ad quadratricem  $c$ ,  
 | sit minor, quàm  $f$  ad  $g$ ; maior, quàm  $g$  ad  $f$ .

Dico, pro  $t$ , massam  $a$ , ad massam  $d$ , minorem esse,  
 quàm  $e$  ad  $h$ ; & maiorem, quàm  $n$  ad  $r$ .

*Demonstr.*

*constr.* |  $a; b: e; f.$   
*constr.* |  $b; c:$  minor, quàm  $f; g.$   
*constr.* |  $c; d: g; h.$   
 4. *h.* |  $a; d:$  minor, quàm  $e; h.$  Quod &c.  
*assumpt.* |  $f; g:$  minor, quàm  $p; o.$   
 2. *h.* |  $g; f:$  maior, quàm  $o; p.$   
*constr.* |  $b; c:$  maior, quàm  $g; f.$   
 13. 5. |  $b; c:$  maior, quàm  $o; p.$   
*constr.* |  $a; b: n; o.$   
*constr.* |  $c; d: p; r.$   
 4. *h.* |  $a; d:$  maior, quàm  $n; r.$  Quod &c.  
 Quare &c.

---





Petrus Mengolus, D. Iacobo Tesino Philosophiae  
Doctore S. D.



*Ibi primum ex mea schola, Vir Excellentiss. atque alteri è schola Excellentissimi Cassini, amico nostro Io. Galeatio Manzio, contigit hoc elementum communicari: quod non, sine tuo, atque illius nomine, publicari oportebat; quoniam ipsi mihi tum placere cepit, cum utramque vestrum obtinuit approbationem. Postulabam honesti furis laudem. quod, cum huiusmodi contemplationis aliena sit materia, eorum videlicet, quibus logarithmos debemus; cumque aliena sit etiam forma, & contemplationis modus, ipsissimus Euclidis in quinto: meum fecerim ex utraque compositum. & quemadmodum, praecedentium elementorum in utraque subiecti, & modi novitate gloriabar: ita praesentis in vetustate, novam laudem quarebam. Ille, visis definitionibus, & audita primarum octo propositionum, ex Euclide, translatione fideli; statim omnibus*

nibus



nibus titulis propositionum, à me cursim lectis, & sine demonstratione facilem, pro sui acumine ingenij, præstabat assensum: & suggestit, potuisse totam hanc lucubrationem, unica propositione comprehendere. Quæ demonstrat Euclides in quinto elementorum, de magnitudinibus maioribus, minoribus, æqualibus, æque multiplicibus, & eandem, vel maiorem rationem habentibus: posse demonstrari de rationibus altioribus, depressioribus, æque altis, æque multiplicatis, & eandem, vel maiorem logarithmicam rationem habentibus. Cogitabam si possem huiusmodi uti consilio: tibi que interim rure superuenienti capi communicare. Itaque singulis propositionibus & demonstrationibus, toto animo intendebas, & cum quinto Euclidis diligenter conferebas, cumq; duo inciderimus, in traducendo, difficiliora (unum, minoris inæqualitatis rationes, quæ, quò minores sunt, eò altiores dicuntur, pro maioribus magnitudinibus vsuuenire. alterum, rationem ex ratione subtrahi, vel decomponi, per suæ compositionem conuertere) intellexi non esse operis dispendium, mutatis mutandis, ex Euclide integram translationem perficere, & exhibere. Tuque ipse iustum, furtum, & honestissimum probasti: quòd non ab



omnibus facile probarentur peculiare propositiones,  
 quæ sub illa unica continentur. Et certè à me  
 non possent commodè allegari, ad alia in sequentibus  
 elementis demonstranda. Quos ergo semel approba-  
 sti labores meos, ut amicis Et communices,  
 Et commendes, enixè rogo: nam non  
 mihi soli, non paucis, sed  
 omnibus laboro.

Vale.



GEO:







# GEOMETRIÆ SPECIOSÆ

## ELEMENTVM QVARTVM.

### DEFINITIONES.



1.  Varum rationum inæqualitatis, vtrarumque maioris, vel vtrarumque minoris, Altior, dicetur, ab æqualitate remotior.
2. Et Depressior, æqualitati propior.
3. Submultiplicata est ratio rationis, depressior, altioris, cum depressior, aliquoties composita, facit altiore.
4. Multiplicata verò altior, depressioris; cum depressior, aliquoties composita, facit altiore.
5. Ratio logarithmica dicetur, duarum rationum inæqualitatis, vtrarumque maioris, vel vtrarumque minoris, mutua quædam; secundum altitudinem, vel depressionem habitudo.
6. Proportio logarithmica, dicetur, similitudo logarithmarum rationum, vel ad inuicem, vel ad alias rationes.
7. Rationem logarithmicam habere inter se rationes dicen-



dicentur, quæ multiplicatæ, possunt se mutuo, altitudine superare.

8. In eadem ratione logarithmicè, dicuntur esse rationes duæ, prima, ad secundam, atque duæ quantitates, prima, ad secundam: cum primæ rationis, qualibet multiplicata ratio, & primæ quantitatæ æquemultiplex, à secundæ rationis qualibet multiplicata, & à secundæ quantitatæ æquemultiplici, vel vnà deficiunt, vel vnà æquales sunt, vel vnà excedunt; ratio quidem, altitudine, & quantitas ipsa quantitate.

9. Et dicetur prima ratio ad secundam, proportionalis logarithmicè, sicut prima quantitas ad secundam.

10. Cum verò primæ rationis multiplicata ratio, altior fuerit, quàm multiplicata secundæ; multiplex autem primæ quantitatæ, non maior fuerit, quàm multiplex secundæ: dicetur logarithmica ratio rationum, maior, quàm ratio quantitatum.

11. Cumque è contra, multiplex primæ quantitatæ, maior fuerit multiplici secundæ; multiplicata autem ratio primæ rationis, non altior, quàm multiplicata, secundæ: dicetur ratio quantitatum, maior, quàm logarithmica ratio rationum.

12. Rursum in eadem ratione logarithmicè, dicentur esse rationes quatuor prima ad secundam, atque tertia ad quartam: cum primæ, ac tertiæ, rationes æquemultiplicatæ, à secundæ, & quartæ, rationibus æquemultiplicatis, qualiscunque sit hæc multiplicatio, vtraque, ab vtraque,  
vel



vel vnà altiores sunt, vel vnà æquealtæ, vel vnà depressiores, si eę sumantur, quæ inter se respondent.

13. Eamdem autem habentes rationem logarithmicam, rationes, logarithmicè proportionales vocentur.

14. Cum verò æquemultiplicatarum, multiplicata primæ rationis altior fuerit, quàm multiplicata secundæ; multiplicata autem tertiæ, non altior fuerit, quàm multiplicata quartæ: tunc prima ratio ad secundam, maiorem rationem logarithmicam habere dicetur, quàm tertia ad quartam.

15. Homologæ rationes rationibus, aut quantitatibus dicuntur, antecedentes quidem antecedentibus, & consequentes consequentibus.

16. Homologia logarithmica est sumptio homologarum rationum, aut & quantitarum, vt in alia quadam logarithmica proportionalitate, fiant homologæ.

17. Alterna ratio logarithmica, est rationum sumptio antecedentis comparatæ ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

18. Inuerfa ratio logarithmica, est rationum sumptio consequentis, ceu antecedentis, comparatæ ad antecedentem, velut ad consequentem.

19. Compositio rationis logarithmicæ, est sumptio compositæ ex rationibus antecedenti, & consequenti, ceu vnius ad ipsam consequentem.

20. Diuisio rationis logarithmicæ, est sumptio rationis, quacum composita consequens facit antecedentem,

V

ad



ad ipsam consequentem.

21. Conuersio rationis logarithmicæ, est sumptio antecedentis, ad eam, quacum composita consequens facit ipsam antecedentem.

22. Ex æqualitate ratio logarithmica est, si plures duabus sint rationes, & his, vel quantitates, vel aliæ rationes, multitudine pares, quæ binæ sumatur, & in eadem ratione logarithmica: cum vt in primis rationibus, prima logarithmicè se habet ad vltimam, sic in secundis vel rationibus, vel quantitatibus, prima ad vltimam in sese habuerit. Vel aliter sumptio extremarum, per subductionem mediarum.

23. Ordinata proportio logarithmica est, tribus positis rationibus, & alijs, vel quantitatibus, vel rationibus, quæ sint his multitudine pares: cum, vt in primis rationibus, logarithmicè se habet antecedens, ad consequentem; ita in secundis, vel quantitatibus, vel rationibus, antecedens ad consequentem: & vt in primis, consequens, ad aliam quampiam; sic in secundis, consequens, ad aliã quampiam.

24. Perturbata autem logarithmica proportio est: cum vt in primis, logarithmicè se habet antecedens, ad consequentem; ita in secundis, antecedens ad consequentem: & vt in primis, consequens, ad aliam quampiam; sic in secundis, alia quampiam, ad antecedentem.

*Theor.*



*Theor. 1. Prop. 1.*

**S**I sint quotcunque rationes, quotcunque rationum, æqualium numero, singulæ singularum æquemultiplicatæ: quàm multiplicata est vna, vnius; tàm multiplicata est composita omnium, compositæ omnium.

*Hypoth.*

$a3; b3$ : multiplicata  $a; b$ .

$c3; d3$ : æquemultiplicata  $c; d$ :

Dico  $a3; b3, +c3; d3$ : æquemultiplicatam  $a; b, +c; d$ .

*Demonstr.*

*hypoth.*  $a3; b3$ :  $a; b, +a; b, +a; b$ .

*hypoth.*  $c3; d3$ :  $c; d, +c; d, +c; d$ :

*p. p.*  $a3; b3, +c3; d3$ :  $a; b, +c; d, +a; b, +c; d, +a; b, +c; d$ .

*hypoth.* Multitudo rationum  $a; b$ , &  $a; b$ , &  $a; b$ : æqualis est multitudini  $c; d$ , &  $c; d$ , &  $c; d$ : necnon multitudini  $a; b, +c, d$ , &  $a; b, +c; d$ , &  $a; b, +c; d$ .

*def. 4. b.*  $a3; b3, +c3; d3$ : æquemultiplicata  $a; b, +c; d$ .  
Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 2. Prop. 2.*

**S**I prima ratio, secundæ, fuerit æquemultiplicata, atque prima quantitas, est multiplex secundæ; fuerit autem & tertia ratio, secundæ, æquemultiplicata, atque tertia

V 2

quan-



quantitas, est multiplex secundæ: erit composita ratio ex prima, & tertia, secundæ, æquemultiplicata, atque aggregata quantitas ex prima, & tertia, est multiplex secundæ.

*Hypoth.*

$a_2; b_2$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $2c; c$ , multiplex.

$a_3; b_3$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $3c; c$ , multiplex.

Dico  $a_2; b_2, + a_3; b_3$ : multiplicatam  $a; b$ . sicut  $2c + 3c; c$ , multiplicem.

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $a_2; b_2: a; b, + a; b$ . sicut  $2c: c + c$ . Et quot sunt rationes  $a; b$ , &  $a; b$ : tot sunt  $c$ , &  $c$ , quantitates.

*hypoth.* |  $a_3; b_3: a; b, + a; b, + a; b$  sicut  $3c: c + c + c$ . Et quot sunt rationes  $a; b$ , &  $a; b$ , &  $a; b$ : tot sunt quantitates,  $c$ , &  $c$ , &  $c$ .

*p. p.* |  $a_2; b_2, + a_3; b_3: a; b, + a; b, + a; b, + a; b, + a; b$ . sicut  $2c + 3c: c + c + c + c + c$ . & quot sunt rationes  $a; b$ , &  $a; b$ , &  $a; b$ , &  $a; b$ , &  $a; b$ : tot sunt quantitates,  $c$ , &  $c$ , &  $c$ , &  $c$ , &  $c$ .

*def. 4. h.* |  $a_2; b_2, + a_3; b_3$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $2c + 3c; c$ , multiplex. Quod &c.

Quare &c.

---

*Theor. 3. Prop. 3.*

**S**I prima ratio, secundæ, æquæ fuerit multiplicata, atque tertia, quartæ; fuerit autem & quinta; secundæ,



$dx$ , æquemultiplicata, atque sexta, quartæ: erit & composita ex prima, & quinta, secundæ æquemultiplicata, atq; composita ex tertia, & sexta, quartæ.

*Hypoth.*

$a_2; b_2$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $c_2; d_2$ : multiplicata  $c; d$ .

$a_3; b_3$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $c_3; d_3$ : multiplicata  $c; d$ .

Dico  $a_2; b_2, +a_3; b_3$ : multiplicatam  $a; b$ . sicut  $c_2; d_2, +c_3; d_3$ : multiplicatam  $c; d$ .

*Demonstr.*

*hypoth.*  $a_2; b_2: a; b, +a; b$ . sicut  $c_2; d_2: c; d, +c; d$ .  
Et quot sunt  $a; b$ , &  $a; b$ : tot sunt  $c; d$ , &  $c; d$ .

*hypoth.*  $a_3; b_3: a; b, +a; b, +a; b$ . sicut  $c_3; d_3: c; d, +c; d, +c; d$ . Et quot sunt  $a; b$ , &  $a; b$ , &  $a; b$ : tot sunt  $c; d$ , &  $c; d$ , &  $c; d$ .

*P. P.*  $a_2; b_2, +a_3; b_3: a; b, +a; b, +a; b, +a; b, +a; b$ . sicut  $c_2; d_2, +c_3; d_3: c; d, +c; d, +c; d, +c; d, +c; d$ . Et quot sunt  $a; b$ , &  $a; b$ , &  $a; b$ , &  $a; b$ , &  $a; b$ : tot sunt  $c; d$ , &  $c; d$ , &  $c; d$ , &  $c; d$ , &  $c; d$ .

*def. 4. b.*  $a_2; b_2, +a_3; b_3$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $c_2; d_2, +c_3; d_3$ : multiplicata  $c; d$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor.*



*Theor. 4. Prop. 4.*

**S**I prima ratio, secundæ æquemultiplicata fuerit, atque prima quantitas, secundæ; sumantur autem ratio, & quantitas; & sumpta ratio, sit æquemultiplicata primæ rationis, atque sumpta quantitas, multiplex primæ quantitatis: erit & ex æquo, sumpta ratio, æquemultiplicata secundæ rationis, atque sumpta quantitas, secundæ quantitatis.

*Hypoth.*

$a3; b3$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $3c; c$ , multiplex.  
 $a6; b6$ : multiplicata  $a3; b3$ . sicut  $6c; 3c$ , multiplex.

Dico  $a6; b6$ : multiplicatam  $a; b$ . sicut  $6c; c$ , multiplicem.

*Demonstr.*

*hypoth.*  $a3; b3$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $3c; c$ , multiplex:

2. *b.*  $a3; b3, +a3, b3$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $3c + 3c; c$ , multiplex.

*hypoth.*  $a6; b6: a3; b3, +a3; b3$ . sicut  $6c: 3c + 3c$ .  
 Et quot sunt,  $a3; b3$ , &  $a3; b3$ : tot sunt  $3c$ , &  $3c$ .

$a6; b6$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $6c; c$ , multiplex. Quod &c. Quare &c.

*Theor. 5. Prop. 5.*

**S**I prima ratio, secundæ æquemultiplicata fuerit, atque tertia, quartæ; sumantur autem æquemultiplicatæ rationes,



tiones, primæ, & tertiæ: erit & ex æquo, sumptarum vtraque, vtriusque, æquemultiplicata; altera quidem secunde, altera autem quartæ.

*Hypoth.*

$a_3; b_3$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $c_3; d_3$ : multiplicata  $c; d$ .

$a_6; b_6$ : multiplicata  $a_3; b_3$ . sicut  $c_6; d_6$ : multiplicata  $c_3; d_3$ .

Dico  $a_6; b_6$ : multiplicatam  $a; b$ . sicut  $c_6; d_6$ : multiplicatam  $c; d$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $a_3; b_3$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $c_3; d_3$ : multiplicata  $c; d$ .

3. b. |  $a_3; b_3, + a_3; b_3$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $c_3; d_3, + c_3; d_3$ : multiplicata  $c; d$ .

*hypoth.* |  $a_6; b_6$ :  $a_3; b_3, + a_3; b_3$ . sicut  $c_6; d_6$ :  $c_3; d_3, + c_3; d_3$ . Et quot sunt  $a_3; b_3$ , &  $a_3; b_3$ : totidem sunt  $c_3; d_3$ , &  $c_3; d_3$ .

|  $a_6; b_6$ : multiplicata  $a; b$ . sicut  $c_6; d_6$ : multiplicata  $c; d$ . Quod &c.

Quare &c.

---

*Theor. 6. Propos. 6.*

**S**I fuerint, in eadem ratione logarithmica, prima ratio, ad secundam, atque prima quantitas, ad secundam: etiam multiplicata primæ rationis, & æquemultiplex primæ quantitatis, ad multiplicatam, secundæ rationis, & æque-



æquemultiplicem secundæ quantitatis, in eadem erunt logarithmica ratione.

*Hypoth.*

Sint rationes  $A$ , &  $B$ ; & quantitates  $a$ , &  $b$ : & sit ratio  $A$ , ad rationem  $B$ , logarithmicè; sicut quantitas  $a$ , ad quantitatem  $b$ . Sitque ratio  $3A$ , multiplicata rationis  $A$ ; sicut quantitas  $3a$ , multiplex quantitatis  $a$ : item ratio  $4B$ , multiplicata rationis  $B$ ; sicut quantitas  $4b$ , multiplex quantitatis  $b$ .

Dico rationem  $3A$ , ad rationem  $4B$ , esse logarithmicè sicut quantitas  $3a$ , ad quantitatem  $4b$ .

*Præpar.*

Accipiatur ratio  $6A$ , multiplicata rationis  $3A$ ; & quantitas  $6a$ , æquemultiplex quantitatis  $3a$ : item ratio  $20B$ , multiplicata rationis  $4B$ ; & quantitas  $20b$ , æquemultiplex quantitatis  $4b$ .

*Demonstr.*

4. b.

*hypoth.*

*def. 8. b.*

*constr.*

Ratio  $6A$ , æquemultiplicata est rationis  $A$ ; atque quantitas  $6a$ , multiplex est quantitatis  $a$ . item ratio  $20B$ , æquemultiplicata est rationis  $B$ ; atque quantitas  $20b$ , multiplex est quantitatis  $b$ . Sunt autem rationes  $A$  ad  $B$  logarithmicè, sicut quantitates  $a$  ad  $b$ . Ergo si ratio  $6A$ , est altior ratione  $20B$ ; etiam quantitas  $6a$ , maior est quantitate  $20b$ : si æque alta; æqualis: si depressior; minor. Sed est ratio  $6A$ , æquemultiplicata rationis  $3A$ ; atque quantitas  $6a$ , multiplex



def. 8. b. | tiplex quantitatis  $3a$ : & ratio  $20B$ , rationis  $4B$ ,  
 æquemultiplicata est; atque quantitas  $20b$ , quan-  
 titatis  $4b$ . Ergo rationes  $3A$ , ad  $4B$ , sunt lo-  
 garithmicè; sicut quantitates,  $3a$ , ad  $4b$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 7. Prop. 7.*

**S**I prima ratio, ad secundam, eandem habuerit ratio-  
 nem logarithmicè, atque tertia, ad quartam: etiam  
 æquemultiplicatæ rationes primæ, & tertiæ, ad æquemul-  
 tiplicatas secundæ, & quartæ, iuxta quamvis multiplica-  
 tionem, eandem habebunt rationem, si prout inter se re-  
 spondent, ita sumptæ fuerint.

*Hypoth.*

Sunto rationes quatuor  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , logarithmi-  
 cè proportionales: & sunt ipsarum  $A$ ,  $C$ , æquemulti-  
 plicatæ rationes  $3A$ ,  $3C$ : necnon ipsarum  $B$ ,  $D$ , æque-  
 multiplicatæ,  $4B$ ,  $4D$ .

Dico quatuor rationes  $3A$  ad  $4B$ , &  $3C$  ad  $4D$ , lo-  
 garithmicè proportionales esse.

*Prepar.*

Sumantur ipsarum  $3A$ ,  $3C$ , æquemultiplicatæ ratio-  
 nes  $6A$ ,  $6C$ : & ipsarum  $4B$ ,  $4D$ , æquemultiplicatæ,  
 $20B$ ,  $20D$ .

*Demonst.*

4. b. | Rationes  $6A$ ,  $6C$ , æquemultiplicatæ sunt ra-  
 tionum,  $A$ ,  $C$ : &  $20B$ ,  $20D$ , æquemultiplicatæ  
 X sunt



*hypoth.* | sunt rationum  $B, D$ . suntque  $A$  ad  $B$ , logarith-  
*def.12.b* | micè proportionales, vt  $C$  ad  $D$ . Ergo si  $6A$ , al-  
 | tior est, quàm  $20B$ ; etiam  $6C$ , altior est, quàm  
 |  $20D$ : si æquealta; æquealta: si depressior; depres-  
*hypoth.* | sior. Et sunt  $6A, 6C$ , ipsarum  $3A, 3C$ , æque-  
 | multiplicatæ; necnon  $20B, 20D$ , ipsarum  $4B,$   
*def.12.b* |  $4D$ , æquemultiplicatæ. Ergo  $3A$  ad  $4B$ , &  $3C$   
 | ad  $4D$ , sunt logarithmicè proportionales.  
 | Quod &c.

Quare &c.

---

*Theor. 8. Prop.*

**S**I fuerint duæ rationes, singulæ, ex binis compositæ,  
 altiores, ex depressioribus, & quodammodo totæ, ex  
 abscissa, & residua: fuerit autem vna tota ratio, ad alteram  
 totam, æquemultiplicata; atque sua abscissa, ad alterius ab-  
 scissam: erit & æquemultiplicata; atque sua residua, ad al-  
 terius residuam.

*Hypoth.*

Ratio  $A+B$ , ex rationibus  $A$ , &  $B$ ; altior, ex depres-  
 sioribus, componitur; item  $C+D$  ratio, ex rationibus  $C$ ,  
 &  $D$ , componitur: & esto  $A+B$ , ad  $C+D$ , æquemulti-  
 plicata, atque  $A$  ad  $C$ .

Dico  $A+B$  ad  $C+D$ , æquemultiplicatam etiam esse,  
 atque  $B$  ad  $D$ .

*Præpar.*

Fiat ratio  $G$  ad  $D$ , æquemultiplicata, atque  $A$  ad  $C$ .

*De-*



*Demonstr.*

*p. b.* |  $A+B$  ad  $C+D$ , æquemultiplicata est, atque  $A$   
           | ad  $C$ .  
*hypoth.* |  $A+B$  ad  $C+D$ , æquemultiplicata est, atque  $A$  ad  $C$ .  
*p. p.* |  $A+B$  ratio, eadem est, quæ  $A+G$ .  
           | Et composita vtriusque conuersa rationis  $A$ ,  
*p. p.* |  $B$  ratio, eadem est, quæ  $G$ .  
*p. p.* |  $B$  ad  $D$ , æquemultiplicata est, atque  $A$  ad  $C$ .  
*p. b.* |  $A+B$  ad  $C+D$ , æquemultiplicata est, atque  $B$  ad  
           |  $D$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 9. Prop. 9.*

**S**I ratio, & quantitas, cuiusdam rationis, & cuiusdam  
 quantitatis, æquè sint multiplicata, & multiplex; &  
 abscissa ratio, & abscissa quantitas, eiusdem rationis, &  
 eiusdem quantitatis, æquè sint multiplicata, & multiplex:  
 residua ratio, & residua quantitas, eiusdem rationis, & eius-  
 dem quantitatis, vel sunt æquealta, & æqualis; vel æquè  
 sunt multiplicata, & multiplex.

*Hypoth.*

Ratio  $A+B$ , rationis  $C$ , æquemultiplicata est, atque  
 quantitas  $a+b$ , multiplex quantitatis  $c$ ; & ratio  $A$ , ratio-  
 nis  $C$ , æquemultiplicata est, atque quantitas  $a$ , multiplex  
 quantitatis  $c$ .

Dico quod, vel  $B$  æquealta est ipsi  $C$ ; sicut  $b$ , æqua-  
 lis ipsi  $c$ : vel  $B$  æquemultiplicata est ipsius  $C$ ; sicut  $b$

X 2

mul-



164 ELEMENTVM  
multiplex ipsius  $c$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* Numerus rationum  $C$ , ex quibus  $A+B$  componitur, idem est qui quantitatum  $c$ , ex quibus  $a+b$  colligitur: item numerus rationum  $C$  ex quibus  $A$  componitur, idem est qui quantitatum  $c$ , ex quibus  $a$  componitur. Quorum numerorum, vel est differentia vnitas, vel numerus.

*hypoth.* Si vnitas est differentia; vna est ratio  $C$ , quacum composita ratio  $A$ , facit rationem  $A+B$ ; & vna est quantitas  $c$ , quacum composita quantitas  $a$ , facit quantitatem  $a+b$ . Sed &  $B$  ratio est, quacum composita  $A$ , facit rationem  $A+B$ ; &  $b$  quantitas est, quacum composita  $a$ , facit quantitatem  $a+b$ . Ergo  $B$  æquealta est ipsi  $C$ ; atque  $b$  æqualis ipsi  $c$ .

*hypoth.* Si verò numerus est differentia, tot sunt rationes  $C$ , quibuscum composita ratio  $A$ , facit rationem  $A+B$ ; totidemque sunt quantitates  $c$ , quibus cum composita quantitas  $a$ , facit quantitatem  $a+b$ . Sed  $B$  ratio est, quacum composita ratio facit rationem  $A+B$ ; &  $b$  quantitas, quacum composita quantitas  $a$ , facit quantitatem  $a+b$ . Ergo quot ex  $C$  rationibus componitur  $B$ ; tot ex  $c$ , quantitativibus componitur  $b$ . Ergo  $B$  ad  $C$ , æquemultiplicata est, atque  $b$  ad  $c$ , multiplex. Ergo  $B$  ad  $C$ , vel æquealta est: atque  
 $b$  ad  $c$

*def. 4. b.*



$b$  ad  $c$ , æqualis: vel æquemultiplicata est; atque multiplex. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 10. Prop. 10.*

**S**I duæ rationes, duarum rationum, sint æquemultiplicatae; & abscissæ quædam, sint earumdem æquemultiplicatae: & residuæ, eisdem, aut æquealtæ sunt, aut æquemultiplicatae.

*Hypoth.*

Ratio  $A+B$ , rationis  $C$ , æquemultiplicata est, atque ratio  $D+E$ , rationis  $F$ ; & ratio  $A$ , rationis  $C$ , æquemultiplicata est, atque ratio  $D$ , rationis  $F$ .

Dico rationem  $B$  rationis  $C$ , æquealtam esse, atque ratio  $E$  rationis  $F$ ; vel æquemultiplicatam.

*Demonstr.*

*hypoth.* | Quot ex  $C$  rationibus, ratio  $A+B$  componitur, idem numerus est, indicans etiam, quot ex  $F$  rationibus, componitur ratio  $D+E$ . & quot ex  $C$  rationibus, ratio  $A$  componitur, idem numerus est, indicans etiam, quot ex  $F$  rationibus, ratio  $D$  componitur: quorum numerorum vel est differentia vnitas, vel numerus.

Si vnitas est differentia: vna est ratio  $C$ , quacum composita ratio  $A$ , facit rationem  $A+B$ ; & vna est ratio  $F$ , quacum composita ratio  $D$ , facit rationem  $D+E$ . Sed &  $B$  cum  $A$ , &  $E$  cum  $D$ , fa-



$D$ , faciunt rationes compositas  $A+B$ , &  $D+E$ .  
Ergo  $B$  ad  $C$  eadem est, & æquealta, atque ratio  
 $E$  ad  $F$ . si enim binæ non essent æquealtæ; esset  
vna binarum, æqualitati propior, quàm altera, &  
non essent eadem inter se.

Si verò numerus est differentia: totidem sunt  
rationes  $C$ , quibuscum ratio  $A$  composita, facit  
 $A+B$  rationem; quot etiam rationes  $F$ , quibuf-  
cum ratio  $D$  composita, facit  $D+E$  rationem.  
*hypoth.* Sed &  $B$  cum  $A$ , &  $E$  cum  $D$ , faciunt rationes  
*def. 4. h.* compositas  $A+B$ , &  $D+F$ . Ergo  $B$  ad  $C$  æque-  
multiplicata est, atque  $E$  ad  $F$ . Ergo  $B$  ad  $C$ , vel  
æquealta est, vel æquemultiplicata, atque  $E$  ad  $F$ .  
Quod &c.

Quare &c.

*Theor. II. Propos. II.*

**Æ** Quealtæ, ad eandem, eandem habent rationem  
logarithmicam: & eadem, ad æquealtas.

*Hypoth.*

Rationes  $A$ , &  $B$  sunt æquealtæ.

Dico  $A$  rationem, ad  $C$ , esse logarithmicè, vt  $B$ , ad  
 $C$ . Et  $C$  rationem, ad  $A$ , esse logarithmicè, vt  $C$ , ad  $B$ .

*Prepar.*

Sumantur ipsarum  $A$ ,  $B$ , æquemultiplicatæ rationes  
 $D$ ,  $E$ : & sumatur  $F$  ratio multiplicata, rationis  $C$ .

*De-*



*Demonstr.*

*def. 5. b.*

Quoniam  $A$  ad  $C$ , ratio est logarithmica; cuius inæqualitatis est ratio  $C$ , eiusdè est &  $A$ : item quoniam  $B$  ad  $C$ , ratio est logarithmica; cuius inæqualitatis est  $C$ , eiusdè est &  $B$ : ergo  $A$ ,  $B$  rationes, eiusdè inter se sunt inæqualitatis: & sunt  $A$ ,  $B$  æquealtæ: ergo sunt eadè inter se. si enim non essent eadè inter se, esset vna remotior ab æqualitate, quàm altera, & non essent æquealtæ. Sumptæ autem sunt  $D$ ,  $E$  æquemultiplicatæ rationum  $A$ ,  $B$  earundè inter se: ergo etiam  $D$ ,  $E$ , sunt eadè inter se rationes, & æquealtæ. Ergo si  $D$  est altior, quàm  $F$ , etiam  $E$  altior est, quàm  $F$ : si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. Ergo ratio  $A$  ad  $C$ , est logarithmicè, sicut ratio  $B$  ad  $C$ . Quod &c. Necnon ratio  $C$  ad  $A$ , est logarithmicè, sicut  $C$  ad  $B$ . Quod &c.

*p. p.*

*def. 12. b.*

Quare &c.

*Theor. 12. Prop. 12.*

**R**ationum non æquealtarum, altior ad eandè, maior est logarithmicè, quàm depressior: & eadè ad depressiorem, maior est logarithmicè, quàm ad altiore.

*Hypoth.*

Est ratio  $A+B$  altior, quàm  $B$ .

Dico  $A+B$ , ad  $C$ , maiorem esse logarithmicè, quàm  $B$ ,  
ad  $C$ . Et



Et  $C$ , ad  $B$ , maiorem logarithmicè, quàm  $C$ , ad  $A+B$ .

*Præpar. & Demonstr.*

*def. 7. h.* Sumatur  $A$  ratio, quæ cum  $B$ , componit rationem  $A+B$ : & duarum rationum  $A, B$ , sumatur altera non altior, quæ sit  $A$ : & rationis  $A$ , multiplicata  $D$ , quoties oportet, vt fiat altior, quàm  $C$ ; & rationis  $B$ , æquemultiplicata sumatur  $E$ .

*cōtra p. p. & p. 3.* Quoniam  $A$ , non est altior, quàm  $B$ ; &  $D, E$  sunt æquemultiplicatæ ipsarum  $A, B$ : oportet  $D$  non esse altiore, quàm  $E$ . si enim esset altior, ex iisdem, vel ex propioribus æqualitati, vtrisque maioris, vel vtrisque minoris inæqualitatis rationibus, esset remotior ab æqualitate ratio composita. ergo  $D$ , est altior, quàm  $C$ : ergo  $E$ , est altior, quàm  $C$ .

*def. 7. h.* Sumatur ipsius  $C$ , bis, ter, quater, vel deinceps, quoties oportet, multiplicata ratio  $F$ , vt fiat primò altior quàm  $E$ . Quare ratio  $F$ , non est altior, quàm ratio  $E+C$ : est autem  $D$  altior, quàm  $C$ : ergo  $D+E$  altior est, quàm  $E+C$ . alioquin ex remotioribus ab æqualitate rationibus, vtrisque maioris, vel vtrisque minoris inæqualitatis, non altior fieret composita ratio, ideoque non remotior ab æqualitate, *contra p. p. & p. 3.* Sed  $F$ . non est altior, quàm  $E+C$ : ergo  $D+E$ , est altior, quàm  $F$ : & est  $E$  depressior, quàm  $F$ : & sunt  $D, E$  rationes æquemultiplicatæ, rationum  $A, B$ :  
*p. h.* &  $D+E$  ratio, est æquemultiplicata, rationis  $A+B$ :

Ergo



def.14.b | Ergo  $A+B$  ratio, ad rationem  $C$ , maior est lo-  
 def.14.b | garithmicè, quàm  $B$  ad  $C$ . Quod &c. Et ratio  
 |  $C$ , ad rationem  $B$ , maior est logarithmicè, quàm  
 |  $C$ , ad  $A+B$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 13. Prop. 13.*

**Q**uæ, ad eandem, eandem habent rationem logari-  
 thmicam; inter se sunt eadem rationes logarithmi-  
 cæ: & ad quas eadem, eandem habet logarithmi-  
 cam; inter se sunt eadem rationes logarithmicæ.

*Hypoth. 1.*

Ratio  $A$  ad rationem  $C$ , esto logarithmicè, sicut ra-  
 tio  $B$  ad rationem  $C$ .

Dico rationes  $A$ ,  $B$ , esse easdem inter se.

*Demonstr.*

def.5.b. | Quoniam  $A$  ad  $C$ , &  $B$  ad  $C$ , sunt rationes  
 | logarithmicæ; cuius inæqualitatis est  $C$  ratio, ma-  
 | ioris, vel minoris; eiusdem sunt  $A$ , &  $B$  rationes:  
 | quæ si non eadem essent inter se, non essent æque-  
 | altæ: & assignaretur earum altera altior. Assignetur  
 12. b. |  $A$ , si fieri potest, altior, quàm  $B$ : ergo  $A$  ad  $C$ ,  
 | maior est logarithmicè, quàm  $B$ . *contra hypoth.* Er-  
 | go rationes  $A$ ,  $B$ , sunt eadem inter se. Quod &c.

*Hypoth. 2.*

Ratio  $C$ , ad rationem  $A$ , esto logarithmicè, sicut ra-  
 tio  $C$ , ad rationem  $B$ .

Y

Dico



Dico rationes  $A, B$ , esse easdem inter se.

*Demonstr.*

12. b. | Assignetur  $A$ , si fieri potest depressior, quàm  
 |  $B$ : Ergo  $C$  ad  $A$ , maior est logarithmicè, quàm  
 | ad  $B$ : *contra hypoth.* Ergo  $A$  non est depressior,  
 | quàm  $B$ : item demonstrabitur, quod neque  $B$   
 11. b. | est depressior, quàm  $A$ : sunt ergo  $A, B$  rationes  
 | æquealtæ, & eadem inter se. Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 14. Prop. 14.*

**R**ationum, ad eandem rationem, quæ maior est logarithmicè, illa est altior: & ad quàm, eadem maior est logarithmicè, illa est depressior.

*Hypoth. 1.*

Ratio  $A$ , maior est logarithmicè ad  $C$ , quàm  $B$ .

Dico  $A$ , altiorem esse, quàm  $B$ .

*Demonstr.*

11. b. | Esto  $A$  non altior, quàm  $B$ , si fieri potest: erit  
 | itaque vel æquealta, vel depressior. Sinto  $A, B$   
 | æquealtæ, si fieri potest. Ergo  $A$  ad  $C$ , est loga-  
 | rithmicè, sicut  $B$ . *contra hypoth.* Esto  $A$  depres-  
 12. b. | sior, quàm  $B$ , si fieri potest. Ergo  $B$  ad  $C$ , mi-  
 | nor est logarithmicè, quàm  $A$ . *contra hypoth.* Er-  
 | go  $A$ , non est æquealta, neque depressior,  
 | quàm  $B$ : ergo est altior. Quod &c.

*Hy-*



*Hypoth. 2.*

Ratio  $C$  ad  $A$ , maior est logarithmicè, quàm ad  $B$ .

Dico  $A$ , depressiorem esse, quàm  $B$ .

*Demonstr.*

11. *h.* | Esto  $A$  non depressior, quàm  $B$ , si fieri potest:  
 | erit itaque vel æqualta, vel altior. Sunt  $A$ ,  $B$   
 | æqualta, si fieri potest. Ergo  $C$  ad  $A$ , est loga-  
 | rithmicè, sicut ad  $B$ . *contra hypoth.* Esto  $A$  altior,  
 12. *h.* | quàm  $B$ , si fieri potest. Ergo  $C$  ad  $A$ , minor  
 | est logarithmicè, quàm ad  $B$ . *contra hypoth.* Er-  
 | go  $A$  non est æqualta, neque altior, quàm  $B$ :  
 | ergo est depressior. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 15. Prop. 15.*

**Q**uæ eidem sunt eadem rationes, inter se sunt eadem,  
 tum logarithmicè, tum absolutè.

*Hypoth. 1.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , logarithmicè sunt, vt quantitates  $c$   
 ad  $d$ : &  $e$  ad  $d$  quantitates, vt quantitates  $e$  ad  $f$ .

Dico rationes  $A$  ad  $B$ , logarithmicè esse, sicut quan-  
 titates  $e$  ad  $f$ .

*Hypoth. 2.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , logarithmicè sunt, vt quantitates  $c$   
 ad  $d$ : &  $e$  ad  $d$  quantitates, sunt sicut logarithmicè ra-  
 tiones  $E$  ad  $F$ .

Dico rationes  $A$  ad  $B$ , esse logarithmicè, sicut rationes  
 $E$  ad  $F$ .

Y 2

Hy-



*Hypoth. 3.*

Quantitates  $a$  ad  $b$ , sunt inter se, sicut logarithmicè, rationes  $C$  ad  $D$ : & rationes  $C$  ad  $D$ , logarithmicè sunt, sicut quantitates  $e$  ad  $f$ .

Dico  $a$  ad  $b$ , esse vt  $e$  ad  $f$ .

*Hypoth. 4.*

Quantitates  $a$  ad  $b$ , sunt inter se, sicut logarithmicè, rationes  $C$  ad  $D$ : & rationes  $C$  ad  $D$ , logarithmicè sunt, vt rationes  $E$  ad  $F$ .

Dico quantitates  $a$  ad  $b$  esse, sicut logarithmicè, rationes  $E$  ad  $F$ .

*Hypoth. 5.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , logarithmicè sunt, vt rationes  $C$  ad  $D$ : & rationes  $C$  ad  $D$ , logarithmicè, vt rationes  $E$  ad  $F$ .

Dico rationes  $A$  ad  $B$  logarithmicè esse, sicut rationes  $E$  ad  $F$ .

*Prepar. comm.*

Sumantur ipsarum rationum, vel quantitatum  $A$ ,  $C$ ,  $E$ , æquemultiplicatæ, & æquemultiplices,  $3A$ ,  $3C$ ,  $3E$ : necnon ipsarum  $B$ ,  $D$ ,  $F$ , æquemultiplicatæ, & æquemultiplices,  $4B$ ,  $4D$ ,  $4F$ .

*Demonstr. comm.*

*def. 8 vel 12. h. vel 65.* Si  $3A$ , altior est, vel maior, quàm  $4B$ ; etiam  $3C$ , altior est, vel maior, quàm  $4D$ . Quod si  $3C$ , altior est, vel maior, quàm  $4D$ ; etiam  $3E$  altior est, vel maior, quàm  $4F$ . Ergo si  $3A$  altior est, vel



def 8 vel  
12. h. vel  
6. 5.

vel maior, quàm  $4B$ ; etiam  $3E$  altior est, vel maior, quàm  $4F$ . Item si æquealta, vel æqualis; etiam æquealta, vel æqualis: si depressior, vel minor; etiam depressior, vel minor. Ergo proportionales sunt siue rationes, siue quantitates, vel mixtim  $A$  ad  $B$ , sicut  $E$  ad  $F$ : tùm logarithmici, siue, siquæ sunt rationes; tùm absolute, si nullæ sunt rationes, sed solum quantitates. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 16. Prop. 16.*

**S**I sint quotcunque rationes logarithmicè proportionales, quemadmodum se habuerit logarithmicè una antecedentium ad vnam consequentium; ita logarithmicè se habebit composita ex omnibus antecedentibus, ad compositam ex omnibus consequentibus.

*Hypoth.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , &  $E$  ad  $F$ , sunt logarithmicè proportionales. Ex rationibus  $A$ ,  $C$ , &  $E$  composita est  $A+C+E$ : & ex rationibus  $B$ ,  $D$ , &  $F$  composita est  $B+D+F$ .

Dico  $A+C+E$  ad  $B+D+F$ , &  $A$  ad  $B$ , esse logarithmicè proportionales.

*Præpar.*

Rationum  $A$ ,  $C$ ,  $E$  sumantur æquemultiplicatæ rationes  $3A$ ,  $3C$ ,  $3E$ : ex quibus composita ratio  $3A+3C+3E$ . Item rationum  $B$ ,  $D$ ,  $F$ , sumantur æquemultiplicatæ



cata rationes  $4B$ ,  $4D$ ,  $4F$ : ex quibus composita ratio  $4B+4D+4F$ .

*Demonstr.*

*def. 12. b*

Quoniam  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales: si  $3A$  altior est, quàm  $4B$ ; etiam  $3C$  altior est, quàm  $4D$ : si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. Item quoniam  $C$  ad  $D$ , &  $E$  ad  $F$ , sunt logarithmicè proportionales: si  $3C$  altior est, quàm  $4D$ ; etiam  $3E$ , altior est, quàm  $4F$ : si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. Ergo si  $3A$ , altior est, quàm  $4B$ : etiam  $3A+3C+3E$  altior est quàm  $4B+4D+4F$ : si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. & est  $3A+3C+3E$  ad  $A+C+E$ , totuplicata, quotuplicata est  $3A$  ad  $A$ : item  $4B+4D+4F$ , ad  $B+D+F$ . totuplicata est, quotuplicata  $4B$  ad  $B$ . Ergo  $A+C+E$  ad  $B+D+F$ , &  $A$  ad  $B$ , sunt logarithmicè proportionales.

*p. b.* Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 17. Propos. 17.*

**S**I sex vel rationum, vel & quantitatum mixtim, prima ad secundam eandem habuerit rationem, quàm tertia ad quartam: tertia verò ad quartam maiorem habuerit, quàm quinta ad sextam: etiam prima ad secundam, maiorem habebit, quàm quinta ad sextam.

*Hy-*



*Hypoth. 1.*

Quantitates  $a$  ad  $b$ , &  $c$  ad  $d$ , sunt proportionales: sed quantitatum  $c$  ad  $d$  ratio, maior est, quàm logarithmica,  $E$  ad  $F$  rationum.

Dico quantitatum  $a$  ad  $b$  rationem maiorem esse, quàm logarithmica  $E$  ad  $F$  rationum.

*Hypoth. 2.*

Quantitates  $a$  ad  $b$ , & rationes  $C$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales: sed rationum logarithmica ratio  $C$  ad  $D$ , maior est quàm quantitatum  $e$  ad  $f$ .

Dico  $a$  ad  $b$  maiorem esse, quàm  $e$  ad  $f$ .

*Hypoth. 3.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , & quantitates  $c$  ad  $d$ , sunt logarithmicè proportionales: sed quantitatum ratio  $c$  ad  $d$ , maior est, quàm  $e$  ad  $f$ .

Dico rationum logarithmicam  $A$  ad  $B$ , maiorem esse, quàm  $e$  ad  $f$ .

*Hypoth. 4.*

Quantitates  $a$  ad  $b$ , & rationes  $C$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales: sed rationum  $C$  ad  $D$  logarithmicè maior est, quàm  $E$  ad  $F$ .

Dico quantitatum  $a$  ad  $b$  rationem maiorem esse, quàm rationum logarithmica  $E$  ad  $F$ .

*Hypoth. 5.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , & quantitates  $c$  ad  $d$  sunt proportionales logarithmicè: sed quantitatum  $c$  ad  $d$ , maior est ratio, quàm logarithmica rationum  $E$  ad  $F$ .

Dico



Dico  $A$  ad  $B$ , maiorem esse logarithmicè, quàm  $E$  ad  $F$ .

*Hypoth. 6.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$  sunt proportionales: sed  $C$  ad  $D$  ratio, logarithmicè maior est, quàm  $e$  ad  $f$ .

Dico rationum  $A$  ad  $B$  logarithmicam rationem, maiorem esse, quàm quantitatum  $e$  ad  $f$ .

*Hypoth. 7.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , sunt proportionales: sed  $C$  ad  $D$  rationum ratio logarithmicè maior est quàm  $E$  ad  $F$  ratio logarithmica.

Dico  $A$  ad  $B$  logarithmicè maiorem esse, quàm  $E$  ad  $F$ .

*Præpar. comm.*

Sumantur æquemultiplicate rationum rationes, & æquemultiplices quantitatum quantitates; antecedentium  $A$ ,  $C$ ,  $E$ , antecedentes  $3A$ ,  $3C$ ,  $3E$ ; & consequentium  $B$ ,  $D$ ,  $F$  consequentes  $4B$ ,  $4D$ ,  $4F$ : secundum eas multiplicationes; quibus  $3C$ , altior quidem est, vel maior, quàm  $4D$ ; sed  $3E$ , non altior, vel non maior est, quàm  $4F$ .

*Demonstr. commun.*

def 8 vel 12. h. vel 6. 5. | Quoniam  $3C$  est altior, vel maior, quàm  $4D$ :  
def. 10. | ergo etiam  $3A$  est altior, vel maior, quàm  $4B$ : &  
vel 11. | interim  $3E$  non altior est, vel non maior, quàm  
vel 14. h. |  $4F$ . ergo  $A$  ad  $B$ , maior est, quàm  $C$  ad  $D$ , si-  
vel 8. 5. | uè logarithmicè, siuè absolutè. Quod &c.  
Quare &c.

Theo-



Theor. 18. Prop. 18.

**R**ationum logarithmicè proportionalium, si prima fuerit altior, quàm tertia: erit & secunda altior, quàm quarta: si æquealta; æquealta: si depressior; depressior.

*Hypoth. commun.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales.

*Hypoth. 1.*

Altior est ratio  $A$ , ratione  $C$ .

Dico, quòd altior est ratio  $B$ , ratione  $D$ .

*Demonstr.*

12. b. | Esto, si fieri potest, non altior  $B$  ratio, quàm  
11. b. |  $D$ : ergo vel est æquealta, vel depressior. Esto si  
17. b. | fieri potest æquealta. Ergo  $A$  ad  $B$ , maior est  
logarithmicè, quàm  $C$  ad  $B$ : sed  $C$  ad  $B$  eadem  
est logarithmicè, quæ  $C$  ad  $D$ . Ergo  $A$  ad  $B$  ma-  
ior est logarithmicè quàm  $C$  ad  $D$ , *contra hypoth.*  
Non sunt ergo  $B$ ,  $D$  rationes æquealtæ.

12. b. | Esto, si fieri potest,  $B$  depressior, quàm  $D$ . Er-  
go  $C$  ad  $B$ , maior est logarithmicè, quàm  $C$  ad  
*hypoth.* |  $D$ . Sed  $A$  ad  $B$ , est logarithmicè, vt  $C$  ad  $D$ . Er-  
17. b. | go  $C$  ad  $B$ , maior est logarithmicè, quàm  $A$  ad  
14. b. |  $B$ . Ergo  $C$  altior est, quàm  $A$ . *contra hypoth.*  
Non est ergo  $B$  depressior, quàm  $D$ ; neque  
æquealta: ergo  $B$  est altior, quàm  $D$ . Quod &c.

Z

Hy-



*Hypoth. 2.*Æquealtæ sunt rationes  $A, C$ .Dico quòd & æquealtæ sunt rationes  $B, D$ .*Demonstr.*

Sunto  $B, D$  non æquealtæ, si fieri potest: &  
 12. b. | esto  $B$  altior, quàm  $D$ . Ergo  $C$  ad  $D$ , maior  
 hypoth. | est logarithmicè, quàm  $C$  ad  $B$ . Sed  $A$  ad  $B$ , ea-  
 17. b. | dem est logarithmicè, quæ  $C$  ad  $D$ . Ergo  $A$  ad  
 14. b. |  $B$ , maior est logarithmicè, quàm  $C$  ad  $B$ . Ergo  
 |  $A$ , altior est, quàm  $C$ . *contra hypoth.* Sunt ergo  
 |  $B, D$  æquealtæ. Quod &c.

*Hypoth.*Depressior est  $A$ , quàm  $C$ .Dico quòd &  $B$  depressior est, quàm  $D$ .*Demonstr.*

*hypoth.* | Altior est  $C$  quàm  $A$ : & est  $C$  ad  $D$  logari-  
 sup. | thmicè, vt  $A$  ad  $B$ : ergo altior est  $D$ , quàm  $B$ :  
 def. 2. b. | ergo depressior est  $B$ , quàm  $D$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 19. Prop. 19.*

**S**ubmultiplicatæ rationes, cum pariter multiplicatis, in  
 eadem sunt ratione logarithmica, si prout sibi mutuò  
 respondent, ita sumantur.

*Hypoth.*Rationū  $A, B$ , sunt æquemultiplicate rationes  $3A, 3B$ .Dico  $A$  ad  $B$ , atque  $3A$  ad  $3B$ , esse logarithmicè pro-  
 portionales.*De-*



*Demonstr.*

16. b. | Rationes  $A$  ad  $B$ , &  $A$  ad  $B$ , &  $A$  ad  $B$ , quot-  
cunque oportet, acceptæ, sunt proportionales: er-  
go ex antecedentibus composita  $3A$ , ad ex con-  
sequentibus compositam  $3B$ , est logarithmicè,  
vt  $A$  ad  $B$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 20. Prop. 20.*

**R**ationes logarithmicè proportionales, permutan-  
do, sunt logarithmicè proportionales.

*Hypoth.*

Sint rationes logarithmicè proportionales,  $A$  ad  $B$ ,  
vt  $C$  ad  $D$ .

Dico permutando, esse logarithmicè proportionales,  
 $A$  ad  $C$ , vt  $B$  ad  $D$ .

*Præpar.*

Rationum  $A$ ,  $B$ , sumantur æquemultiplicatæ  $3A$ ,  $3B$ :  
& rationum  $C$ ,  $D$ , æquemultiplicatæ  $2C$ ,  $2D$ .

*Demonstr.*

19. b. | Rationes  $3A$  ad  $3B$ , &  $A$  ad  $B$ , sunt lo-  
hypoth. | garithmicè proportionales. item  $A$  ad  $B$ , &  $C$   
19. b. | ad  $D$ . item  $C$  ad  $D$ , &  $2C$  ad  $2D$ . Ergo  
15. b. |  $3A$  ad  $3B$ , &  $2C$  ad  $2D$  sunt logarithmicè  
18. b. | proportionales. Ergo si  $3A$ , est altior, quàm  
def. 12. b. |  $2C$ ; etiam  $3B$ , est altior, quàm  $2D$ : si æque-  
alta; æquealta: si depressior; depressior. Ergo  $A$   
Z 2 | ad  $C$ ,



ad  $C$ , &  $B$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales.  
Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 21. Prop. 21.*

**R**ationes inter se, vel & cum quantitatibus, logarithmicè proportionales, diuidendo, sunt logarithmicè proportionales.

*Hypoth. 1.*

Rationes  $A+B$  ad  $B$ , &  $C+D$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales.

Dico diuidendo rationes  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , esse logarithmicè proportionales.

*Præpar.*

Sumantur ipsarum  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , æquemultiplicatæ  $3A$ ,  $3B$ ,  $3C$ ,  $3D$ : necnon ipsarum  $C$ ,  $D$ , aliæ quælibet æquemultiplicatæ  $4C$ ,  $4D$ .

*Demonstr.*

*p. b.* Rationes  $3A$ ,  $3B$ , æquemultiplicatæ sunt rationum  $A$ ,  $B$ : Ergo ratio  $3A+3B$  totuplicata est rationis  $A+B$ , quotuplicata est  $3A$  ipsius  $A$ : necnon  $3C$ , &  $3D$  ipsarum  $C$ , &  $D$ : necnon ratio  $3C+3D$  rationis  $C+D$ .

*constr.* Rationes quoque  $3C$ ,  $3D$ , rationum  $C$ ,  $D$ ; & rationes  $4C$ ,  $4D$ , earundem  $C$ ,  $D$  rationum sunt æquemultiplicatæ: ergo etiam  $7C$ ,  $7D$ , earundem  $C$ ,  $D$  rationum sunt æquemultiplicatæ.  
*3. b.* Et



*hypoth.*

*def. 12. b*

Et quoniam rationes  $A+B$  ad  $B$ , &  $C+D$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales: si  $3A + 3B$ , altior est, quàm  $7B$ ; etiam  $3C+3D$ , altior est, quàm  $7D$ : si æquealta; æquealta: si depressior; depressior.

4. 3.

Sed si  $3A$  altior est, quàm  $4B$ ; adcomposita communi ratione  $3B$ ; etiam  $3A+3B$  altior est, quàm  $7B$ . nam eiusdem maioris, vel eiusdem minoris inæqualitatis, ex remotioribus rationibus ab æqualitate, composita ratio, est remotior; & ex propioribus, propior. & ostensum est, quòd si  $3A+3B$ , altior est quàm  $7B$ ; etiam  $3C+3D$ , altior est, quàm  $7D$ : & seposita communi ratione  $3D$ ; altior est  $3C$ , quàm  $4D$ . nam si  $3C$ , non esset altior, quàm  $4D$ : composita,  $3D$ ; fieret ratio  $3C+3D$ , non altior, quàm  $7D$ . *contra superius probata.*

4. 3.

Ergo si  $3A$  altior est, quàm  $4B$ , etiam  $3C$  altior est, quàm  $4D$ : similiter ostendetur, si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. Ergo  $A$  ad  $B$ , est logarithmicè, vt  $C$  ad  $D$ . Quod &c.

*def. 12. b*

*Hypoth. 2.*

Rationes  $A+B$  ad  $B$ , & quantitates  $a+b$  ad  $b$ , sunt logarithmicè proportionales.

Dico diuidendo, rationes  $A$  ad  $B$ , & quantitates  $a$  ad  $b$  esse logarithmicè proportionales.

*Pre-*



*Prepar.*

Rationum  $A$ ,  $B$ , & quantitatum  $a$ ,  $b$ , sumantur æquemultiplicatæ rationes  $3A$ ,  $3B$ , & æquemultiplices quantitates  $3a$ ,  $3b$ . item rationis  $B$ , & quantitatis  $b$ , multiplicata ratio  $4B$ , & æquemultiplex quantitas  $4b$ .

*Demonstr.*

*p. h.* Ratio  $3A+3B$ , totuplicata est rationis  $A+B$ ,  
*constr.* quotuplicata est  $3A$ , ipsius  $A$ ; & quantitas  $3a$ ,  
*p. 5.* quantitatis  $a$ ; & quantitas  $3b$ , quantitatis  $b$ ; &  
 quantitas  $3a+3b$ , quantitatis  $a+b$ .

*constr.* Quantitates quoque  $3a$ ,  $3b$ , quantitatum  $a$ ,  
*2. 5.*  $b$ ; & quantitates  $4a$ ,  $4b$ , earumdem  $a$ ,  $b$ , sunt  
 æquemultiplices: ergo  $7a$ ,  $7b$ , earumdem  $a$ ,  $b$ ,  
 sunt æquemultiplices.

*hypoth.* Et quoniam rationes  $A+B$  ad  $B$ , & quanti-  
*def 8. b.* tates  $a+b$  ad  $b$ , sunt logarithmicè proportionales: si  $3A+3B$ , altior est, quàm  $7B$ ; etiam  $3a+3b$ , maior est, quàm  $7b$ : si æquealta; æqualis: si depressior; minor.

*sup.* Sed si  $3A$ , altior est, quàm  $4B$ ; etiam  $3A+3B$ ,  
 altior est, quàm  $7B$ : & si  $3a+3b$ , maior est,  
 quàm  $7b$ ; etiam, dempta communi  $3b$ , relinquitur  $3a$ , maior quàm  $4b$ . Ergo si  $3A$ , altior est, quàm  $4B$ ; etiam  $3a$ , maior est, quàm  $4b$ :  
*def 8. b.* & similiter ostendetur, si æquealta; æqualis: si depressior; minor. Ergo rationes  $A$  ad  $B$ , & quantitates  $a$  ad  $b$ , sunt logarithmicè proportionales. Quod &c. Quare &c.



*Theor. 22. Prop. 22.*

**R**ationes inter se, vel & cum quantitibus, logarithmicè proportionales, componendo, sunt logarithmicè proportionales.

*Hypoth. 1.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales.

Dico componendo, rationes  $A+B$  ad  $B$ , &  $C+D$  ad  $D$ , esse logarithmicè proportionales.

*Præpar.*

Assumatur  $E$  ratio, ad quam  $C+D$  sit logarithmicè, sicut  $A+B$  ad  $B$ .

*Demonstr.*

*constr.* | Quoniam  $A+B$  ad  $B$ , &  $C+D$  ad  $E$ , sunt logarithmicè proportionales: ergo diuidendo  $A$  ad  $B$ , &  $C+D$  ---  $E$  ad  $E$ , sunt logarithmicè proportionales. Sed  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$  sunt logarithmicè proportionales. Ergo  $C$  ad  $D$ , &  $C+D$  ---  $E$  ad  $E$ , sunt logarithmicè proportionales. Ergo  $D$ , æquealta est, ideoque eadem, atque  $E$ .

*18. h.* | Nam si  $D$ , esset altior, quàm  $E$ : esset  $C$  altior, quàm  $C+D$  ---  $E$ . Sed contra, esset  $C+D$  altior, quàm  $C+E$ : &  $C+D$  ---  $E$ , altior, quàm  $C$ : quod est contradictio. Rursum si  $D$ , esset depressior, quàm  $E$ : esset  $C$ , depressior, quàm  $C+D$  ---  $E$ . Sed contra, esset  $C+D$ , depressior; quàm  $C+E$ :

&amp;



4. 3. &  $C+D \dashv\dashv E$ , depressior, quàm  $C$ : quod est  
contradictio.

Ergo  $D$  eadem est, atque  $E$ . Ergo  $C+D$  ad  
18. b.  $D$ , &  $C+D$  ad  $E$ , sunt proportionales logarithmi-  
constr. cè. Sed  $A+B$  ad  $B$  est vt  $C+D$  ad  $E$ : ergo  $A$   
15. b.  $+B$  ad  $B$ , est vt  $C+D$  ad  $D$  logarithmicè.  
Quod &c.

*Hypoth. 2.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , & quantitates  $a$  ad  $b$ , sunt loga-  
rithmicè proportionales.

Dico componendo, rationes  $A+B$  ad  $B$ , & quanti-  
tates  $a+b$  ad  $b$ , esse logarithmicè proportionales.

*Præpar.*

Assumatur  $e$  quantitas, ad quàm,  $a+b$  est logarithmi-  
cè, sicut ratio  $A+B$ , ad rationem  $B$ .

*Demonstr.*

constr. Quoniam  $A+B$  ad  $B$ , &  $a+b$  ad  $c$ , sunt lo-  
garithmicè proportionales: ergo diuidendo  $A$  ad  
 $B$ , &  $a+b \dashv\dashv c$  ad  $c$ , sunt logarithmicè, propor-  
hypoth. tionales. Sed  $A$  ad  $B$ , &  $a$  ad  $b$ , sunt logari-  
15. b. thmicè proportionales. Ergo  $a$  ad  $b$ , &  $a+b$   
 $\dashv\dashv c$  ad  $c$ , sunt proportionales. Ergo  $b$ ,  $c$ , sunt  
quantitates æquales.

14. 5. Nam si  $b$ , maior esset, quàm  $c$ : esset  $a$ , maior,  
quàm  $a+b \dashv\dashv c$ . Sed contra, esset  $a+b$ , maior,  
quàm  $a+c$ : &  $a+b \dashv\dashv c$ , maior, quàm  $a$ : quod  
14. 5. est contradictio. Rursum si  $b$ , minor esset, quàm  
 $c$ : esset



$c$ : esset  $a$ , minor, quàm  $a+b --- c$ . sed contra, esset  $a+b$ , minor, quàm  $a+c$ : &  $a+b --- c$ , minor quàm  $a$ : quod est contradictio.

7. 5. Ergo  $b$ ,  $c$ , sunt æquales. Ergo  $a+b$ , ad  $b$ ,  
 constr. est vt  $a+b$  ad  $c$ : Sed ratio  $A+B$  ad rationem  
 15. b.  $B$ , est logarithmicè, vt quantitas  $a+b$  ad quantitatem  $c$ : Ergo etiam est logarithmicè, vt  $a+b$  ad  $b$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 23. Prop. 23.*

**S**I quemadmodum tota ratio, ad totam, ita logarithmicè fuerit abscissa ratio, ad abscissam: erit & residua, ad residuam, sicut logarithmicè tota ad totam.

*Hypoth.*

Rationes  $A+B$  ad  $C+D$ , &  $A$  ad  $C$ , sunt proportionales logarithmicè.

Dico etiam  $A+B$  ad  $C+D$ , &  $B$  ad  $D$ , esse proportionales logarithmicè.

*Demonstr.*

*hypoth.* Rationes  $A+B$  ad  $C+D$ , &  $A$  ad  $C$ , sunt  
 20. b. proportionales logarithmicè: ergo permutando,  
 21. b. sunt proportionales logarithmicè  $A+B$  ad  $A$ ,  
 &  $C+D$  ad  $C$ : ergo diuidendo,  $B$  ad  $A$ , &  
 20. b.  $D$  ad  $C$ , sunt proportionales: ergo permutando  $B$  ad  $D$ , &  $A$  ad  $C$ , sunt proportionales:  
 Sed  $A$  ad  $C$ , &  $A+B$  ad  $C+D$  sunt proportionales.  
 Aa



15. b. | nales. Ergo  $A+B$  ad  $C+D$ , &  $B$  ad  $D$ , sunt  
| logarithmicè proportionales. Quod &c.  
Quare &c.

*Theor. 24. Prop. 24.*

**S**I sint tres rationes, atque tres quantitates, quæ binæ, & in eadem ratione logarithmica sumantur: ex æquo autem prima ratio, quàm tertia, altior fuerit; erit & prima quantitas, quàm tertia, maior: quod si prima ratio, fuerit æquealta tertiæ; erit & prima quantitas, æqualis tertiæ: si illa depresso; hæc quoque minor erit. Et è conuerso.

*Hypoth. commun.*

Tres rationes  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , & tres quantitas  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , binæ, & binæ, sunt logarithmicè proportionales:  $A$  ad  $B$ , vt  $a$  ad  $b$ ;  $B$  ad  $C$ , vt  $b$  ad  $c$ .

*Hypoth. 1.*

Altior est ratio  $A$ , quàm  $C$ .

Dico, maiorem esse quantitatem  $a$ , quàm  $c$ .

*Demonstr.*

12. b. | Ratio  $B$  ad  $C$ , maior est logarithmicè, quàm  
hypoth. |  $B$  ad  $A$ : sed  $b$  ad  $c$  est logarithmicè vt  $B$  ad  
def. 8. b. |  $C$ : &  $B$  ad  $A$ , est logarithmicè, vt  $b$  ad  $a$ : er-  
17. b. | go  $b$  ad  $c$ , maior est, quàm  $b$  ad  $a$ . Ergo  
10. 5. | maior est  $a$ , quàm  $c$ . Quod &c.

*Hypoth. 2.*

Æquealtæ sunt rationes  $A$ ,  $C$ .

Dico, æquales esse quantitates  $a$ ,  $c$ .

De-



*Demonstr.*

¶ 1. *h.* | Ratio  $B$  ad  $C$ , est logarithmicè, vt  $B$  ad  
*sup.* |  $A$ . Ergo  $b$  ad  $c$ , est vt  $b$  ad  $a$ . Ergo æqua-  
 9. 5. | les sunt  $a$ ,  $c$ . Quod &c.

*Hypoth. 3.*

Depressior est ratio  $A$ , quàm  $C$ .

Dico, minorem esse quantitatem  $a$ , quàm  $c$ .

*Demonstr.*

*def. p. h.* | Altior est,  $C$ , quàm  $A$ : ergo maior est  $c$ ,  
*sup.* | quàm  $a$ : Ergo minor est  $a$ , quàm  $c$ . Quod &c.

Eodem modo demonstrabitur è conuerso: quòd si  $a$  quantitas, maior est quantitate  $c$ : etiam ratio  $A$ , ratione  $C$  est altior: si æqualis; æquealta: si minor; depressior. Quod. &c.

Quare &c.

*Theor. 25. Prop. 25.*

**S**I sint tres rationes, aliæque ipsis æquales numero, quæ binæ, & in eadem ratione logarithmica sumantur: ex æquo autem, prima quàm tertia altior fuerit; erit & quarta, quàm sexta altior. Quod si prima tertiæ fuerit æquealta; erit & quarta æquealta sextæ: sin illa depressior; hæc quoque depressior erit.

*Hypoth. commun.*

Tres rationes  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , aliæque tres  $D$ ,  $E$ ,  $F$ , binæ, & binæ sunt logarithmicè proportionales:  $A$  ad  $B$ , vt  $D$  ad  $E$ ;  $B$  ad  $C$ , vt  $E$  ad  $F$ .

A a 2

Hy-



*Hypoth. 1.*Altior est ratio  $A$ , quàm  $C$ .Dico altiorem esse  $D$ , quàm  $F$ .*Demonstr.*

12. *b.* | Maior est  $B$ , ad  $C$ , logarithmicè, quàm  $B$  ad  
*hypoth.* |  $A$ . Sed  $B$  ad  $C$  est logarithmicè, vt  $E$  ad  $F$ : &  
*def. 12. b.* |  $B$  ad  $A$ , logarithmicè, vt  $E$  ad  $D$ . Ergo maior  
 17. *b.* | est  $E$  ad  $F$ , logarithmicè, quàm  $E$  ad  $D$ . Ergo  
 14. *b.* | altior est  $D$ , quàm  $F$ . Quod &c.

*Hypoth. 2.*Æquealtæ sunt rationes  $A$ ,  $C$ .Dico, æquealtas esse rationes  $D$ ,  $F$ .*Demonstr.*

11. *b.* | Eadem est  $B$  ad  $C$ , logarithmicè, quæ  $B$   
*sup.* | ad  $A$ . Ergo eadem est  $E$  ad  $F$  logarithmicè quæ  
 13. *b.* |  $E$  ad  $D$ . Ergo æquealtæ sunt rationes  $D$ ,  $F$ .  
 Quod &c. *Hypoth. 3.*

Depressior est  $A$ , quàm  $C$ .Dico, depressiorem esse  $D$ , quàm  $F$ .*Demonstr.*

*def p. b.* | Altior est enim  $C$ , quàm  $A$ : ergo altior est  $F$ ,  
*sup.* | quàm  $D$ : ergo depressior est  $D$ , quàm  $F$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 26. Prop. 26.*

**S**I sint tres quantitates, atque tres rationes, quæ binæ, &  
 in eadem ratione logarithmica sumantur; fueritque  
 per-



perturbata earum proportio: ex æquo autem prima quantitas, quàm tertia, maior fuerit; erit & prima ratio, quàm tertia, altior. Quod si prima tertiæ fuerit æqualis quantitas; erit & prima tertiæ, æquealta ratio: sin illa minor, hæc quoque depressior erit. Et è conuerso.

*Hypoth. commun.*

Tres quantitates  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , atque tres rationes  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , binæ, & binæ, sunt logarithmicè, proportionales; & earum perturbata est proportio: quantitates enim  $a$  ad  $b$ , & rationes  $B$  ad  $C$ , sunt logarithmicè proportionales: necnon quantitates  $b$  ad  $c$ , & rationes  $A$  ad  $B$ , sunt logarithmicè proportionales.

*Hypoth. 1.*

Maiores est  $a$ , quàm  $c$ .

Dico altiore esse  $A$ , quàm  $C$ .

*Demonstr.*

8. 5. | Maior est  $b$  ad  $c$  ratio, quàm  $b$  ad  $a$ ; Sed  
*hypoth.* |  $b$  ad  $c$ , est logarithmicè, vt  $A$  ad  $B$ : &  $b$  ad  
*def. 8. h.* |  $a$ , logarithmicè, vt  $C$  ad  $B$ . Ergo  $A$  ad  $B$ ,  
17. h. | maior est logarithmicè, quàm  $C$  ad  $B$ . Ergo  
14. h. | altior est  $A$ , quàm  $C$ . Quod &c.

*Hypoth. 2.*

Æquales sunt  $a$ ,  $c$ .

Dico æquealtas esse  $A$ ,  $C$ .

*Demonstr.*

7. 5. | Eadem est  $b$  ad  $c$ , quæ  $b$  ad  $a$ . Ergo eadem  
*sup.* | est logarithmicè  $A$  ad  $B$ , quæ  $C$  ad  $B$ . Ergo  $A$ ,  $C$   
13. h. | sunt æquealtæ. Quod &c. *Hy-*



*Hypoth. 3.*Minor est  $a$ , quàm  $c$ .Dico depressiorem esse  $A$ , quàm  $C$ .*Demonstr.*

*sup.* | Maior est  $c$ , quàm  $a$ : Ergo altior est  $C$ , quàm  
*def. 2. b.* |  $A$ : ergo depressior est  $A$ , quàm  $C$ . Quod &c.

Eodem modo demonstrabitur è conuerso: quòd si ratio  
 $A$ , ratione  $C$ , est altior; etiam quantitas  $a$ , quantitate  $c$ ,  
 est maior: si æquealta; æqualis: si depressior; minor.  
 Quod &c.

Quare &amp;c.

---

*Theor. 27. Prop. 27.*

**S**I sint tres rationes, & aliæ ipsis æquales numero, quæ  
 binæ, & in eadem ratione logarithmica sumantur; fue-  
 ritque perturbata earum proportio logarithmica: ex equo  
 autem prima, quàm tertia altior fuerit; erit & quarta; quàm  
 sexta, altior. Quòd si prima tertiæ fuerit æquealta; erit &  
 quarta æquealta sextæ: sin illa depressior; hæc quoque de-  
 pressior erit.

*Hypoth. commun.*

Tres rationes  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , aliæque tres  $D$ ,  $E$ ,  $F$ , bi-  
 næ, & binæ, sunt logarithmicè proportionales; & earum  
 perturbata est proportio: sunt enim  $A$  ad  $B$ , &  $E$  ad  $F$ ,  
 logarithmicè proportionales: necnon  $B$  ad  $C$ , &  $D$  ad  
 $E$ , sunt proportionales logarithmicè.

*Hy*



*Hypoth. 1.*Altior est  $A$ , quàm  $C$ .Dico altiorem esse  $D$ , quàm  $F$ .*Demonstr.*

12. b. | Maior est logarithmicè,  $B$  ad  $C$ , quàm  $B$  ad  
 hypoth. |  $A$ : sed  $B$  ad  $C$ , est vt  $D$  ad  $E$ : &  $B$  ad  $A$  est,  
 def. 12. b. | vt  $F$  ad  $E$ , logarithmicè: ergo  $D$  ad  $E$  maior  
 17. b. | est logarithmicè, quàm vt  $F$  ad  $E$ : Ergo  $D$  al-  
 14. b. | tior est, quàm  $F$ . Quod &c.

*Hypoth. 2.*Æquealtæ sunt  $A$ ,  $C$ .Dico æquealtas esse  $D$ ,  $F$ .*Demonstr.*

11. b. | Eadem est  $B$  ad  $C$  logarithmicè, quæ  $B$  ad  
 sup. |  $A$ . Ergo eadem est  $D$  ad  $E$  logarithmicè, quæ  
 13. b. |  $F$  ad  $E$ . Ergo  $D$ ,  $F$  sunt æquealtæ. Quod &c.

*Hypoth. 3.*Depressior est  $A$ , quàm  $C$ .Dico depressiorem esse  $D$ , quàm  $F$ .*Demonstr.*

def. p. b. | Altior est  $C$ , quàm  $A$ : ergo altior est  $F$ , quàm  
 sup. |  $D$ : ergo depressior est  $D$ , quàm  $F$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 28. Prop. 28.*

**S**I sint quoruncunque rationes totidemque quantitates,  
 quæ binæ, in eadem ratione logarithmica sumantur:

&amp;



& ex æqualitate in eadem erunt ratione logarithmica.

*Hypoth.*

Sint quotcunque rationes  $A, B, C, D$ , totidemque quantitates  $a, b, c, d$ : binæ, & binæ logarithmicè proportionales:  $A$  ad  $B$ , vt  $a$  ad  $b$ ;  $B$  ad  $C$ , vt  $b$  ad  $c$ ;  $C$  ad  $D$ , vt  $c$  ad  $d$ .

Dico ex æqualitate,  $A$  ad  $C$ , &  $a$  ad  $c$ , esse logarithmicè proportionales.

Item  $A$  ad  $D$ , &  $a$  ad  $d$  esse logarithmicè proportionales.

*Præpar.*

Rationis  $A$ , & quantitatis  $a$ , sumantur æquemultiplicata, & multiplex,  $3A, 3a$ : item rationis, & quantitatis,  $B, b$ , sumantur,  $4B, 4b$ : & rationis, & quantitatis,  $C, c$ , sumantur,  $2C, 2c$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* | Quoniam  $A$  ad  $B$ , &  $a$  ad  $b$ , sunt logarithmicè proportionales: ergo  $3A$  ad  $4B$ , &  $3a$  ad  $4b$ , sunt logarithmicè proportionales.

6. *b.* | Item quoniam  $B$  ad  $C$ , &  $b$  ad  $c$ , sunt logarithmicè proportionales: ergo  $4B$  ad  $2C$ , &  $4b$  ad  $2c$ , sunt logarithmicè proportionales. Ergo ex æquali, si  $3A$  est altior, quàm  $2C$ ; etiam  $3a$  est maior, quàm  $2c$ : si æquealta; æqualis: si depressior; minor. Ergo  $A$  ad  $C$ , &  $a$  ad  $c$  sunt logarithmicè proportionales. Quod &c.

6. *b.* | *hypoth.* | Sunt autem  $C$  ad  $D$ , &  $c$  ad  $d$ , logarithmicè proportionales.



*sup.* | cè proportionales. Ergo  $A$  ad  $D$ , &  $a$  ad  $d$ ,  
| sunt logarithmicè proportionales. Quod &c.  
Quare &c.

*Theor. 29. Propos. 29.*

**S**I sint quotcunque rationes, & aliæ ipsis æquales numero, quæ binæ, & in eadem logarithmica ratione sumantur: & ex æqualitate, in eadem erunt logarithmica ratione.

*Hypoth.*

Sint quotcunque rationes, & aliæ totidem,  $A, B, C, D$ , &  $E, F, G, H$ : quæ binæ, & in eadem ratione sumantur: videlicet,  $A$  ad  $B$ , &  $E$  ad  $F$ : item  $B$  ad  $C$ , &  $F$  ad  $G$ : necnon  $C$  ad  $D$ , &  $G$  ad  $H$ .

Dico ex æqualitate  $A$  ad  $C$ , &  $E$  ad  $G$ , esse logarithmicè, proportionales.

Item  $A$  ad  $D$ , &  $E$  ad  $H$ , esse logarithmicè proportionales.

*Prepar.*

Rationum  $A, E$ , sumantur æquemultiplicatæ,  $3A$ ,  $3E$ : item rationum  $B, F$ , æquemultiplicatæ  $4B$ ,  $4F$ : & rationum  $C, G$ , æquemultiplicatæ  $2C$ ,  $2G$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* | Quoniam  $A$  ad  $B$ , &  $E$  ad  $F$ , sunt logarithmicè proportionales, etiam  $3A$  ad  $4B$ , &  
*7. h.* |  $3E$  ad  $4F$ , sunt logarithmicè proportionales.

*hypoth.* | item quoniam  $B$  ad  $C$ , &  $F$  ad  $G$ , sunt logarithmicè proportionales, etiam  $4B$  ad  $2C$ , &  $4F$  ad  $2G$ , sunt logarithmicè proportionales.

Bb

gari-



7. *b.* | garithmicè proportionales; etiam  $4B$  ad  $2C$ ,  
 &  $4F$  ad  $2G$ , sunt logarithmicè, proportio-  
 25. *b.* | nales. Ergo si  $3A$  altior est quàm  $2C$ ; etiam  
 $3E$  altior est, quàm  $2G$ : si equealta; æquealta: si  
 def. 12. *b.* | depressior; depressior. Ergo  $A$  ad  $C$ , &  $E$  ad  $G$ ,  
 sunt logarithmicè proportionales. Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 30. Prop. 30.*

**S**I sint tres quantitates, totidemque rationes, quæ binæ  
 in eadem ratione logarithmica sumantur; fuerit autem  
 perturbata earum proportio: & ex æqualitate, in eadem  
 erunt ratione logarithmica.

*Hypoth.*

Sint tres quantitates  $a, b, c$ , totidemque rationes  $A, B, C$ , binæ, & binæ logarithmicè proportionales, & earum sit perturbata proportio: nempe sint  $a$  ad  $b$ , &  $B$  ad  $C$ , logarithmicè proportionales: &  $b$  ad  $c$ , &  $A$  ad  $B$ , logarithmicè proportionales.

Dico,  $a$  ad  $c$ , &  $A$  ad  $C$ , esse logarithmicè proportionales.

*Præpar.*

Sumantur ipsarum  $a, b$ , quantitatum æquemultiplices  $3a, 3b$ , & rationis  $A$ , æquemultiplicata  $3A$ . ipsarum quoque rationum  $B, C$ , & quantitatis  $c$ , sumantur æquemultiplicatæ rationes  $4B, 4C$ , & æquemultiplex quantitas  $4c$ .

*De-*



*Demonstr.*

*hypoth.* Quoniam  $b$  ad  $c$ , &  $A$  ad  $B$ , sunt logarithmicè proportionales: etiam  $3b$  ad  $4c$ , &  $3A$  ad  $4B$ , sunt logarithmicè proportionales: sunt autem  $3a$  ad  $3b$ , sicut  $a$  ad  $b$ : &  $a$  ad  $b$ , sicut logarithmicè  $B$  ad  $C$ : &  $B$  ad  $C$  logarithmicè, sicut  $4B$  ad  $4C$ . Ergo  $3a$  ad  $3b$ , est ut  $4B$  ad  $4C$ . Sed ostensum est,  $3b$  ad  $4c$ , esse logarithmicè, ut  $3A$  ad  $4B$ . ergo ex æquali, si  $3a$  est maior, quàm  $4c$ ; etiam  $3A$  est altior, quàm  $4C$ : si æqualis; æquealta: si minor; depressior. Ergo  $a$  ad  $c$ , est logarithmicè, sicut  $A$  ad  $C$ . Quod &c.

*def. 8. h.* Quare &c.

*Theor. 31. Prop. 31.*

**S**i sint tres rationes, aliæque ipsis æquales numero, quæ binæ in eadem ratione logarithmica sumantur, fuerit autem perturbata earum proportio logarithmica: etiam ex æqualitate, in eadem erunt logarithmica ratione.

*Hypoth.*

Tres rationes  $A, B, C$ , aliæque tres  $D, E, F$ , binæ sunt in eadem ratione logarithmica, & earum est perturbata proportio logarithmica; sunt enim  $A$  ad  $B$ , &  $E$  ad  $F$  logarithmicè proportionales: necnon  $B$  ad  $C$ , &  $D$  ad  $E$  sunt logarithmicè proportionales.

Dico, ex æquali,  $A$  ad  $C$ , &  $D$  ad  $F$ , esse logarithmicè proportionales.

Bb 2

Præ



*Prepar.*

Rationum  $A, B, D$ , sumantur æquemultiplicatæ  $3A, 3B, 3D$ : & rationum  $C, E, F$ , aliæ sumantur æquemultiplicatæ  $4C, 4E, 4F$ .

*Demonstr.*

19. *h.* | Rationes  $3A$  ad  $3B$ , &  $A$  ad  $B$ , sunt logari-  
*hypoth.* | thmicè proportionales: rationes  $A$  ad  $B$ , &  $E$   
 19. *h.* | ad  $F$ , sunt logarithmicè proportionales: ratio-  
*hypoth.* | nes  $E$  ad  $F$ , &  $4E$  ad  $4F$ , sunt logarithmicè  
 17. *h.* | proportionales: ergo rationes  $3A$  ad  $3B$ , &  $4E$   
*hypoth.* | ad  $4F$ , sunt logarithmicè proportionales. Et  
 7. *b.* | quoniâ  $B$  ad  $C$ , &  $D$  ad  $E$  rationes, logarithmicè  
 27. *b.* | sunt proportionales: etiam  $3B$  ad  $4C$ , &  $3D$   
*def. 12. b.* | ad  $4E$  rationes, logarithmicè sunt proportiona-  
 | les. Ergo ex æquali, si  $3A$  est altior, quàm  $4C$ ;  
 | etiam  $3D$  est altior, quàm  $4F$ : si æquealta; æque-  
 | alta: si depressior; depressior. Ergo  $A$  ad  $C$ , &  
 |  $D$  ad  $F$  rationes, sunt logarithmicè proportio-  
 | nales. Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 32. Prop. 32.*

**S**I prima ratio ad secundam, logarithmicè fuerit, sicut prima quantitas ad secundam; tertia quoque ratio ad secundam, logarithmicè fuerit, sicut tertia quantitas ad secundam: etiam composita ex prima, & tertia ratione, ad secundam, erit logarithmicè, sicut aggregata quantitas

ex



ex prima, & tertia, ad secundam.

*Hypoth.*

Sint  $A, B, C$  rationes, &  $a, b, c$ , quantitates: & sit  $A$  ad  $B$  logarithmicè, sicut  $a$  ad  $b$ : item  $C$  ad  $B$  logarithmicè, sicut  $c$  ad  $b$ .

Dico  $A+C$  ad  $B$ , esse logarithmicè, sicut  $a+c$  ad  $b$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* | Quoniam  $C$  ad  $B$ , est logarithmicè, sicut  $c$  ad  
*def. 8. b.* |  $b$ : conuertèdo,  $B$  ad  $C$ , est logarithmicè, sicut  $b$   
*hypoth.* | ad  $c$ : Sed  $A$  ad  $B$ , est logarithmicè, sicut  $a$  ad  $b$ :  
*28. b.* | ergo ex æquali  $A$  ad  $C$ , est logarithmicè, sicut  $a$  ad  
*22. b.* |  $c$ : ergo componendo  $A+C$  ad  $C$ , est logarithmi-  
*hypoth.* | cè, sicut  $a+c$  ad  $c$ . Sed  $C$  ad  $B$  est logarithmicè,  
*28. b.* | sicut  $c$  ad  $b$ : ergo ex æquali  $A+C$  ad  $B$  est lo-  
 garithmicè sicut  $a+c$  ad  $b$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 33. Prop. 33.*

**S**I prima ratio ad secundam, eadem logarithmicè fuerit, quæ tertia ad quartam; fuerit autem, & quinta ad secundam, eadem logarithmicè, quæ sexta ad quartam: erit & composita prima cum quinta ad secundam, eadem quæ composita tertia cum sexta ad quartam.

*Hypoth.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , sunt proportionales: item  $E$  ad  $B$ , &  $F$  ad  $D$ , sunt proportionales.

Dico  $A+E$  ad  $B$ , &  $C+F$  ad  $D$ , esse proportionales.

*De-*



*Demonstr.*

*hypoth.* Quoniam  $E$  ad  $B$ , &  $F$  ad  $D$ , sunt logari-  
*def. 12. h.* thmicè proportionales: conuertendo  $B$  ad  $E$ ,  
*hypoth.* &  $D$  ad  $F$ , sunt logarithmicè proportionales:  
*29. h.* sed  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , sunt logarithmicè  
*22. h.* proportionales: Ergo ex æquali  $A$  ad  $E$ , &  $C$   
*hypoth.* ad  $F$ ; sunt logarithmicè proportionales: ergo  
*29. h.* componendo  $A+E$  ad  $E$ , &  $C+F$  ad  $F$ , sunt  
 logarithmicè proportionales. Sed  $E$  ad  $B$ , &  
 $F$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales. Er-  
 go  $A+E$  ad  $B$ , &  $C+F$  ad  $D$ , sunt logarithmi-  
 cè proportionales. Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 34. Prop. 34.*

**S**I rationes quatuor fuerint logarithmicè proporna-  
 les: composita ex duabus, altiore omnium, & depres-  
 siore omnium, altior est, quàm composita ex reliquis  
 duabus.

*Hypoth.*

Sint rationes  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$  logarithmicè  
 proportionales: Et esto  $A$  altior, quàm  $B$ , necnon  
 altior quàm  $C$ . Et quoniam  $A$  altior est, quàm  $C$ : er-  
 go  $B$  altior est, quàm  $D$ . Ergo  $A$  altior est omnium;  
 &  $D$  depressior omnium.

Dico rationem  $A+D$ , altiore esse ratione  
 $B+C$ .

*Præ-*



*Præpar.*

Quoniam  $A$  altior est, quàm  $B$ : sumatur  $E$  ratio quacum composita  $B$ , facit rationem  $A$ : ut ita ratio  $A$  sit eadem, quæ  $B+E$ . Item quoniam  $C$  altior est, quàm  $D$ : sumatur  $F$  ratio, quacum composita  $D$ , facit rationem  $C$ : ut ita ratio  $C$ , sit eadem, quæ  $D+F$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* Quoniam  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales: & est  $A$ , eadem, quæ  
*constr.*  $B+E$ : &  $C$ , eadē, quæ  $D+F$ . ergo  $B+E$  ad  $B$ ,  
 11. *b.* &  $D+F$  ad  $D$ , sunt logarithmicè proportionales: ergo diuidendo,  $E$  ad  $B$ , &  $F$  ad  $D$ , sunt  
 21. *b.* logarithmicè proportionales. Sed  $B$  altior est,  
*b. hypoth.* quàm  $D$ : ergo  $E$  altior est, quàm  $F$ : compo-  
 18. *b.* sitisque communiter  $B$ , &  $D$  rationibus; ergo  
 4. 3.  $B+E$  ad  $D$  ratio, altior est, quàm  $B+D+F$ . Sed  
*constr.*  $B+E$ , ratio eadem est, quæ  $A$ : &  $D+F$ , eadem quæ  $C$ : ergo  $A+D$  altior est, quàm  
 |  $B+C$ . Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 35. Prop. 35.*

**R**ationes proportionales, per conuersionem rationis, sunt proportionales.

*Hypoth.*

Rationes  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$  sunt logarithmicè proportionales: & est  $A$  altior, quàm  $B$ : ideoque etiam  $C$ ,  
 altior



altior est, quàm  $D$ .

Dico  $A$  ad  $A---B$ , esse logarithmicè, sicut  $C$  ad  $C---D$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $A$ ;  $B$ ;  $C$ ;  $D$ .

21. *b.* |  $A---B$ ;  $B$ ;  $C---D$ ;  $D$ .

*def. 12. b.* |  $B$ ;  $A$ ;  $D$ ;  $C$ .

29. *b.* |  $A---B$ ;  $A$ ;  $C---D$ ;  $C$ .

*def. 12. b.* |  $A$ ;  $A---B$ ;  $C$ ;  $C---D$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 36. Prop. 36.*

**R**ationes logarithmicè proportionales, per homologiam sunt logarithmicè proportionales.

*Demonstr.*

*def. 12. b.* | Nam conuertendo, rationes fiunt proportionales: item homologas depressores ab homologis altioribus decomponendo: & adcomponendo; & per conuersionem rationis: & diuidendo: & æquemultiplicando, & æquesubmultiplicando: & permutando: & colligendo: & ex æquali in proportionem logarithmica ordinata: coniunctisque omnifariam argumentis huiusmodi, quocunque ordine, per homologiam, logarithmicè proportionales fiunt. Quod &c.

Quare &c.

Petrus





Petrus Mengolus, Io. Galeatio Manzio, iuueni  
studiosissimo. S.D.



*Q*uintum hoc elementum, de nouis, &  
naturalibus logarithmis, cuiusque  
rationis inseparabiliter proprijs, quo-  
cum communicarem, neminem in  
mea, aut cuiusquam alterius Mathe-  
matici schola, satis noui dispositum, prater te, omnium  
bonarum artium, & in primis Mathematicarum,  
studiosissimum. Et hac profectio insignis felicitas,  
in comparabili virtuti accessit, & meritis Excellen-  
tissimi praeceptoris tui Cassini: quod te, tum frequen-  
tem in Museo auditorem, tum in suis Astronomicis,  
& Aquaticis laboribus, comitem individuum, & so-  
lertem nactus fuerit adiutorem. Itaque cum tuam  
mibi consuetudinem, varijs hoc anno, quam ante con-  
sueueras, offerres; mandavi, meum tui desiderium,  
tibi significari: ut meorum etiam studiorum particeps  
fieres, & consultor. Gratiam liberaliter fecisti, quam  
volebam: meque domi aliquoties conuenisti, huius-  
ce



sce opusculi partem hanc scriptitantem. Et ex me,  
 tum definitiones precedentium elementorum, & ra-  
 tiones nominum, & propriam cuiusque utilitatem  
 elementi, necnon quasdam nobiliores demonstratio-  
 nes audisti sparsim; tum vel maximè numerosam  
 methodum: qua hyperlogarithmorum, & hypologa-  
 rithmorum, & logarithmorum rationes mihi contigit  
 inuenire. tuque inuenti subtilitatem laudasti, quòd  
 mihi Deus liberaliter tribuit: atque utilitatem trigo-  
 nometricam, ad faciliorem logarithmici canonis con-  
 structionem, optimè prauidisti. Ex laude tua, pluri-  
 mum profecisse me fateor: nam alacrior factus, & ex  
 tecum communicatione vegetior, multarum conclu-  
 sionum, quas prænoui euidentissimis arithmeticis ar-  
 tificijs, quæ mihi supererant demonstranda, media  
 lemmata reperire capi, longè felicius. Libellum  
 igitur hucusque non sine tuo adminiculo perfe-  
 ctum, offero: ut sermones indemonstratos, quos in-  
 uicem habebamus, per te ipsum legendi possis comple-  
 re. Vale. meque, & labores meos, in primis Excel-  
 lentissimo Cassinò, deinde alijs tuis conscholaribus,  
 & amicis, ut commendes, rogo.

GEO.






# GEOMETRIÆ SPECIOSÆ

## ELEMENTVM QVINTVM.

### DEFINITIONES.



1 **D**ifferētia duarum quantitatum, quando prima superat secundam, dicitur, Excessus primæ & secundæ.

2 Quando verò prima superatur à secunda, dicitur, Defectus primæ, & secundæ.

3. Similes differentiæ dicentur, excessus excessibus, & defectus defectibus.

4. Dissimiles verò, excessus defectibus.

5. Quatuor quantitates, dicentur, Arithmeticè dispositæ; cum primæ & secundæ, tertiæ & quartæ, fuerint similes, & æquales differentiæ.

6. Inversio Arithmetica, dicitur; cum quatuor quantitates arithmeticè dispositæ, prima & secunda, tertia & quarta, rursus disponantur arithmeticè, secunda & prima, quarta & tertia.

Cc 2

7. Per-



7. Permutatio Arithmetica, dicetur: cum quatuor quantitates arithmetice dispositæ, prima & secunda, tertia & quarta, rursus disponenter arithmetice, prima & tertia, secunda & quarta.

8. Si fuerint aliquot quantitates, atque aliæ totidem, & fuerint prima & secunda primarum, item prima & secunda secundarum, dispositæ arithmetice; fuerint quoque secunda & tertia primarum, item secunda & tertia secundarum, arithmetice dispositæ; & sic deinceps vsque ad ultimas: dicentur primæ similiter esse dispositæ arithmetice, atque secunde.

9. Quod si prima & vltima primarum, item prima & vltima secundarum, fuerint arithmetice dispositæ; dicentur, ita dispositæ, ex æqualitate arithmetica.

10. Tres quantitates, dicentur, arithmetice ordinate; cum primæ & secundæ, secundæ & tertiæ, similes, & æquales fuerint differentiæ.

11. Plures quantitates, dicentur, arithmetice ordinate; cum ternæ deinceps fuerint arithmetice ordinate: idest, cum primæ & secundæ, secundæ & tertiæ, tertiæ & quartæ, & deinceps vsque ad vltimam, similes, & æquales fuerint differentiæ.

12. Series naturalis arithmetica, dicetur; cuius ordinarum arithmetice quantitarum prima, dimidia est secundæ.

13. Quatuor quantitates, dicentur, Harmonice dispositæ, cum differentia primæ & secundæ, ad similem differentiam



rentiam tertiæ & quartæ, rationem compositam habuerit ex rationibus, primæ ad tertiam, & secundæ ad quartam.

14. Inuersio Harmonica, dicetur; cum quatuor quantitates harmonicè dispositæ, prima & secunda, tertia & quarta, rursus disponentur harmonicè, secunda & prima, quarta & tertia.

15. Permutatio Harmonica, dicetur, cum quatuor quantitates harmonicè dispositæ, prima & secunda, tertia & quarta, rursus disponentur harmonicè, prima & tertia, secunda & quarta.

16. Si fuerint aliquot quantitates, atque aliæ totidem; & fuerint prima & secunda primarum, item prima & secunda secundarum, dispositæ harmonicè; fuerint quoque secunda & tertia primarum, item secunda & tertia secundarum, dispositæ harmonicè; & sic deinceps vsque ad ultimas: dicentur primæ similiter esse dispositæ harmonicè, atque secundæ.

17. Quod si prima & vltima primarum, item prima & vltima secundarum, fuerint harmonicè dispositæ; dicentur, ita dispositæ, ex æqualitate harmonica.

18. Tres quantitates, dicentur, harmonicè ordinate; cum primæ & secundæ differentia, ad similem differentiam secundæ & tertiæ, fuerit sicut prima, quantitas ad tertiam.

19. Plures quantitates dicentur harmonicè ordinate; idest cum primæ & secundæ differentia, ad similem differentiam secundæ & tertiæ, fuerit vt prima ad tertiam; differentia

quo-



quoque secundæ & tertiæ, ad finilem differentiam tertiæ & quartæ, fuerit sicut secunda ad quartam; & sic deinceps usque ad ultimam.

20. Series naturalis harmonica, dicetur, cuius ordinarum harmonicè quantitatum prima, dupla est secundæ.

21. Si à rationali, series harmonica naturalis fuerit ordinata; & à quotoquouis ordinatorum terminorum quocunque fuerint deinceps assumpti, & aggregati: summa, dicetur, Prologarithmus.

22. Porrò prologarithmus, dicetur Hyperlogarithmus earum rationum, quas habent inuicem, primus assumptus terminus, & proximus ulterior ultimo, non assumptus.

23. Et earum rationum Hypologarithmus, dicetur, quas habent inuicem, ultimus assumptus terminus, & proximus prior primo, non assumptus.

24. Quantitas omni minor hyperlogarithmo earumdem rationum, & omni maior hypologarithmo, earumdem Logarithmus, dicetur.

25. Ex totenis deinceps Prologarithmorum series, dicetur: in qua, ex prioribus, dicetur, Primus; ex totidem immediatè sequentibus, Secundus; ex alijs deinceps totidem, Tertius Prologarithmus; & sic deinceps reliqui. Vt prologarithmorum, ex ternis à secundo, dicetur, Primus, qui ex secundo, tertio, & quarto fit collectis; Secundus, qui ex quinto, sexto, & septimo; Tertius, qui ex octauo, nono, & decimo; & ita deinceps.

26. Si



26. Si duo prologarithmi, ex inæqualibus multitudine terminis collecti fuerint; & cuius maior est multitudo terminorum, eius termini singuli, per alteram multitudinem fuerint æqualiter diuisi: siquidem factæ partes ordinatim sumptæ maiorum primùm terminorum, deinde minorum, & collectæ totenæ, quota est sua maior multitudo terminorum, maiores fuerint singulis terminis alterius prologarithmi: maior profectò prologarithmus erit, ex maioribus partibus; & dicetur, Perspectè maior.

27. Si verò factæ partes totenæ, minores fuerint singulis: erit profectò minor prologarithmus, ex minoribus partibus; & dicetur Perspectè minor.

28. Si quatuor proportionalium, rationalis fuerit prima: quarta, dicetur, Productus secundæ & tertiæ. Et significabitur charactere, ex vtrisque secundæ, ac tertiæ characteribus deinceps conscriptis composito. vtpote ad quam, rationalis habet rationem compositam ex rationibus ad tertiam, & ad secundam. Exempli gratiam.  $u$  ad  $a$ , est vt  $b$  ad  $ab$ . Item.  $u$  ad  $ab$ , est vt  $c$  ad  $abc$ .

29. Si verò quatuor proportionalium, rationalis fuerit secunda: quarta, dicetur, Fractio. & significabitur charactere tertiæ, ante characterem primæ scripto, & patrentheses clauso. Exempli gratia  $a$  ad  $u$  est vt  $b$  ad  $b$  ( $a$ ). Item.  $ab$  ad  $u$  est vt  $c$  ad  $c$  ( $ab$ ). Et  $c$  ad  $u$ , est vt  $ab$  ad  $ab$  ( $c$ ).

30. Tertia autem, dicetur; Numerator fractionis: cuius character, scribetur supra lineolam, vt in characterẽ  
fra-



fractionis,  $b$  ( $a$ ), numerator est  $b$ .

31. Et prima, dicetur, Denominator fractionis: cuius character, scribetur infra lineolam. vt in character fractionis  $b$  ( $a$ ), denominator est  $a$ .

32. Numerosa ratio dicetur, cui eandem habet numerus ad numerum.

33. Non numerosa ratio dicetur, cui nulla numerosa est eadem.

34. Non numerosæ rationis logarithmus, dicetur, quantitas, minor omni logarithmo altioris numerosæ rationis, & maior omni logarithmo depressioris.



Theor-



*Theorema prima Propositio prima.*

**S**I trium inæqualium quantitatum, minima, non est minor, quàm secunda potestas differentie extremarum: ipsa differentia extremarum, minor est, ad rationalem, quàm ut minima, ad defectum minimæ, & mediæ.

*Hypoth.*

Sunto tres inæquales quantitates  $a$ ,  $a+b$ ,  $a+b+c$ : & esto  $a$ , non minor, quàm  $b^2+2bc+c^2$ .

Dico  $b+c$ ;  $u$ : minorem esse, quàm  $a$ ;  $b$ .

*Demonst.*

*hypoth.* |  $b^2+2bc+c^2$ : non maior, quàm  $a$ .  
 8. 5. |  $b^2+2bc+c^2$ ;  $b+c$ : non maior, quàm  $a$ ;  $b+c$ .  
 8. p. |  $b^2+2bc+c^2$ ;  $b+c$ :  $b+c$ ;  $u$ .  
 13. 5. |  $b+c$ ;  $u$ : non maior, quàm  $a$ ;  $b+c$ .  
 8. 5. |  $a$ ;  $b+c$ : minor, quàm  $a$ ;  $b$ .  
 13. 5. |  $b+c$ ;  $u$ : minor, quàm  $a$ ;  $b$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 2. Prop. 2.*

**C**Um trium inæqualium numerorum, minimus, non est minor, quàm secunda potestas differentie extremorum; si defectus medij & maximi denominetur à minimo; defectus verò minimi & medij auctus unitate denominetur à maximo: fiunt duæ Fractiones; quarum summa, minor est, quàm differentia extremorum, unitate aucta, denominata à medio.

Dd

Hy-



*Hypoth.*

Sunto tres inæquales numeri  $a$ ,  $a+b$ ,  $a+b+c$ : & esto  $a$ , non minor, quàm  $b^2+2bc+c^2$ .

Dico  $c(a)+b+u(a+b+c)$ : minorem esse, quàm  $b+c+u(a+b)$ .

*Demonstr.*

p. b. |  $b+c$ ;  $u$ : minorest, quàm  $a$ ;  $b$ .

p. 3. |  $b+c+u$ ;  $u$ : minor, quàm  $a+b$ ;  $b$ .

3. 3. |  $b+c+u$ ;  $b+c$ : maior, quàm  $a+b$ ;  $a$ .

Itaque per 19. 7. productus  $b+c$ , per  $a+b$ : minor est quàm productus  $b+c+u$ , per  $a$ .

Additoque communi producto  $a$ , per  $a+b$ . productus  $b+c+a$ , per  $a+b$ : minor, quàm summa productorum  $b+c+u$ , per  $a$ ; &  $a+b$ , per  $a$ .

Et communiter multiplicando per  $c$ . productus  $b+c+a$ , per  $a+b$ , per  $c$ : minor, quàm summa productorum  $b+c+u$ , per  $a$ , per  $c$ ; &  $a+b$ , per  $a$ , per  $c$ .

Additoque communi producto  $a$ , per  $b+u$ , per  $a+b$ . summa productorum  $b+c+a$ , per  $a+b$ , per  $c$ ; &  $a$ , per  $b+u$ , per  $a+b$ : minor, quàm productus  $a$ , per  $a+b+c$ , per  $b+c+u$ .

Et communiter diuidendo, per  $a$ , per  $a+b+c$ , per  $a+b$ .  $c(a)+b+u(a+b+c)$ : minor, quàm  $b+c+u(a+b)$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theo-*



*Theor. 3. Prop. 3.*

**S**I trium inæqualium numerorum, defectus medij & maximi, auctus vnitatis, denominetur à minimo; defectus verò minimi & medij denominetur à maximo: fiunt duæ fractiones; quarum summa est maior, quàm differentia extremorum, vnitatis aucta, denominata à medio.

*Hypoth.*

Sunto tres inæquales numeri,  $a$ ,  $a+b$ ,  $a+b+c$ .

Dico  $c+u$  ( $a$ )+ $b$  ( $a+b+c$ ): maiorem esse, quàm  $b+c+u$  ( $a+b$ ).

*Demonstr.*

Productus  $c+u$ , per  $a+b+c$ , per  $b$ : maior est producto  $a$ , per  $c$ , per  $b$ .

Additoque communi producto  $a$ , per  $b$ , per  $a+b$ . summa productorum  $c+u$ , per  $a+b+c$ , per  $b$ ; &  $a$ , per  $b$ , per  $a+b$ : maior est, quàm productus  $a$ , per  $b$ , per  $a+b+c$ .

Additoque communi producto  $c+u$ , per  $a+b+c$ , per  $a$ . summa productorum  $c+u$ , per  $a+b+c$ , per  $a+b$ ; &  $a$ , per  $b$ , per  $a+b$ : maior est quàm productus  $a$ , per  $b+c+u$ , per  $a+b+c$ .

Et communiter diuidendo, per  $a$ , per  $a+b+c$ , per  $a+b$ .  $c+u$  ( $a$ )+ $b$  ( $a+b+c$ ): maior est, quàm  $b+c+u$  ( $a+b$ ). Quod &c.

Quare &c.



*Theor. 4. Prop. 4.*

**Q**uatuor termini arithmeticè dispositi, permutando, sunt arithmeticè dispositi.

*Hypoth.*

Quatuor termini  $a, a+b, c, c+b$ , sunt arithmeticè dispositi.

Dico permutando  $a, c, a+b, c+b$  esse arithmeticè dispositos.

*Demonstr.*

Siquidem  $a$ , maior est, quàm  $c$ ; tantundem  
 $a+b$ , maior est, quàm  $c+b$ : si minor, minor. Er-  
 go  $a, c, a+b, c+b$ , sunt arithmeticè dispositi.  
 Quod &c. Quare &c.

*Theor. 5. Prop. 5.*

**S**i fuerint aliquot quantitates, in vna serie, similiter arithmeticè dispositæ, atque totidem, in altera: erunt ex æqualitate arithmetica, prima & vltima, in vna serie, item prima & vltima, in altera, dispositæ arithmeticè.

*Hypoth.*

Sint  $a, b, c$ , similiter dispositæ arithmeticè, atque alia totidem  $d, e, f$ .

Dico ex æqualitate arithmetica, esse dispositas arithmeticè,  $a, c$ , &  $d, f$ .

*Demonstr.*

Sunt enim  $a, b, d, e$ , arithmeticè dispositæ:  
 ergo permutando  $a, d, b, e$ , sunt arithmeticè  
 dispositæ: ergo differentia  $a, d$ , differentię  $b, e$ ,  
 similis



similis est, & æqualis. Similiter ostendetur differentia  $b, c$ , differentia  $c, f$ , similis, & æqualis: ergo differentia  $a, d$ , differentia  $c, f$ , similis est, & æqualis: ergo  $a, d, c, f$ , sunt arithmeticè dispositæ: ergo permutando,  $a, c, d, f$ , sunt arithmeticè dispositæ. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 6. Prop. 6.*

**A**rithmeticè dispositarum æquemultiplices, sunt arithmeticè dispositæ.

*Hypoth.*

Sint arithmeticè dispositæ  $a, a+b, c, c+b$ . quorum æquemultiplices  $3a, 3a+3b, 3c, 3c+3b$ .

Dico  $3a, 3a+3b, 3c, 3c+3b$ , esse dispositas arithmeticè.

*Demonstr.*

19. 5. | Differentia  $3a, 3a+3b$ , ad differentiam  $a, a+b$ , æquemultiplex est, atque  $3a$  ad  $a$ : sed  $3a$   
19. 5. | ad  $a$ , æquemultiplex est, atque  $3c$  ad  $c$ : &  $3c$   
ad  $c$ , æquemultiplex: atque  $3c+3b$  ad  $c+b$ : ergo differentia  $3a, 3a+3b$ , ad differentiam  $a, a+b$ , æquemultiplex est, atque differentia  $3c, 3c+3b$  ad differentiam  $c, c+b$ . Sed differentia  $a, a+b$ , æqualis est differentia  $c, c+b$ : ergo differentia  $3a, 3a+3b$ , æqualis est differentia  $3c, 3c+3b$ .

Rur-



17. 7. | Rursum differentia  $3a, 3a+3b$ , similis est dif-  
 def. 5. h. | ferentia  $a, a+b$ : & differentia  $a, a+b$  similis dif-  
 17. 7. | ferentia  $c, c+b$ : & differentia  $c, c+b$  similis dif-  
 | ferentia  $3c, 3c+3b$ : Ergo differentia  $3a, 3a$   
 |  $+3b$ , similis est, & æqualis differentiæ  $3c, 3c+3b$ :  
 def. 5. h. | Ergo  $3a, 3a+3b, 3c, 3c+3b$ , sunt arithmetice  
 | dispositæ. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 7. Prop. 7.*

**I**N serie arithmetica naturali, aliquoteni ab vno, & ali-  
 quoteni ab altero, per numeros alterutrorum multitu-  
 dinis terminorum multiplicati; sicut primi producti, simi-  
 liter secundi, sunt arithmetice dispositi: item tertij, & quar-  
 ti, & sic deinceps.

*Hypoth.*

$a, a+1, a+2.$        $a+3, a+4, a+5.$   
 $b, b+1, b+2, b+3.$        $b+4, b+5, b+6, b+7.$   
 $4a, 4a+4, 4a+8.$        $4a+12, 4a+16, 4a+20.$   
 $3b, 3b+3, 3b+6, 3b+9.$        $3b+12, 3b+15, 3b+18, 3b+21,$

Sint in serie arithmetica naturali duo termini,  $a, b$ : &  
 sint ab  $a$ , terni; & ternorum primi  $a, a+1, a+2$ ; secun-  
 di  $a+3, a+4, a+5$ : & à  $b$ , sint quaterni; & quaternorum  
 primi  $b, b+1, b+2, b+3$ ; secundi,  $b+4, b+5, b+6, b+7$ .

Quoniam in serie arithmetica naturali proximorum  
 differentia, sunt vnitates: ergo alternorum, sunt binarij;  
 tertiorum, ternarij; quatorum, quaternarij; & sic deinceps.



ceps. Sunt autem primus primorum ex ternis, & primus secundorum, ab inuicem tertij: & primus primorum ex quaternis, & primus secundorum, ab inuicem quarti: ergo differentia  $a, a+3$ , est ternarius 3; & differentia  $b, b+4$ , & quaternarius 4. Multiplicentur itaque terni, per 4: & quaterni, per 3: & fiant multiplices terni, & quaterni primi; item terni, & quaterni secundi.

Dico multiplices primorum  $4a+8, 4a+4, 4a, 3b, 3b+3, 3b+6, 3b+9$ , esse similiter arithmetice dispositos, atque secundorum,  $4a+20, 4a+16, 4a+12, 3b+12, 3b+15, 3b+18, 3b+21$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* Terminum  $a+2, a+1, a$ , sunt deinceps in serie arithmetica naturali, in qua sunt etiam termini  $a+5, a+4, a+3$ . Ergo  $a+2, a+1, a$ , sunt similiter arithmetice ordinati, atque  $a+5, a+4, a+3$ : & eorum æquemultiplices  $4a+8, 4a+4, 4a$ , atque  $4a+20, 4a+16, 4a+12$ .  
*def 6. b.*  
*6. b.* Defectus simplicium  $a, a+3$ , est ternarius: ergo earundem quadruplicium defectus  $4a, 4a+12$ , est productus 3, per 4. Item defectus simplicium  $b, b+4$ , est quaternarius: ergo earundem triplicium defectus  $3b, 3b+12$ , est productus 4 per 3. Sed productus 3 per 4, est æqualis producto per 3. ergo defectus  $4a, 4a+12$ , æqualis est defectui  $3b, 3b+12$ . Ergo  $4a, 4a+12, 3b, 3b+12$ , sunt arithmetice

cè



$a, a+1, a+2.$        $a+3, a+4, a+5.$   
 $b, b+1, b+2, b+3.$        $b+4, b+5, b+6, b+7.$   
 $4a, 4a+4, 4a+8.$        $4a+12, 4a+16, 4a+20.$   
 $3b, 3b+3, 3b+6, 3b+9.$        $3b+12, 3b+15, 3b+18, 3b+21.$

4. *b.* | cè dispositi. Ergo permutando  $4a, 3b, 4a+12,$   
 5. *b.* |  $3b+12,$  sunt arithmeticè dispositi. Ergo ex æqua-  
 def. 8. *b.* | litate arithmetica,  $4a+8, 4a+4, 4a, 3b,$  sunt si-  
 | militer arithmeticè dispositi, atque  $4a+20, 4a$   
 |  $+16, 4a+12, 3b+12.$

Ostendetur autem similiter vt supra, quod  $3b,$   
 $3b+3, 3b+6, 3b+9,$  sunt similiter arithmeti-  
 cè dispositi, atque  $3b+12, 3b+15, 3b+18,$   
 5. *b.* |  $3b+21.$  Ergo ex æqualitate arithmetica  $4a+8,$   
 def. 8. *b.* |  $4a+4, 4a, 3b, 3b+3, 3b+6, 3b+9,$  sunt si-  
 | militer arithmeticè dispositi, atque  $4a+20, 4a$   
 |  $+16, 4a+12, 3b+12, 3b+15, 3b+18, 3b$   
 |  $+21.$  Quod &c.

Quare primi terni ab  $a,$  & quaterni à  $b,$  sunt similiter  
 arithmeticè dispositi, atque secundi. Et eadem demon-  
 stratione ostendemus, tum secundos, tum primos, esse si-  
 militer arithmeticè dispositos, atque tertios, & atque quar-  
 tos, & sic deinceps.

Theor. 8. Prop. 8.

**P**rodukti, compositam habent rationem producen-  
 tium.

Hy-



*Hypoth.*

Esto quantitatū  $a, b$ , productus  $ab$ ; & quantitatū  $c, d$ , productus  $cd$ .

Dico  $ab; cd: a; c, +b; d$ .

*Demonstr.*

def. 28b |  $ab; u: a; u, +b; u$ .

def. 28b |  $u; cd: u; c, +u; d$ .

p. p. |  $ab; cd: a; c, +b; d$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 9. Prop. 9.*

**P**roducti communem habentes producentem, sunt ut producentes non communes.

*Hypoth.*

Esto quantitatū  $a, b$ , productus  $ab$ ; & quantitatū  $a, c$ , productus  $ac$ .

Dico  $ab; ac: b; c$ .

*Demonstr.*

8. h. |  $ab; ac: b; a, +a; c$ .

def. 5. 6. |  $b; a, +a; c: b; c$ .

p. p. |  $ab; ac: b; c$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 10. Propos. 10.*

**F**ractiones eundem habentes denominatorem, sunt inter se, ut numeratores.

E e Hy-



*Hypoth.*

Fractionum communis denominator esto  $a$ : sunt numeratores  $b, c$ .

Dico  $b(a); c(a): b; c$ .

*Demonstr.*

def. 29h |  $a; u: b; b(a)$ .

def. 29h |  $a; u: c; c(a)$ ,

11. 5. |  $b; b(a): c; c(a)$ .

2. p. |  $b(a); c(a): b; c$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 11. Prop. 11.*

**Q**uatuor proportionalium quarta est fractio, in qua numerator est productus secundæ & tertiæ, denominator est prima.

*Hypoth.*

Sunt proportionales prima  $a$ , secunda  $b$ , tertia  $c$ .

Dico  $a; b: c; cb(a)$ .

*Demonstr.*

def. 29h |  $a; u: c; c(a)$ .

def. 28h |  $u; b: c; cb$

10. h. |  $c; cb: c(a); cb(a)$ .

11. 5. |  $u; b: c(a); cb(a)$ .

p. p. |  $a; b: c; cb(a)$ . Quod &c. Quare &c.

*Theor. 12. Prop. 12.*

**F**ractiones, quarum numeratores æquales, reciprocè sunt, ut denominatores.

*Hy-*



*Hypoth.*

Esto fractionum numerator communis  $a$ : & sunt denominatores  $b, c$ .

Dico  $b; c: a (c); a (b)$ .

*Demonstr.*

def. 29b |  $b; u: a; a (b)$ .

def. 29b |  $c; u: a; a (c)$ .

def. 6.5. |  $u; c: a (c); a$ .

p. p. |  $b; c: a (c); a (b)$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 13. Prop. 13.*

**D**Vorum productorum, quorum producentes partim communes, partim sunt non communes, primo alterum denominante, fit eadem fractio; quæ, non communium producentium, primo alterum denominante.

*Hypoth.*

Sunto producti  $a b c, d b c$ : quorum communis produciens,  $b c$ ; non communes,  $a, d$ . Et denominante  $a b c$ , numeratorem  $d b c$ ; necnon denominante  $a$ , numeratorem  $b$ , fiant fractiones  $d b c (a b c), d (a)$ .

Dico  $d b c (a b c): d (a)$ .

*Demonstr.*

def. 29b |  $a b c; u: d b c; d b c (a b c)$ .

2. p. |  $a b c; d b c: u; d b c (a b c)$ .

9. h. |  $a; d: a b c; d b c$ .

11. 5. |  $a; d: u; d b c (a b c)$ .

Ec 2

$a; u:$



2. p. |  $a; u: d; dbc (abc).$

def: 29h |  $a; u: d; d (a).$

9. 5. |  $dbc (abc): d (a).$  Quod &c.

Quare &c.

Theor. 13. Prop. 13.

**F**Ractiones, quarum numeratores æquales, & denominatores arithmetice dispositi, sunt harmonice dispositæ.

*Hypoth.*

Esto quatuor fractionum numerator communis  $a$ , & sunt denominatores arithmetice dispositi  $b, c, d, e$ .

Dico  $a (b), a (c), a (d), a (e)$  esse harmonice dispositas.

*Demonstr.*

12. h. | Si differentia  $b, c$ , est defectus: ergo reciproce differentia  $a (b), a (c)$ , est excessus: & est differentia  $d, e$ , defectus: & reciproce differentia  $a (d), a (e)$  est excessus. Quod si differentia  $b, c$ , est excessus: etiam differentia  $d, e$ , est excessus: & differentia  $a (b), a (c)$ , reciproce est defectus: necnon differentia  $a (d), a (e)$ , est defectus. Quare fractionum  $a (b), a (c)$ , &  $a (d), a (e)$ , similes sunt differentie. Esto differentia  $b, c$ , defectus. Ergo differentia  $a (b), a (c)$  est excessus: item differentia  $a (d), a (e)$ .

hypoth. |  $c - b: e - d.$

pro-



- producendo per  $ade$ , &  $abc$ .
9. *b.*  $acde - abde; abce - abcd: ade; abc: de; bc.$   
denominando communiter per  $bcd$ .
13. *b.*  $a(b) --- a(c); a(d) --- a(e): de; bc.$
8. *b.*  $de; bc: d; b, +e; c.$
12. *b.*  $d; b: a(b); a(d).$
12. *b.*  $e; c: a(c); a(e).$
- p. p.*  $de; bc: a(b); a(d), +a(c); a(e).$
11. 5.  $a(b) --- a(c); a(d) --- a(e): a(b); a(d),$   
 $+a(c); a(e).$
- def. 13. b.*  $a(b), a(c), a(d), a(e)$  sunt harmonicè dis-  
positæ. Quod &c.
- Similiter ostendetur, si differentia  $b, c$ , est ex-  
cessus.

Quare &c.

*Theor. 15. Prop. 15.*

**F**ractiones, quarum numeratores æquales, & denomi-  
natores, arithmeticè ordinati, sunt harmonicæ or-  
dinatæ.

*Hypoth.*

Esto fractionum numerator communis  $a$ : & sunt de-  
nominatores arithmeticè ordinati,  $b, c, d, e$ .

Dico  $a(b), a(c), a(d), a(e)$  esse harmonicè or-  
dinatas.

*Demonstr.*

*hypoth.*  $b, c, d$ , sunt arithmeticè ordinati.

$b, c,$



def. 5. b. |  $b, c, c, d$ , sunt arithmeticè dispositi.

14. b. |  $a(b), a(c), a(c), a(d)$ , sunt harmonicè dispositæ.

def. 13 b. | Differentia  $a(b), a(c)$ , ad similem differentiam  $a(c), a(d)$ , rationem habet compositam ex rationibus,  $a(b)$  ad  $a(c)$ , &  $a(c)$  ad  $a(d)$ : idest eandem, quàm habet  $a(b)$  ad  $a(d)$ .

def. 18 b. |  $a(b), a(c), a(d)$ , sunt harmonicè ordinatæ.

sup. |  $a(c), a(d), a(e)$ , sunt harmonicè ordinatæ.

def. 12 b. |  $a(b), a(c), a(d), a(e)$ , sunt harmonicè ordinatæ. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 16. Prop. 16.

**S**I aliquot fractiones, aliæque totidem, communem habentes numeratorem, denominatores habuerint similiter arithmeticè dispositos, erunt & ipsæ similiter harmonicè dispositæ.

Hypoth.

Sunto tres fractiones, aliæque tres, quarum communis numerator  $a$ : sint autem denominatores  $b, c, d$ , similiter arithmeticè dispositi, atque denominatores  $e, f, g$ .

Dico  $a(b), a(c), a(d)$ , similiter harmonicè dispositas esse, atque  $a(e), a(f), a(g)$ .

Demonstr.

hypoth. |  $b, c, d$ , sunt similiter arithmeticè dispositi, atque  $e, f, g$ .

$b, c, e,$



def. 8. b. |  $b, c, e, f$ , sunt arithmeticè dispositi.  
 |  $c, d, f, g$ , sunt arithmeticè dispositi.  
 14. b. |  $a (b), a (c), a (e), a (f)$ , sunt harmonicè dispositæ.  
 |  $a (c), a (d), a (f), a (g)$ , sunt harmonicè dispositæ.  
 def. 16 b |  $a (b), a (c), a (d)$ , sunt similiter harmonicè dispositæ, atque  $a (e), a (f), a (g)$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 17. Prop. 17.*

**I**N serie arithmetica, non maior, quàm dimidius termini proximi, non est medius.

*Hypoth.*

Sunto in serie arithmetica, tres termini  $a, b, c$ .

Dico  $b$ , maiorem esse, quàm dimidium, ad  $c$ .

*Demonstr.*

def. 10. | Esto  $b$ , non maior, quàm dimidius ad  $c$ , si potest: eritque  $b$ , equalis, vel minor, quàm dimidius ad  $c$ : eritque differentia  $b, c$ , defectus: cuius similis differentia  $u, b$ , erit defectus.  
 hypoth. |  $b, c$ : non maior, quàm dimidius.  
 19. 7. |  $2b$ : non maior, quàm  $c$ .  
 |  $b$ : non maior, quàm  $c - b$ .  
 def. 10. b. |  $c - b$ :  $b - a$ .  
 |  $b$ : non maior, quàm  $b - a$ .  
 |  $b + a$ : non maior, quàm  $b$ . quod est absurdum.  
 b non



$b$  non est dimidiatus ad  $c$ . Quod &c.  
Quare &c.

*Theor. 18. Prop. 18.*

**I**N serie harmonica, terminus non minor, quàm duplus termini proximi, non est medius.

*Hypoth.*

Sunto in serie harmonica tres termini  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .

Dico  $b$ , minorem esse, quàm duplum, ad  $c$ .

*Demonstr.*

*def. 18. b* | Esto  $b$ , non minor, quàm duplus ad  $c$ , si potest. eritque differentia  $b$ ,  $c$ , excessus: item differentia  $a$ ,  $b$ , erit excessus.

*def. 18. b* |  $a$  ---  $b$ ;  $b$  ---  $c$ :  $a$ ;  $c$ .

*hypoth.* |  $b$ ;  $c$ : non minor, quàm duplus.

19. 7. |  $b$ : non minor, quàm  $2c$ .

|  $b$  ---  $c$ : non minor, quàm  $c$ .

14. 5. |  $a$  ---  $b$ : non minor, quàm  $a$ . Quod est absurdum.

|  $b$ , minor est, quàm duplus ad  $c$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 19. Prop. 19.*

**Q**uælibet quantitas, & omnes eius multiplices ordinatæ, sunt in serie arithmetica naturali.

*Hypoth.*

Esto quantitas  $u$ , cuius multiplices ordinatæ  $2u$ ,  $3u$ ,  $4u$ , &  $c$ .

Dico



Dico  $u$ ,  $2u$ ,  $3u$ ,  $4u$ , & c. esse in serie arithmetica naturali.

*Demonstr.*

*hypoth.* | Omnes differentiae  $u$ ,  $2u$ , &  $2u$ ,  $3u$ , &  $3u$ ,  
*def. 12. b* |  $4u$ , & reliquae, sunt similes, & aequales ipsi ratio-  
 | nali  $u$ : & est  $u$  ad  $2u$  dimidia. Ergo  $u$ ,  $2u$ ,  $3u$ ,  
 |  $4u$ , & c. sunt in serie arithmetica naturali.  
 | Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 20. Prop. 20.*

**Q**uaelibet quantitas, & omnes eius submultiplices ordinatae, sunt in serie harmonica naturali.

*Hypoth.*

Esto quantitas  $u$ , cuius submultiplices  $u$  (2),  $u$  (3),  $u$  (4), &c.

Dico  $u$ ,  $u$  (2),  $u$  (3),  $u$  (4), &c. esse in serie harmonica naturali.

*Demonstr.*

*19. b.* |  $u$ , 2, 3, 4, &c. sunt in serie arithmetica.  
*15. b.* |  $u$ ,  $u$  (2),  $u$  (3),  $u$  (4), &c. sunt in serie har-  
 | monica.  
*hypoth.* |  $u$ ;  $u$  (2): est dupla.  
*def. 20 h* |  $u$ ,  $u$  (2),  $u$  (3),  $u$  (4), &c. sunt in serie har-  
 | monica naturali. Quod &c.

Quare &c.

Ff

Theo-



*Theor. 21. Prop. 21.*

**I**N duabus seriebus arithmeticiis naturalibus, termini sunt similiter proportionales, in proportionem ordinata.

*Hypoth.*

Sint duæ series arithmeticae naturales: una  $a, 2a, 3a, 4a, \&c.$  altera  $b, 2b, 3b, 4b, \&c.$

Dico  $a, 2a, 3a, 4a$ , esse similiter proportionales atque  $b, 2b, 3b, 4b$ , in proportionem ordinata.

*Demonstr.*

def.11.b. Defectus deinceps  $a, 2a, 3a, 4a$ , sunt æquales inter se, & ipsi primo termino  $a$ . item defectus deinceps  $b, 2b, 3b, 4b$ , sunt æquales inter se, & ipsi  $b$ .

def.12.b  $a; 2a: b; 2b.$

2. p.  $2a; 3a: 2b; 3b:$

2. p.  $3a; 4a: 3b; 4b.$

def.18.5  $a, 2a, 3a, 4a$ , sunt similiter proportionales, atque  $b, 2b, 3b, 4b$ , in proportionem ordinata. Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 22. Prop. 22.*

**I**N duabus seriebus harmonicis naturalibus, termini sunt similiter proportionales, in proportionem ordinata.

*Hypoth.*

Sint duæ series harmonicae naturales: una,  $a, a(2), a(3), a(4)$ : altera  $b, b(2), b(3), b(4)$ .

Dico



Dico  $a, a(2), a(3), a(4)$ , esse similiter proportionales, atque  $b, b(2), b(3), b(4)$ , in proportione ordinata.

*Demonstr.*

def. 20b  $a; a(2): b; b(2)$ .  
 2. p.  $a, -- a(2); a(2): b, --- b(2); b(2)$ .  
 Esto, si potest,  $a(2); a(3):$  maior, quàm  $b(2); b(3)$ .  
 4. 3.  $a(2); a(2) --- a(3):$  minor, quàm  $b(2); b(2) --- b(3)$ .  
 p. 3.  $a, --- a(2); a(2) --- a(3):$  minor quàm  $b, --- b(2); b(2) --- b(3)$ .  
 def. 18b  $a, --- a(2); a(2) --- a(3): a; a(3)$ .  
 def. 18b  $b, --- b(2); b(2) --- b(3): b; b(3)$ .  
 p. 3.  $a; a(3):$  minor, quàm  $b; b(3)$ .  
 def. 20b  $a(2); a: b(2); b$ .  
 p. 3.  $a(2); a(3):$  minor, quàm  $b(2); b(3)$ . contra suppositum.  
 $a(2); a(3): b(2); b(3)$ .  
 sup.  $a(3); a(4): b(3); b(4)$ .  
 def. 18.5  $a, a(2), a(3), a(4)$  sunt similiter proportionales, atque  $b, b(2), b(3), b(4)$  in proportione ordinata. Quod &c. Quare &c.

*Theor. 23. Prop. 23.*

**D**Varum serierum naturalium arithmetice, & harmonicè, inter æqueordinatos terminos, medij proportion-

Ff 2

por-



portionales sunt æquales.

*Hypoth.*

Sint duæ series naturales: vna arithmetica, ab  $a$ ; altera harmonica, à  $b$ . & sint quarti termini; in arithmetica,  $4a$ ; in harmonica,  $b(4)$ . sit autem inter  $a$ ,  $b$ , media proportionalis  $c$ .

Dico  $c$ , mediam proportionalem esse, inter  $4a$ , &  $b(4)$ .

*Demonstr.*

Quoniam  $4a$ ,  $b(4)$ , sunt quarti termini, in  
 19.  $b$ . | suis seriebus:  $4a$  ad  $a$ , est quadruplus: &  $b(4)$  ad  
 20.  $b$ . |  $b$  subquadruplus.

$4a$ ;  $a$ ;  $b$ ;  $b(4)$ .

*hypoth.* |  $a$ ;  $c$ ;  $c$ ;  $b$ .

*p. p.* |  $4a$ ;  $c$ ;  $c$ ;  $b(4)$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 24. Prop. 24.*

**I**N serie arithmetica duo termini, cum æqueordinatis in harmonica, sunt reciproce proportionales.

*Hypoth.*

Sint in serie arithmetica duo termini  $3a$ ,  $4a$ : & in harmonica duo æqueordinati  $b(3)$ ,  $b(4)$ .

Dico  $3a$ ;  $4a$ :  $b(4)$ ;  $b(3)$ .

*Prepar.*

Assumatur inter æqueordinatos  $3a$ , &  $b(3)$ , medius proportionalis  $c$ .

*De-*



*Demonstr.*

*constr.* | 3a; c; b (3).  
 23. b. | 4a; c; b (4).  
 2. p. | c; 4a; b (4); c.  
 p. p. | 3a; 4a; b (4); b (3). Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 25. Prop. 25.*

**S**eries naturales, arithmetica, & harmonica, plures terminos habent, quàm quot quisque dixerit, & cuiusque numerosæ rationis.

*Demonstr.*

20. 9. | Nam numeri plures sunt, quàm quot quisque  
 19. b. | dixerit, secundum quos accepti multiplices ad  
 20. b. | primum terminum in serie arithmetica, & submultiplices ad primum in harmonica, sunt plures termini, quàm quot quisque dixerit.

21. b. | Quod si multiplices accepti fuerint, secundum  
 numeros numerosæ rationis: erunt in arithmetica serie termini, eandem numerosam habentes rationem. item si accepti fuerint submultiplices:  
 24. b. | erunt in harmonica, termini, eandem reciprocè numerosam habentes rationem.

20. 9. | Deinde numeri bini, eandem numerosam habentes rationem, minimi omnium, & minimorum æquemultiplices numeri, secundum plures, quàm quot quisque dixerit numeros, possunt accipi: se-  
 cun-



*sup.* | cundum quos acceptos binos numeros, termini  
multiplices in arithmetica, & submultiplices in  
harmonica, possunt accipi bini plures, quàm quot  
quisque dixerit, eandem numerosam habentes  
rationem.

Quare &c.

*Theor. 26. Prop. 26.*

**I**N serie arithmetica naturali ab vnitatem, termini sunt,  
vnitas, & omnes numeri ordinatim accepti,

*Demonstr.*

*19. h.* | Nam in serie arithmetica naturali ab vnitatem,  
omnes termini sunt, ipsa vnitas, & omnes mul-  
tiplices ad vnitatem, ordinatim accepti: sed nu-  
meri sunt multiplices ad vnitatem; & eorum ordo,  
est idem multiplicium. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 27. Prop. 27.*

**I**N serie harmonica naturali à rationali, termini sunt, ipsa  
rationalis, & fractiones, pro communi numeratore,  
habentes rationalem, & pro denominatoribus, habentes  
ordinatim omnes numeros.

*Demonstr.*

*20. h.* | Nam in serie harmonica naturali à rationali,  
termini sunt, ipsa rationalis, & omnes eius sub-  
*def. 29b* | multiplices ordinatim accepti. Sed fractiones,  
in



in quibus ipsa rationalis est numerator communis, & omnes numeri sunt denominatores, ipsæ sunt submultiplices ad rationalem; & earum ordo, est idem ordo numerorum, per quos ipsæ submultiplices ordinantur. Ergo &c,  
Quare &c.

*Theor. 28. Prop. 28.*

**S**I fuerint duæ series totidem terminorum; & inter primos, idem fuerit medius proportionalis, qui inter secundos, inter tertios, & deinceps inter æqueordinatos: siquidem in prima serie, sunt quatuor arithmeticè dispositi; in secunda serie, sunt quatuor harmonicè dispositi.

*Hypoth.*

Sint in prima serie, quatuor arithmeticè ordinati,  $a, a+b, c, c+b$ : sit medius  $d$ : & sint in altera serie ordinati  $d_2(a), d_2(a+b), d_2(c), d_2(c+b)$ .

Dico  $d_2(a), d_2(a+b), d_2(c), d_2(c+b)$  esse harmonicè dispositos.

*Demonstr.*

*hypoth.* | Quoniam  $a$  ad  $d$ , est vt  $d$  ad  $d_2(a)$ ; idest quatuor proportionalium prima quantitas  
11. b. | est  $a$ , secunda & tertia est  $d$ : ergo quarta est fractio, cuius numerator, secunda potestas  $d$ ; denominator, prima quantitas  $a$ . Similiter ostendetur quod  $d_2(a+b)$ , est secunda potestas  $d$ , denominata per  $a+b$ : &  $d_2(c)$ , secunda potestas  $d$ , denominata per  $c$ : & denique  $d_2(c+b)$ ,



$(c+b)$ , secunda potestas  $d$ , denominata per  $c+b$ :  
 Ergo  $d^2(a)$ ,  $d^2(a+b)$ ,  $d^2(c)$ ,  $d^2(c+b)$ , sunt  
 quatuor fractiones: quarum numerator commu-  
 nis, secunda potestas  $d$ ; denominatores verò,  
 sunt quatuor arithmeticè dispositi,  $a$ ,  $a+b$ ,  $c$ ,  $c$   
 $+d$ . Ergo  $d^2(a)$ ,  $d^2(a+b)$ ,  $d^2(c)$ ,  $d^2(c+b)$ ,  
 sunt harmonicè dispositæ. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 29. Propos. 29.*

**Q**Vorum productorum quidam sunt communes, qui-  
 dam non communes producentes, aggregatum, est  
 productus producentium communium, & aggrega-  
 ti producentium non communium.

*Hypoth.*

Duorum productorum  $ab$ ,  $ac$ , communis produ-  
 cens esto  $a$ : non communes sunt  $b$ ,  $c$ ; quorum sum-  
 ma  $d$ .

Dico  $ab+ac: ad$ .

*Demonstr.*

|         |  |                                  |
|---------|--|----------------------------------|
| 9. b.   |  | $ab$ ; $ac: b; c$ .              |
| 2. p.   |  | $ab+ac$ ; $ac: b+c; c$ .         |
| hypoth. |  | $b+c: d$ .                       |
| 7. 5.   |  | $ab+ac$ ; $ac: d; c$ .           |
| 9. b.   |  | $ad$ ; $ac: d; c$ .              |
| 11. 5.  |  | $ab+ac$ ; $ac: ad; ac$ .         |
| 9. 5.   |  | $ab+ac: ad$ . Quod &c. Quare &c. |



Theor. 30. Prop. 30.

**Q**Vorum productorum quidam sunt communes, quidam non communes, & inæquales producentes, differentia, est productus producentis communis, & differentia producentium non communium.

*Hypoth.*

Duorum productorum  $ab$ ,  $ac$ , communis producens esto  $a$ , non communes sunt  $b$ ,  $c$ : & esto  $b$  maior, quàm  $c$ ; quorum differentia  $d$ .

Dico  $ab --- ac: ad$ .

*Demonstr.*

- |         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 9. h.   | $ab; ac: b; c$ .              |
| 2. p.   | $ab --- ac; ac: b --- c; c$ . |
| hypoth. | $b --- c: d$ .                |
| 7. 5.   | $ab --- ac; ac: d; c$ .       |
| 9. h.   | $ad; ac: d; c$ .              |
| 11. 5.  | $ab --- ac: ad$ . Quod &c.    |

Quare &c.

Theor. 31. Prop. 31.

**Q**Vatuor proportionalium productus extremorum, est æqualis producto mediorum.

*Hypoth.*

Sunto proportionales  $a; b: c; d$ .

Dico  $ad: bc$ .

*Prepar.*

Assumatur productus alternorum  $ac$ .

Gg

De-



*Demonstr.*

9. b. | ac; ad: c; d.  
 9. b. | ac; bc: a; b.  
 hypoth. | a; b: c; d.  
 11. 5. | ac; ad: ac; bc.  
 9. 5. | ad: bc. Quod &c.  
 Quare &c.

---

*Theor. 32. Prop. 32.*

**Q**uatuor termini, quorum extremorum productus est æqualis producto mediorum, sunt proportionales.

*Hypoth.*

Quatuor terminorum *a, b, c, d*, productus extremorum *ad*, & productus mediorum *bc*, sunt æquales.

Dico *a; b: c; d*.

*Prepar.*

Assumatur productus alternorum *ac*.

*Demonstr.*

7. 5. | ac; bc: ac; ad.  
 9. b. | ac; bc: a; b.  
 9. b. | ac; ad: c; d.  
 11. 5. | a; b: c; d. Quod &c.  
 Quare &c.

---

*Theor. 33. Prop. 33.*

**S**I fuerint duæ series totidem terminorum; & inter primos idem fuerit medius proportionalis, qui inter secundum



cundos, inter tertios, & deinceps inter æqueordinatos : si-  
quidem in prima serie, sunt quatuor harmonicè dispositi;  
in secunda serie, sunt quatuor arithmeticè dispositi.

*Hypoth.*

Sint in prima serie quatuor harmonicè ordinati  $a, b, c,$   
 $d$ : & sit medius  $e$ : & sint in altera serie ordinati  $e_2(a), e_2-$   
 $(b), e_2(c), e_2(d)$ .

Dico  $e_2(a), e_2(b), e_2(c), e_2(d)$ , esse arithmeticè  
dispositos.

*Demonstr.*

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| def. 13. h.  | $a --- b; c --- d: a; c, +b; d.$                                           |
| 8. h.        | $ab; cd: a; c, +b; d.$                                                     |
| 11. 5.       | $a --- b; c --- d: ab; cd.$                                                |
| 30. &        | $acd --- bcd: abc --- abd.$                                                |
| 31. h.       | adhibito communi producente $e_2$ .                                        |
| 9. h.        | $e_2acd --- e_2bcd: e_2abc --- e_2abd.$                                    |
|              | communiter denominando per $abcd$ .                                        |
| 10. & 13. h. | $e_2(b) --- e_2(a): e_2(d) --- e_2(c).$                                    |
| def. 5. h.   | $e_2(a), e_2(b), e_2(c), e_2(d)$ , sunt arithmeticè<br>dispositi. Quod &c. |

Quare &c.

*Theor. 34. Prop. 34.*

**Q**uatuor termini harmonicè dispositi, permutando,  
sunt harmonicè dispositi.

*Hypoth.*

Sint quatuor termini  $a, b, c, d$ , harmonicè dispositi.

G g 2

Dico



Dico permutando  $a, c, b, d$  esse harmonicè dispositos.

*Prepar.*

Assumatur quaelibet quantitas  $e$ , & fiat

$a; e; e; f.$

$b; e; e; g.$

$c; e; e; h.$

$d; e; e; l.$

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $a, b, c, d$  sunt harmonicè dispositi.

33. *b.* |  $f, g, h, l$  sunt arithmeticè dispositi.

4. *b.* |  $f, h, g, l$  sunt arithmeticè dispositi.

28. *b.* |  $a, c, b, d$  sunt harmonicè dispositi. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 35. Prop. 35.*

**S**I fuerint aliquot quantitates in una serie, similiter harmonicè dispositæ, atque aliæ totidem, in altera: erunt ex æqualitate harmonica, prima & vltima, in vna serie, item prima & vltima, in altera, dispositæ harmonicè.

*Hypoth.*

Sint  $a, b, c$  similiter harmonicè dispositæ, atque aliæ totidem  $d, e, f.$

Dico ex æqualitate harmonica, esse dispositas harmonicè,  $a, c$ , &  $d, f.$

*Prepar.*

Assumatur quaelibet quantitas  $g$ . & fiat

$a; g$



$a; g; g; h$

$b; g; g; k$

$c; g; g; l$

$d; g; g; m$

$e; g; g; n$

$f; g; g; o$

*Demonstr.*

*def. 16h* |  $a, b, d, e$  sunt harmonicè dispositæ.

*33. b.* |  $h, k, m, n$  sunt arithmeticè dispositæ.

*def. 16h* |  $b, c, e, f$  sunt harmonicè dispositæ.

*33. b.* |  $k, l, n, o$  sunt arithmeticè dispositæ.

*def. 8. b.* |  $h, k, l$  sunt similiter arithmeticè dispositæ, atque  $m, n, o$ .

*3. b.* |  $h, l, m, o$  sunt arithmeticè dispositæ.

*28. b.* |  $a, c, d, f$  sunt harmonicè dispositæ. Quod &c.  
Quare &c.

*Theor. 36. Prop. 36.*

**H** Armonicè dispositarum æquesubmultiplices, sunt harmonicè dispositæ.

*Hypoth.*

Sint harmonicè dispositæ  $a, b, c, d$ : quarum æquesubmultiplices  $a(3), b(3), c(3), d(3)$ .

Dico  $a(3), b(3), c(3), d(3)$  esse harmonicè dispositas.

*Prepar.*

Assumatur quælibet quantitas  $e$ . & fiat

$a; e$



$a; e; e; f$

$b; e; e; g$

$c; e; e; h$

$d; e; e; l$

Et quotuplices sunt  $a, b, c, d$  ad  $a(3), b(3), c(3), d(3)$ , totuplices accipiantur ipsarum  $f, g, h, l$ , quæ sint  $3f, 3g, 3h, 3l$ .

*Demonstr.*

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| hypoth. | $a, b, c, d$ , sunt harmonicè dispositæ,                    |
| 33. b.  | $f, g, h, l$ , sunt arithmeticè dispositæ.                  |
| 6. h.   | $3f, 3g, 3h, 3l$ , sunt arithmeticè dispositæ.              |
| prepar. | $a(3); a: f; 3f$ .                                          |
| prepar. | $a; e; e; f$ .                                              |
| p. p.   | $a(3); e: e; 3f$ .                                          |
| sup.    | $b(3); e: e; 3g$ .                                          |
| sup.    | $c(3); e: e; 3h$ .                                          |
| sup.    | $d(3); e: e; 3l$ .                                          |
| 28. h.  | $a(3), b(3), c(3), d(3)$ sunt harmonicè dispositæ. Quod &c. |

Quare &c.

*Theor. 37. Prop. 37.*

**S**I fuerint aliquot primæ quæritates, arithmeticè similiter dispositæ, atque aliæ totidem secundæ, utræque in vna serie: fuerint autem & aliæ totidem quantitates primæ, aliæque totidem secundæ in altera: & fuerit vna eadem quantitas media proportionalis inter primas primarum, & in-



& inter secundas primarum, & deinceps inter æqueordinatas; item inter primas secundarum, & inter secundas, & deinceps inter æqueordinatas: erunt in secunda serie primæ similiter harmonicè ordinatæ, atque secundæ.

*Demonstr.*

Quoniam enim primarum in prima serie prima, & secunda; & secundarum in prima serie prima, & secunda, sunt arithmeticè dispositæ: constat, quod etiam in secunda serie primarum prima, & secunda; & secundarum prima, & secunda, sunt harmonicè dispositæ. constat similiter, quod in secunda serie, primarum secunda, & tertia; & secundarum secunda, & tertia sunt harmonicè dispositæ. Et ita deinceps vsque ad ultimas primarum, & secundarum. Quare primæ in secunda serie, sunt similiter harmonicè ordinatæ, atque secunda.

*Theor. 38. Prop. 38.*

**S**I fuerint aliquot primæ quantitates harmonicè similiter dispositæ, atque aliæ totidem secundæ, utræque in vna serie: fuerint autem & aliæ totidem quantitates primæ, aliæque totidem secundæ, in altera serie: & fuerit vna eadem quantitas media proportionalis inter primas primarum, & inter secundas primarum, & deinceps inter æqueordinatas; necnon media proportionalis inter primas secundarum, & inter secundas secundarum, & deinceps



ceps inter æqueordinatas: erunt in altera serie, primæ similiter arithmeticè dispositæ, atque secundæ.

*Demonst.*

def. 16b

33. h.

Quoniam enim primarum in prima serie, prima & secunda, & secundarum in prima serie, prima & secunda, sunt harmonicè dispositæ: constat, quod & in secunda serie, primarum prima & secunda, & secundarum prima & secunda, sunt arithmeticè dispositæ. item ostendetur, quod primarum in secunda serie secunda, & tertia, & secundarum secunda & tertia, sunt arithmeticè dispositæ. & sic deinceps vsque ad vltimas primarum, & secundarum. Quare primæ in secunda serie, sunt similiter arithmeticè dispositæ, atque secunde.

def. 8. h.

*Theor. 39. Prop. 39.*

**I**nter duas quantitates media proportionalis, eadem est etiam inter submultiplicem vnius, & æquemultiplicem alterius.

*Hypoth.*

Esto inter duas  $a$ ,  $b$ , media proportionales  $c$ : & esto ipsius  $a$ , submultiplex  $a(3)$ ; & ipsius  $b$ , æquemultiplex  $3b$ .

Dico  $a(3)$ ;  $c$ ;  $c$ ;  $3b$ .

*Demonstr.*

hypoth.  $a(3)$ ;  $a$ ;  $b$ ;  $3b$ .

hypoth.  $a$ ;  $c$ ;  $c$ ;  $b$ .

p. p.  $a(3)$ ;  $c$ ;  $c$ ;  $3b$ . Quod &c. Quare &c.



*Theor. 40. Prop. 40.*

**I**N serie harmonica naturali, aliquoteni ab vno, & aliquoteni ab altero, per numeros alterutrorum multitudinis terminorum submultiplicati; sicut primi quotientes, similiter secundi, sunt harmonicè dispositi: item tertij, & quarti, & sic deinceps.

*Hypoth.*

Sint in serie harmonica naturali duo termini  $a, b$ : & ab  $a$ , sumantur terni subquadrupli; & à  $b$ , quaterni subtripli.

Dico primos ternos subquadruplos ab  $a$ , & primos subtriplos à  $b$ , similiter esse dispositos harmonicè; atque secundos subquadruplos ternos ab  $a$ , & secundos subtriplos quaternos à  $b$ .

*Prepar.*

Ordinetur series arithmetica naturalis: in qua sint,  $c$  æqueordinatus, atque  $a$ ; &  $d$  æqueordinatus, atque  $b$ . sumanturque quadrupli terni à  $c$ , & tripli quaterni à  $d$ . sumatur etiam inter  $a$ , &  $c$  medius proportionalis  $e$ .

*Demonstr.*

*constr.* | Quoniam  $e$ , medius proportionalis est inter  $a$ ,  
 23.  $b$ . |  $c$ : medius etiam proportionalis est inter  $b$ ,  $d$ ; &  
 39.  $b$ . | inter æqueordinatos terminos in vtraque serie naturali arithmetica, & harmonica. item est medius  
 7.  $b$ . | proportionalis inter multiplices terminorum arithmeticae seriei naturalis, & inter æque submultiplices terminorum harmonicae. sed quadrupli terni à  $c$ , & tripli quaterni à  $d$ , primi, sunt similiter

Hh

aii-



37. b. | arithmetice dispositi, atque secundi; item, atque  
 | tertij, atque quarti, & deinceps. Ergo etiam sub-  
 | quadrupli terni ab  $a$ , & subtriplici quaterni à  $b$ , pri-  
 | mi, sunt similiter harmonicè dispositi; atque se-  
 | cundi; item, atque tertij, atque quarti, & deinceps.  
 | Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 41. Propos. 41.*

**S**umma fractionum communem habentium denomi-  
 natorem, est summa numeratorum, ab eodem deno-  
 minatore denominata.

*Hypoth.*

Fractiones  $a(b)$ ,  $c(b)$  communem habent denomina-  
 torem: numeratorum summa est  $a+c$ .

Dico  $a(b) + c(b) : a+c(b)$ .

*Demonstr.*

10. b. |  $a(b)$ ;  $c(b)$ ;  $a$ ;  $c$ .  
 2. p. |  $a(b) + c(b)$ ;  $c(b)$ ;  $a+c$ ;  $c$ .  
 10. b. |  $a+c(b)$ ;  $c(b)$ ;  $a+c$ ;  $c$ .  
 11. 5. |  $a(b) + c(b)$ ;  $c(b)$ ;  $a+c(b)$ ;  $c(b)$ .  
 9. 5. |  $a(b) + c(b)$ ;  $a+c(b)$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 42. Prop. 42.*

**D**ifferentia fractionum communem habentium deno-  
 minatorem, est differentia numeratorum, ab eo-  
 dem



dem denominatore denominata.

*Hypoth.*

Fractiones  $a(b)$ ,  $c(b)$ , communem habent denominatorem  $b$ : differentia numeratorum est  $a - c$ .

Dico  $a(b) - c(b)$ :  $a - c$ .

*Demonstr.*

10. h.  $a(b)$ ;  $c(b)$ :  $a$ ;  $c$ .

2. p.  $a(b) - c(b)$ ;  $c(b)$ :  $a - c$ ;  $c$ .

10. h.  $a - c(b)$ ;  $c(b)$ :  $a - c$ ;  $c$ .

11. 5.  $a(b) - c(b)$ ;  $c(b)$ :  $a - c(b)$ ;  $c(b)$ .

9. 5.  $a(b) - c(b)$ :  $a - c(b)$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 43. Prop. 43.*

**D**Vorum inæqualium numerorum, unitas denominata à minore, & differentia denominata à maiore, sunt fractiones duæ, quarum summa est maior, quàm differentia eorumdem, aucta unitate, denominata à maiore.

*Hypoth.*

Sunto duo inæquales numeri, minor  $a$ , maior  $a+b$ .

Dico  $1(a) + b(a+b)$ : maiorem esse, quàm  $b + 1(a+b)$ .

*Demonstr.*

12. h.  $1(a)$ ;  $1(a+b)$ :  $a+b$ ;  $a$ .

$1(a)$ : maior quàm  $1(a+b)$ .

communiter addatur  $b(a+b)$ .

41. h.  $1(a) + b(a+b)$ : maior est, quàm  $b + 1(a+b)$ .

Quod &c. Quare &c.



*Theor. 44. Prop. 44.*

**Q**ualibet quantitate, à se ipsa, & à suis deinceps per ordinem multiplicibus, denominata; fit series harmonica naturalis.

*Hypoth.*

Esto quaelibet quantitas  $a$ , eiusque multiplices  $2a$ ,  $3a$ ,  $4a$ , & deinceps.

Dico  $a(a)$ ,  $a(2a)$ ,  $a(3a)$ ,  $a(4a)$ , & deinceps esse seriem harmonicam naturalem.

*Præpar.*

Esto rationalis  $u$ : & à rationali ordinetur series harmonica naturalis  $u$ ,  $u(2)$ ,  $u(3)$ ,  $u(4)$ , & deinceps.

*Demonstr.*

def. 29<sup>b</sup> |  $a$ ;  $u$ :  $a$ ;  $a(a)$ .

9. 5. |  $u$ :  $a(a)$ .

12. h. |  $a(a)$ ;  $a(2a)$ :  $2a$ ;  $a$ :  $u$ ;  $u(2)$  dupla.

9. 5. |  $a(2a)$ :  $u(2)$ .

sup. |  $a(3a)$ :  $u(3)$ .

sup. |  $a(4a)$ :  $u(4)$ .

def. 20<sup>b</sup> |  $a(a)$ ,  $a(2a)$ ,  $a(3a)$ ,  $a(4a)$ , est series harmonica naturalis. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 45. Prop. 45.*

**S**I fuerint duo prologarithmi, ex terminis ab unitate; alter, ex quocunque terminis; alter, ex totidem, & vno amplius: erit qui ex pluribus, eo qui ex paucioribus, perspectè maior.

*Hy-*



*Hypoth.*

Sunto duo prologarithmi, ex terminis ab vnitate: alter *A*, ex tot terminis, quotus est numerus *b*: alter *C*, ex tot, quotus est *d*. & esto *d*, vnitate maior, quàm *b*.

Dico *C*, perspectè maiorem esse, quàm *A*.

*Prepar.*

*l m n*  
*e . . . f . . . g . . . h . . . i . . . k*

Sumatur numerus *b* toties, quotus est *d*: & sint sumpti numeri *ef*, *fg*, *gh*, *hi*, *ik*. Item sumatur numerus *d* toties, quotus est *b*: & sint sumpti *el*, *lm*, *mn*, *nk*.

*Demonstr.*

16. 7.

Quoniam productus *b* per *d*, est æqualis producto *d* per *b*: summa numerorum *ef*, *fg*, *gh*, *hi*, *ik*, est æqualis summæ numerorum *el*, *lm*, *mn*, *nk*, estque idem numerus *ek*. Et quoniam *ef*, *fg*, *gh*, *hi*, *ik*, sunt æquales inter se: ergo *ef*, *eg*, *eh*, *ei*, *ek*, sunt simplex *b*, duplex, triplex, & reliqui deinceps multiplices. Item quoniam *el*, *lm*, *mn*, *nk*, sunt æquales: ergo *el*, *em*, *en*, *ek*, sunt simplex *d*, duplex, triplex, & reliqui deinceps multiplices.

Deinde quoniam *d*, vnitate maior est, quàm *b*: ergo *2d*, binario maior est, quàm *2b*: & *3d*, ternario maior est, quàm *3b*: & sic deinceps, & similiter *el*, vnitate maior, quàm *ef*: & *em*, binario maior, quàm *eg*: & *en*, ternario maior,



l

m

n

e . . . . . K

f

g

h

i

maior quàm  $eh$ : & sic deinceps. item similiter  $nk$ , vnitate maior, quàm  $ik$ : &  $mk$ , binario maior, quàm  $hk$ : &  $lk$ , ternario maior, quàm  $gk$ . Quare  $fl$ ,  $gm$ ,  $hn$ , & deinceps, sunt vnitas, binarius, ternarius, & deinceps: item  $in$ ,  $hm$ ,  $gl$ , sunt vnitas, binarius, ternarius, & deinceps. Est ergo  $ef$ , vnitate maior, quàm  $lg$ ; &  $lg$ , vnitate maior, quàm  $mh$ ; &  $mh$ , vnitate maior, quàm  $ni$ ; &  $ni$ , est vnitas.

Cum itaque tres sint quantitates inæquales  $ef$ ,  $eh$ ,  $eg$ , quarum  $ef$  minima,  $el$  media,  $eg$  maxima. si  $lg$ , vnitate aucta, denominetur ab  $ef$ ; &  $fl$ , ab  $eg$ : fiunt duæ fractiones, quarum summa, maior est, quàm  $fg$  vnitate aucta, denominata ab  $el$ . Sed  $lg$ , vnitate aucta, est  $ef$ ; &  $fg$ , vnitate aucta, est  $el$ : ergo

$ef(ef) + fl(eg)$ : maior est, quàm  $el(el)$ .

Similiter ostendetur,

$lg(eg) + gm(eh)$ : maior, quàm  $lm(em)$ .

Et  $ml(eh) + hn(ei)$ : maior, quàm  $mn(en)$ .

Deinde, cum duo sint inæquales numeri,  $ei$ ,  $eh$ ; quorum minor  $ei$ , maior  $ek$ , differentia  $ik$ : sitque vnitas  $ni$ : & differentia  $ik$ , vnitate aucta, sit  $nk$ . ergo

$ni(ei) + ik(ek)$ : maior est, quàm  $nK(eK)$ .

44. b. Sed  $ef(ef)$ ,  $fl + lg(eg)$ ,  $gm + mh(eh)$ ,  $hn + ni(ei)$ ,



( $ei$ ),  $iK$  ( $eK$ ) sunt termini componentes prologarithmum  $C$ . nam  $ef$ ,  $fl+lg$ ,  $gm+mh$ ,  $hn+ni$ ,  $iK$ , sunt numeratores æquales ipsi  $b$ , quos denominant,  $ef$ ,  $eg$ ,  $eh$ ,  $ei$ ,  $eK$ , nempe simplex  $b$ , duplex, triplex, & deinceps multiplices.

Eadem ratione constat, quod  $el$  ( $el$ ),  $lm$  ( $em$ ),  $mn$  ( $en$ ),  $nK$  ( $eK$ ) sunt termini componentes prologarithmum  $A$ .

*def. 26b* Ergo  $C$ , respectu maior est, quàm  $A$ . Quod &c. Quare &c.

*Theor. 46. Prop. 46.*

**S**I duorum inæqualium numerorum differentia, denominetur à minore; vnitas verò, à maiore: fiunt duæ fractiones; quarum summa, minor est, quàm differentia, vnitate aucta, denominata à minore.

*Hypoth.*

Sunto duo inæquales numeri  $a$ ,  $a+b$ .

Dico  $b(a)+1(a+b)$ : minorem esse, quàm  $b+1(a)$ .

*Demonstr.*

12. b. |  $1(a+b)$ ;  $1(a)$ :  $a$ ;  $a+b$ .

|  $1(a+b)$ : minor, quàm  $1(a)$ .

| addito communi  $b(a)$ .

41. b. |  $b(a)+1(a+b)$ : minor, quàm  $b+1(a)$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theo-*



*Theor. 47. Prop. 47.*

**S**I fuerint prologarithmi ex duobus terminis à secundo, ex tribus à tertio, ex quatuor à quarto, & sic deinceps: qui ex pluribus, perspectè minor est, quàm, qui ex paucioribus vno.

*Hypoth.*

Sint duo prologarithmi; alter *A*, ex terminis ab 1 (*b*); & ex tot terminis, quotus est *b*; alter *C*, ex terminis ab 1 (*d*), & ex tot terminis, quotus est *d*: & esto *b*, vnitate minor, quàm *d*.

Constat; quod 1 (*b*), totus ordine est, quotus, est *b*: & 1 (*d*), totus ordine, quotus est *d*. *prop. 27. b.*

Dico *C*, perspectè minorem esse, quàm *A*.

*Præpar.*

$$\begin{array}{ccccccc}
 & m & & n & & o & \\
 e \text{---} 20 \text{---} f & . & . & . & . & . & . l \\
 & g & & h & & i & & k
 \end{array}$$

Sumatur productus *bd*, qui sit *ef*: eique adijciantur tot *b*, quotus est *d*, qui sint *fg*, *gh*, *hi*, *ik*, *kl*: eidemque *ef*, tot *d* adijciantur, quotus est *b*, qui sint *fm*, *mn*, *no*, *ol*.

*Demonstr.*

16. 7. | Quoniam productus *b* per *d*, & productus *d* per *b*, sunt æquales: summa numerorum *fg*, *gh*, *hi*, *ik*, *kl*, summæ *fm*, *mn*, *no*, *ol*, est æqualis: estque idem numerus *fl*. Et quoniam *fg*, *gh*, *hi*, *ik*, *kl*, sunt æquales: ergo *fg*, *fh*, *fi*, *fk*, *fl*, sunt simplex *b*, duplex, triplex, & reliqui deinceps



inceps multiplices. Item quoniam *fm*, *mn*, *no*, *ol*, sunt æquales: ergo *fm*, *fn*, *fo*, *fl*, sunt simplex *d*; duplex, triplex, & reliqui deinceps multiplices. Sed *ef*, ad *b* totuplex est, quotus est  $d+1$ : & *eh*, quotus est  $d+2$ : ideoque *ef*, *eg*, *eh*, *ei*, *eK*, sunt totuplices ad *b*, quoti sunt  $d$ ,  $d+1$ ,  $d+2$ ,  $d+3$ ,  $d+4$ . Item cum sit *ef*, ad *d* totuplex, quotus est *b*: erunt *ef*, *em*, *en*, *eo*, totuplices ad *d*, quoti sunt  $b$ ,  $b+1$ ,  $b+2$ ,  $b+3$ .

Deinde quoniam *d*, vnitate maior est, quàm *b*: ergo  $2d$ , binario maior est, quàm  $2b$ : &  $3d$ , ternario maior, quàm  $3b$ ; & sic deinceps, & similiter *fm*, vnitate maior, quàm *fg*; & *fn*, binario maior, quàm *fh*; & *fo*, ternario maior, quàm *fi*; & sic deinceps. item similiter *ol*, vnitate maior, quàm *Kl*; & *nl*, binario maior, quàm *il*; & *ml*, ternario maior, quàm *hl*. Quare *gm*, *hn*, *io*, sunt vnitas, binarius, ternarius, & deinceps: item *oK*, *ni*, *mh*, sunt vnitas, binarius, ternarius, & deinceps. Ergo *gm*, auctus vnitate, est *hn*; & *hn*, auctus vnitate, est *io*; & *io*, auctus vnitate, est *iK*, vel *b*.

Itaque sunt inæquales, & minores primùm, deinde maiores hoc ordine, *ef*, *eg*, *em*, *eh*, *en*, *ei*, *eo*, *eK*: quorum minimus *ef*, est productus *bd*: & differentia *ef*, *eg*, est *fg*, nempe *b*: est autem *bd* ad  $b^2$ , sicut *d* ad *b*, maior: ergo minimus *ef*, non est minor, quàm secunda potestas differentia *ef*, *eg*. ideoque neque *eg*, minor est, quàm secunda potestas differentia *eg*, *eh*.

II

neque



$e \text{---} 20 \text{---} f \dots \dots \dots m \dots \dots n \dots \dots o \dots \dots l$   
 $\qquad \qquad \qquad g \qquad \qquad h \qquad \qquad i \qquad \qquad K$

neque  $eh$ , minor, quàm secunda potestas differentiae  $eh$ ,  
 $ei$ . neque  $ei$ , minor, quàm secunda potestas differentiae  
 $ei$ ,  $ek$ .

46. h.

Quare si  $fg$ , denominetur ab  $ef$ ; & vnitas  $gm$ ,  
 denominetur ab  $eg$ : summa fractionum, minor est,  
 quàm si  $fg$ , aucta vnitate, denominetur ab  $ef$ . est  
 autem  $fg$ , aucta vnitate, æqualis ipsi  $fm$ : ergo

$fg(ef) + gm(eg)$ : minor est, quàm  $fm(ef)$ .

2. h.

Item si  $mh$  denominetur ab  $eg$ ; &  $gm$ , aucta  
 vnitate, idest  $hn$  denominetur ab  $eh$ : summa fra-  
 ctionum, minor est, quàm si  $gh$ , aucta vnitate, idest  
 $mn$ , denominetur ab  $eh$ .

$mh(eg) + hn(eh)$ : minor est, quàm  $mn(eh)$ .

Similiter ostendetur, quod

$ni(eh) + io(ei)$ : minor est, quàm  $no(en)$ .

Et quòd

$oK(ei) + Kl(eK)$ : minor est, quàm  $ol(eo)$ .

Sed  $fg(ef)$ ,  $gm + mh(eg)$ ,  $hn + ni(eh)$ ,  $io + oK(ei)$ ,  $Kl(eK)$ , sunt  $1(d)$ ,  $1(d+1)$ ,  $1(d+2)$ , & de-  
 inceps reliqui termini, tot, quotus est  $d$ , compo-  
 nentes prologarithmu n C. nam  $fg$ , est  $b$ : &  $ef$ ,  
 est productus  $bd$ : &  $fg(ef)$ , est  $b(bd)$ ; idest,  $1(d)$ .

13. h.

item  $gm + mh$  est  $b$ : &  $eg$ , est  $bd + b$ : &  $gm + mh(eg)$ , est  $b(bd + b)$ ; idest,  $1(d+1)$ . & sic deinceps.

Simi-



13. b. | Similiter  $fm(e\bar{f})$ ,  $mn(em)$ ,  $no(en)$ ,  $ol(eo)$ , sunt  
 1 (b), 1 (b+1), & deinceps reliqui termini, tot,  
 quotus est b, componentes prologarithmum A.  
 nam  $fm$ ,  $mn$ ,  $no$ ,  $ol$ , sunt d: &  $ef$ ,  $em$ ,  $en$ ,  $eo$ ,  
 sunt  $bd$ ,  $bd+d$ ,  $bd+2d$ ,  $bd+3d$ , & ipsę fractiones  
 13. b. | sunt  $d(bd)$ ,  $d(bd+d)$ ,  $d(bd+2d)$ ,  $d(bd+3d)$ ; idest,  
 1 (b), 1 (b+1). &c.  
 def. 27 b | Ergo C, est perspectè minor, quàm A. Quod  
 &c. Quare &c.

Theor. 48. Prop. 48.

SI fuerint duę series prologarithmorum, ex terminis ab  
 vnitare; altera, ex quocunque terminis; altera, ex  
 totidem, & vno amplius: erit secundus prologarithmus ex  
 pluribus, secundo ex paucioribus, perspectè maior: & ter-  
 tius, tertio: & quartus, quarto: & sic deinceps singuli pro-  
 logarithmi vnus seriei, singulis prologarithmis æqueor-  
 dinatis alterius, perspectè sunt maiores.

Hypoth.

Sint duę series prologarithmorum ex terminis ab vni-  
 tate: altera A, ex tot terminis, quotus est numerus b: al-  
 tera C, ex tot, quotus est d. & esto d, vnitare maior,  
 quàm b.

Dico secundum prologarithmum seriei C, perspectè  
 maiorem esse, secundo seriei A.



Præpar.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          | <i>l</i> | <i>m</i> | <i>n</i> |          | <i>t</i> | <i>u</i> | <i>x</i> |          |          |
| <i>e</i> | .....    | .....    | .....    | <i>K</i> | .....    | .....    | .....    | <i>s</i> |          |
|          | <i>f</i> | <i>g</i> | <i>h</i> | <i>i</i> |          | <i>o</i> | <i>p</i> | <i>q</i> | <i>r</i> |

Sumatur numerus *b* toties, quotus est *d*: & sint sumpti numeri *ef*, *fg*, *gh*, *hi*, *iK*. item numerus *d* toties, quotus est *b*: & sint sumpti numeri *el*, *lm*, *mn*, *nK*. Sumatur iterum *b* toties, quotus est *d*: & sint sumpti numeri *Ko*, *op*, *pq*, *qr*, *rs*. & iterum *d*, sumatur toties, quotus est *b*: & sint sumpti numeri *Kt*, *tu*, *ux*, *xs*.

Demonstr.

16. 7.

Quoniam productus *b* per *d*, est æqualis producto *d* per *b*: summa numerorum *ef*, *fg*, *gh*, *hi*, *iK*, summæ numerorum *el*, *lm*, *mn*, *nK*, est æqualis: & summa numerorum *Ko*, *op*, *pq*, *qr*, *rs*, summæ *Kt*, *tu*, *ux*, *xs*, est æqualis. Sunt autem & singulæ partes *ek*, singulis *Ks* partibus æquales; & omnes, omnibus: & *ef*, *el*, *eg*, *em*, *eh*, *en*, *ei*, *ek*, ipsis *ko*, *kt*, *kp*, *ku*, *kq*, *kx*, *kr*, *ls*; singuli numeri, singulis æquales; & eorum differentia æquales, & similes: atque omnes ordinatim accepti, ut supra, usque ad *k*, similiter arithmetice sunt dispositi, atque omnes reliqui, usque ad

def. 8. b.

45. b.

3. b.

3. b.

3. b.

s. Et sicut demonstratum est, quod  
*ef*(*ef*)+*fl*(*eg*): maior est, quàm *el*(*el*).  
*lg*(*eg*)+*gm*(*eh*): maior, quàm *lm*(*em*).  
*rh*(*eh*)+*hn*(*ei*): maior, quàm *mn*(*en*).

ni-



43. h.  $ni(ei)+ik(ek)$ : maior, quàm  $nk(ek)$ .  
ita in præfenti demonstrabitur, eodem prorsus  
argumento, quòd

3. h.  $ko(eo)+ot(ep)$ : maior est, quàm  $kt(et)$ .

3. h.  $tp(ep)+pu(eq)$ : maior, quàm  $tu(eu)$ .

3. h.  $uq(eq)+qx(er)$ : maior, quàm  $ux(ex)$ .

43. h.  $xr(er)+rs(es)$ : maior, quàm  $xs(es)$ .

45. h. Item sicut demonstratum est, quòd

$ef(ef)$ ,  $fl+lg(eg)$ ,  $gm+mh(eh)$ ,  $hn+ni(ei)$ ,  
 $ik(ek)$ , sunt termini componentes primum pro-  
logarithmum seriei C: & quòd  $el(el)$ ,  $ln(em)$ ,  
 $mn(en)$ ,  $nK(eK)$ , sunt componentes primum se-  
riei A. ita demonstrabitur in præfenti, quòd

$Ko(eo)$ ,  $ot+tp(ep)$ ,  $pu+uq(eq)$ ,  $qx+xr(er)$ ,  $rs-$   
 $(es)$ , sunt termini componentes prologarithmum  
secundum seriei C: & quòd  $Kt(et)$ ,  $tu(eu)$ ,  $ux(ex)$ ,  
 $xs(es)$ , sunt componentes secundum prologa-  
rithmum seriei A.

45. h. Et omninò sicut ostensum est, quòd primus se-  
riei C, est perspectè maior, primo seriei A: ita  
def. 8. h. demonstrabitur, quòd secundus seriei C, est per-  
spectè maior secundo seriei A. Quod &c.

Similiter ostendetur, quòd & tertius tertio, & quartus  
quarto, sunt perspectè maiores: & quòd quisque prolo-  
garithmus seriei C, perspectè maior est, æqueordinato  
prologarithmo seriei A.

Quare &c.



*Theor. 49. Prop. 49.*

**S**I fuerint series prologarithmorum, ex binis à secundo, ex ternis à tertio, ex quaternis à quarto, & sic deinceps: secundus prologarithmus eius, quæ ex pluribus, perspectè minor est, quàm secundus eius, quæ ex paucioribus vno: & tertius, perspectè minor, quàm tertius: & quartus, quàm quartus: & sic deinceps vnusquisque perspectè est minor, quàm suus æqueordinatus prologarithmus.

*Hypoth.*

Sint duæ series prologarithmorum: altera *A*, ex terminis ab 1(*b*), & ex totenis, quotus est *b*: altera *C*, ex terminis ab 1(*d*), & ex totenis, quotus est *d*. & esto *b*, vni-  
tate minor, quàm *d*.

Constat, quòd 1(*b*) totus est ordine, quotus *b*: & 1(*d*), totus ordine, quotus *d*. *prop. 27. h.*

Dico secundum prologarithmum seriei *C*, perspectè minorem esse, secundo seriei *A*.

*Præpar.*

$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
 & & & m & n & o & & q & s & u & & & & & & & \\
 e \cdots 20 \cdots f & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & y \\
 & & & g & h & i & K & & p & r & t & x & & & & & 
 \end{array}$$

Sumatur productus *bd*, qui sit *ef*: eique adjiciantur tot *b*, quotus est *d*, qui sint *fg*, *gh*, *hi*, *iK*, *Kl*: eidemque *ef*, tot *d* adjiciantur, quotus est *b*, qui sint *fm*, *mn*, *no*, *ol*, & iterum ipsi *el*, adjiciantur tot *b*, quotus est *d*, qui sint *lp*, *pr*, *rt*, *tx*, *xy*: necnon iterum eidem *el*, adjiciantur tot *d*,



$d$ , quotus est  $b$ , qui sint  $lq$ ,  $qs$ ,  $su$ ,  $uy$ .

*Demonstr.*

16. 7. | Quoniam productus  $b$  per  $d$ , est æqualis producto  $d$  per  $b$ : summa numerorum  $fg$ ,  $gh$ ,  $hi$ ,  $iK$ ,  $Kl$ , summæ  $fm$ ,  $mn$ ,  $no$ ,  $ol$ , est æqualis: & summa  $lp$ ,  $pr$ ,  $rt$ ,  $tx$ ,  $xy$ , summæ  $lq$ ,  $qs$ ,  $su$ ,  $uy$ , æqualis. Sunt autem & singulæ partes  $fl$ , singulis  $ly$  partibus æquales; & omnes, omnibus: &  $fg$ ,  $fm$ ,  $fh$ ,  $fn$ ,  $fi$ ,  $fo$ ,  $fK$ , ipsis  $lp$ ,  $lq$ ,  $lr$ ,  $ls$ ,  $lt$ ,  $lu$ ,  $lx$ , singuli numeri, singulis æquales: & eorum differentia æquales, & similes: additisque vtrinq; communibus numeris  $ef$ ,  $el$ , etiam compositorum differentia sunt æquales & similes: &  $ef$ ,  $eg$ ,  $em$ ,  $eh$ ,  $en$ ,  $ei$ ,  $eo$ ,  $eK$ , sunt similiter arithmetice dispositi, atque  $el$ ,  $ep$ ,  $eq$ ,  $er$ ,  $es$ ,  $et$ ,  $eu$ ,  $ex$ .
47. h. | Est autem  $ef$ , non minor, quàm secunda potestas  $fg$ , & est  $el$ , maior, quàm  $ef$ ; &  $lp$  æqualis ipsi  $fg$ : ergo  $el$  non minor est, quàm secunda potestas  $lp$ : ideoque similiter etiam  $ep$ , non minor, quàm secunda potestas  $pr$ : &  $er$ , non minor, quàm secunda potestas  $rt$ : &  $et$ , non minor, quàm secunda potestas  $tx$ . Itaque sicut demonstratum est, quod
46. h. |  $fg(ef) + gm(eg)$ : minor est, quàm  $fm(ef)$ .
2. h. |  $mb(eg) + hn(eh)$ : minor, quàm  $mn(eh)$ .
2. h. |  $ni(eh) + io(ei)$ : minor, quàm  $no(en)$ .
2. h. |  $oK(ei) + Kl(eK)$ : minor, quàm  $ol(eo)$ .

Sic



c---20---f, ... m n o ... q s u  
 g h i K p r t x

Sic demonstrabitur, quòd

46. b.  $lp(el) + pq(ep)$  minor est, quàm  $lq(el)$ .

2. b.  $qr(ep) + rs(er)$  minor, quàm  $qs(eq)$ .

2. b.  $st(er) + tu(et)$  minor, quàm  $su(es)$ .

2. b.  $ux(et) + xy(ex)$  minor, quàm  $uy(eu)$ .

47. b. Item sicut demonstratum est, quòd

$fg(ef)$ ,  $gm + mh(eg)$ ,  $hn + ni(eh)$ ,  $io + ok(ei)$ ,  
 $Kl(ek)$ .

componunt primum prologarithmum seriei C: & quòd

$fm(ef)$ ,  $mn(em)$ ,  $no(en)$ ,  $ol(eo)$ , componunt primum seriei A. sic

$lp(el)$ ,  $pq + qr(ep)$ ,  $rs + st(er)$ ,  $tu + ux(et)$ ,  $xy(ex)$ , componunt secundum prologarithmum seriei C: &

$lq(el)$ ,  $qs(eq)$ ,  $su(es)$ ,  $uy(eu)$ , componunt secundum seriei A. Et omninò sicut primus seriei

47. b. C, perspectè est minor primo seriei A: ita secundus prologarithmus, est perspectè minor secundo. Quod &c.

def. 8. b. Similiter ostendetur, quod & tertius tertio, & quartus quarto, sunt perspectè minores: & quod quisque prologarithmus seriei C; perspectè minor est, æqueordinato prologarithmo seriei A.

Quare &c.



*Theor. 50. Prop. 50.*

**H**yperlogarithmi rationum duplę, & superparticula-  
rium, quò sunt, minores inter terminos, eò sunt mi-  
nores.

*Prępar.*

Esto *A*, series harmonica naturalis: & ordinentur *B*, *C*,  
*D*, series prologarithmorum; *B* quidem, ex binis à secun-  
do; *C*, ex ternis à tertio; *D*, ex quaternis à quarto; & sic  
deinceps, à quotoquolibet, ex totenis.

*Demonstr.*

*def. 12. b* Nam in serie arithmetica naturali, ratio subdu-  
*21. 7.* pla, est inter minimos terminos, primum, & se-  
*19. b.* cundum; deinde inter maiores, ordinatim multi-  
plos minimorum; videlicet inter secundum, &  
quartum; inter tertium, & sextum; inter quartum,  
*24. b.* octauum. Ergo reciprocè, in serie harmonica na-  
*def. 20. b* turali, ratio dupla, est inter maximos terminos,  
primum, & secundum; deinde inter minores ordi-  
natim submultiplos maximorum; videlicet inter  
secundum, & quartum; inter tertium, & sextum;  
*def. 22. b* inter quartum, & octauum. Ergo rationis duplę,  
inter maximos terminos primum, & secundum,  
hyperlogarithmus, est primus terminus seriei *A*,  
nempe vnitas. deinde inter minores terminos se-  
cundum, & quartum, hyperlogarithmus, est pri-  
mus prologarithmus seriei *B*, ex duobus à secun-  
do, nempe ex secundo, & tertio. & inter tertium,

K k

&amp; se-



47. b. & sextum, minores adhuc terminos, hyperlogarithmus, est primus prologarithmus seriei C, ex tribus à tertio, nempe ex tertio, quarto, & quinto. Et deinceps inter minores terminos quartum, & octauum, hyperlogarithmus, est primus prologarithmus seriei D, ex quatuor à quarto, nempe ex quarto, quinto sexto, & septimo. Sed huiusmodi primorum prologarithmorum, minor est qui ex pluribus, quàm qui ex paucioribus terminis. Ergo hyperlogarithmorum duplæ rationis minor est, qui minores inter est terminos, quàm qui inter maiores. Quod &c.

26. b. Rursum in serie arithmetica naturali, ratio sub-  
 12. 7. sesquialtera, est inter minimos terminos, secun-  
 19. b. dum, & tertium; deinde inter maiores, ordinatim  
 24. b. multiplos minimorum; videlicet inter quartum, &  
 sextum; inter sextum, & nonum; inter octauum,  
 & duodecimum. Ergo reciprocè in serie harmo-  
 nica naturali, ratio sesquialtera est inter maximos  
 terminos, secundum, & tertium; deinde inter mi-  
 nores, submultiplos maximorum, quartum, & sex-  
 tum; & inter minores, sextum, & nonum; & ad-  
 hoc. 22b. huc inter minores, octauum, & duodecimum. Er-  
 go rationis sesquialteræ inter maximos terminos,  
 secundum, & tertium, hyperlogarithmus, est se-  
 cundus seriei A. deinde inter minores, quartum,  
 & sextum, hyperlogarithmus, est secundus pro-  
 loga-



logarithmus seriei *B*, ex duobus à quarto, nempe ex quarto, & quinto. & inter sextum, & nonum, adhuc minores, hyperlogarithmus, est secundus seriei *C*, ex tribus à sexto, nempe ex sexto, septimo, & octauo. & inter octauum, & duodecimum, adhuc minores, hyperlogarithmus, est secundus seriei *D*, ex quatuor ab octauo, nempe ex octauo, nono, decimo, & vndecimo. Sed in seriebus huiusmodi, secundorum prologarithmorum, minor est, qui ex pluribus, quàm qui ex paucioribus terminis. Ergo sesquialteræ rationis hyperlogarithmorum minor est, qui minores inter terminos, quàm qui est inter maiores. Quod &c.

Similiter prorsus demonstratione ostendetur, de sesquitercia ratione, adhibitis tertijs prologarithmis earumdem serierum: & de sesqui quarta, adhibitis quartis prologarithmis: & de omni superparticulari ratione.

Quare &c.

---

*Theor. 51. Propos. 51.*

**O**mnis ratio multipla, vel est dupla, vel ex dupla & superparticularibus composita.

*Demonstr.*

Nam tripla 3 ad 1, ex sesquialtera, 3 ad 2, & dupla, 2 ad 1, componitur: quadrupla, 4 ad 1, ex sesquitercia, 4 ad 3, sesquialtera, 3 ad 2, & dupla, 2 ad 1: quintupla, 5 ad 1, ex sesquiquarta, 5

Kk 2

ad 4,



ad 4, sesquitercia, 4 ad 3, sesquialtera, 3 ad 2, & dupla, 2 ad 1. Et sic de reliquis.

Quare &c.

*Theor. 52. Prop. 52.*

**O**mnis ratio numerosa, ex superparticularibus componitur.

*Hypoth.*

Esto ratio numerosa  $a$  ad  $b$ .

Dico  $a$  ad  $b$  rationem ex superparticularibus esse compositam.

*Prepar.*

Assumantur numeri 8, 5, eandem inter se rationem habentes  $a$  ad  $b$ . & inter 8, & 5. medij numeri. 7. 6.

*Demonstr.*

*def. 5. 6.* Ratio 8 ad 5 ex rationibus 8 ad 7, 7 ad 6, 6 ad 5, componitur. Sed 8 ad 7, ratio numeri ad numerum unitate minorem, est superparticularis, item 7 ad 6, 6 ad 5, sunt rationes superparticulares: ergo ratio numerosa, 8 ad 5, vel  $a$  ad  $b$ , ex rationibus superparticularibus componitur. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 53. Prop. 53.*

**Q**uotcunque terminorum, è serie harmonica naturalis, ordine quantitatis acceptorum, hyperlogarithmus



rithmus rationis compositæ inter extremos, componitur ex hyperlogarithmus rationum componentium, inter extremos, & medius. & hypologarithmus ex hypologarithmis.

*Hypoth.*

In serie harmonica naturali, sint tres termini  $a, b, c$ : & esto  $a$ , maior, quàm  $b$ ; &  $b$ , maior, quàm  $c$ .

Dico rationis  $a$  ad  $c$ , inter terminos  $a, c$ , hyperlogarithmum, ex rationis  $a$  ad  $b$ , inter  $a, b$ , & rationis  $b$  ad  $c$ , inter  $b, c$ , hyperlogarithmis componi.

Et hypologarithmum, ex hypologarithmis.

*Prepar.*

Sumantur inter terminos  $a, b$ , omnes medij in serie harmonica naturali: necnon inter  $b, c$ . & sint inter  $a, c$  termini.

$a \ g \ h \ i \ b \ K \ l \ m \ n \ c$

*Demonstr.*

Hyperlogarithmus rationis  $a$  ad  $b$ , inter terminos  $a, b$ , est  $a+g+h+i$ . Hyperlogarithmus rationis  $b$  ad  $c$ , inter terminos  $b, c$ , est  $b+K+l+m+n$ . Hyperlogarithmus rationis  $a$  ad  $c$ , inter terminos  $a, c$ , est  $a+g+h+i+b+K+l+m+n$ . ex utrarumque rationum  $a$  ad  $b$ ; &  $b$  ad  $c$ , hyperlogarithmis, inter eosdem terminos compositus. Quod &c.

Item rationis  $a$  ad  $b$ , inter  $a, b$ , hypologarithmus est,  $g+h+i+b$ : & rationis  $b$  ad  $c$ , inter  $b, c$ , est  $K+l+m+n+c$ : & rationis  $a$  ad  $c$ , est  $g+h+i+b+K+l+m+n+c$ . ex utrisque compositus. Quod &c. Quare &c.



*Theor. 54. Prop. 54.*

**C** Viusque numerosæ rationis hyperlogarithmi, quò sunt, minores inter terminos, eò sunt minores.

*Hypoth.*

Esto numerosa ratio inter seriei harmonicæ terminos ab unitate, maiores  $1(3a)$ ,  $1(3b)$ , & deinde inter minores  $1(4a)$ ,  $1(4b)$ .

Dico inter  $1(4a)$ ,  $1(4b)$ , minorem esse hyperlogarithmum, quàm inter  $1(3a)$ ,  $1(3b)$ .

*Præpar.*

Assumantur minimi numeri in eadem ratione  
 21. 7.  $a, b$ : & deinceps maiores, nempe dupli, tripli,  
 27.  $b$ . quadrupli, donec inueniatur denominatores pro-  
 positorum terminorum,  $3a, 3b, 4a, 4b$ . Deinde  
 inter  $a, b$  ordinentur omnes medij, in serie arithmetica naturali, quorum deinceps supparticula-  
 res sunt rationes,  $a, c, d, b$ ; & eorum æquemultipli  $3a, 3c, 3d, 3b$ , easdem supparticulares ha-  
 15. 5. bentes rationes deinceps; necnon & æquemultipli easdem habentes rationes  $4a, 4c, 4d, 4b$ . Sumantur denique in serie harmonica termini, ab his denominati  $1(3a), 1(3c), 1(3d), 1(3b)$ : &  $1(4a), 1(4c), 1(4d), 1(4b)$ .

*Demonstr.*

24.  $b$ . Terminorum  $1(4a), 1(4c), 1(4d), 1(4b)$  rationes deinceps, necnō terminorum  $1(3a), 1(3c), 1(3d), 1(3b)$ , reciprocè sunt eedem, quæ terminorum



50. b. | norum  $4a, 4c, 4d, 4b$ , necnon  $3a, 3c, 3d, 3b$ :  
 idest, eadem superparticulares. Quarum rationis  
 inter  $1(4a), 1(4c)$ , minor est hyperlogarithmus,  
 quàm inter  $1(3a), 1(3c)$ : & inter  $1(4c), 1(4d)$ , mi-  
 nor, quàm inter  $1(3c), 1(3d)$ : & inter  $1(4d), 1(4b)$ ,  
 53. b. | minor, quàm inter  $1(3d), 1(3b)$ . Et ex minoribus  
 hyperlogarithmis, minor est hyperlogarithmus  
 compositus, rationis compositæ inter extremos  
 $1(4a), 1(4b)$ , quàm ex maioribus, inter extremos  
 $1(3a), 1(3b)$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 55. Prop. 55.*

**H**yperlogarithmi rationum duplæ, & superparticula-  
 rium, quò sunt, minores inter terminos, eò sunt  
 maiores.

*Præpar.*

Esto  $A$  series harmonica naturalis: & ordinentur  $B, C,$   
 $D$ , series prologarithmorum ab unitate;  $B$  quidem, ex bi-  
 nis;  $C$ , ex ternis;  $D$ , ex quaternis; & sic deinceps.

*Demonst.*

def. 12. b. | Nam in serie arithmetica naturali, ratio subdu-  
 21. 7. | pla est inter minimos terminos, primum, & secun-  
 19. b. | dum; deinde inter maiores, ordinatim multiplos  
 24. b. | minimorum; videlicet inter secundum, & quartum;  
 def. 20 b | inter tertium, & sextum; inter quartum, & octauum.  
 Ergo reciprocè in serie harmonica naturali, ratio  
 dupla



dupla est inter maximos terminos, primum, & secundum; deinde inter minores ordinatim submultiplos maximorum; videlicet, inter secundum, & quartum; inter tertium, & sextum; inter quartum, & octauum. Ergo rationis duplæ, inter maximos terminos primū, & secundum, hypologarithmus, est secundus terminus seriei *A*, nempe 1(2). deinde inter minores terminos secundum, & quartum, hypologarithmus, est secundus prologarithmus seriei *B*, ex duobus à tertio, nempe ex tertio, & quarto: & inter tertium, & sextum, minores adhuc terminos hypologarithmus, est secundus prologarithmus seriei *C*, ex tribus à quarto, nempe ex quarto, quinto, & sexto. & deinceps inter minores terminos, quartum, & octauum, hypologarithmus, est secundus prologarithmus seriei *D*, ex quatuor à quinto, nempe ex quinto sexto, septimo, & octauo. Sed huiusmodi secundorum prologarithmorum, maior est, qui ex pluribus, quàm qui ex paucioribus terminis. Ergo hypologarithmorum duplæ rationis maior est, qui minores inter est terminos, quàm qui inter maiores. Quod &c.

Rursum in serie arithmetica naturali, ratio sub-  
 sesquialtera, est inter minimos terminos, secundum, & tertium; deinde inter maiores, ordinatim multiplos minimorum; videlicet, inter quartum, & sex-



24. h. & sextum; inter sextum, & nonum; inter octauum, & duodecimum. Ergo reciproce in serie harmonica naturali, ratio sesquialtera est inter maximos terminos, secundum, & tertium; deinde inter minores, submultiplos maximorum, quartum, & sextum; & inter minores sextum, & nonum; & adhuc inter minores octauum, & duodecimum.

def. 23b Ergo rationis sesquialteræ inter maximos terminos, secundum, & tertium, hypologarithmus, est tertius seriei A. deinde inter minores, quartum, & sextum, hypologarithmus, est tertius prologarithmus seriei B, ex duobus à quinto, nempe ex quinto, & sexto. & inter sextum, & nonum, adhuc minores terminos, hypologarithmus est tertius seriei C, ex tribus à septimo, nempe ex septimo, octauo, & nono. & inter octauum, & duodecimum adhuc minores, hypologarithmus, est tertius seriei D, ex quatuor à nono, nempe ex nono, decimo, vndecimo, & duodecimo. Sed in seriebus huiusmodi, tertiorum prologarithmorum, maior est, qui ex pluribus, quàm qui ex paucioribus terminis. Ergo sesquialteræ rationis hypologarithmorum, maior est, qui minores inter terminos, quàm qui est inter maiores. Quod &c.

48. h.

Simili prorsus demonstratione ostendetur; de sesquitercia ratione, adhibitis quartis prologarithms earumdem serierum: & de sesquiquarta, adhibitis quintis prologarithmis:

Ll

rithmis:



rithmis: &amp; de omni superparticulari ratione.

Quare &amp;c.

*Theor. 56. Propos. 56.*

**C** Viusque numerosæ rationis hypologarithmi, quò sunt, minores inter terminos, eò sunt maiores.

*Hypoth.*

Estio numerosa ratio inter seriei harmonicæ naturalis terminos ab vnitare, maiores  $1(3a)$ ,  $1(3b)$ , & deinde inter minores  $1(4a)$ ,  $1(4b)$ .

Dico inter  $1(4a)$ ,  $1(4b)$ , maiorem esse hypologarithmum, quàm inter  $1(3a)$ ,  $1(3b)$ .

*Præpar.*

Assumantur minimi numeri in eodem ratione  $a, b$ : & inter minimos, medij omnes  $c, d$ : quorum terminorum  $a, c, d, b$ , rationes deinceps sunt superparticulares; assumantur & eorum multipli, donec propositorum terminorum denominatores inueniantur,  $3a, 3c, 3d, 3b$ , &  $4a, 4c, 4d, 4b$ , eadem superparticulares habètes rationes deinceps. Sumantur denique in serie harmonica, termini ab his denominati  $1(3a)$ ,  $1(3c)$ ,  $1(3d)$ ,  $1(3b)$ , &  $1(4a)$ ,  $1(4c)$ ,  $1(4d)$ ,  $1(4b)$ : quorum rationes deinceps, reciproce sunt eodem, & superparticulares.

*Demonstr.*

Inter  $1(4a)$ ,  $1(4c)$ , maior est hypologarithmus, quàm inter  $1(3a)$ ,  $1(3c)$ : & inter  $1(4a)$ ,  $1(4d)$ ,



53. b. |  $1(4d)$ , maior, quàm inter  $1(3c)$ ,  $1(3d)$ : & inter  
 |  $1(4d)$ ,  $1(4b)$ , maior, quàm inter  $1(3d)$ ,  $1(3b)$ .  
 | Et ex maioribus hypologarithmis, maior est hy-  
 | pologarithmus compositus, rationis compositæ,  
 | inter extremos  $1(4a)$ ,  $1(4b)$ , quàm ex minoribus,  
 | inter extremos  $1(3a)$ ,  $1(3b)$ . Quod &c.  
 Quare &c.

---

*Theor. 57. Prop. 57.*

**E**iusdem rationis, inter eosdem terminos, hyperloga-  
 rithmus hypologarithmo est maior.

*Hypoth.*

Sint in serie harmonica naturali ab unitate, termini  $a$ ,  
 $b$ : & esto  $a$  prior, quàm  $b$ .

Dico rationis  $a$  ad  $b$ , inter  $a$ ,  $b$  terminos, hyperloga-  
 rithmum hypologarithmo maiorem esse.

*Præpar.*

Inter  $a$ ,  $b$ , fumantur medij omnes in serie harmonica,  
 quorum summa  $c$ .

*Demonst.*

*hypoth.* |  $a$ : prior, quàm  $b$ .

27. b. |  $a$ : maior, quàm  $b$ .

|  $a+c$ : maior, quàm  $c+b$ .

def. 22 b |  $a+c$ : hyperlogarithmus.

def. 23 b |  $c+b$ : hypologarithmus.

| Ergo rationis  $a$  ad  $b$ , inter  $a$ ,  $b$  terminos, hy-  
 | perlogarithmus, est maior hypologarithmo.

| Quod &c. Quare &c.

---



*Theor. 58. Prop. 58.*

**E**iusdem rationis inter quoscunque terminos, hyperlogarithmus hypologarithmo est maior.

*Hypoth. comm.*

In serie harmonica naturali ab unitate, sunt termini proportionales  $a$  ad  $b$ , ut  $c$  ad  $d$ .

Dico inter  $a, b$  hypologarithmum, hypologarithmo inter  $c, d$ , maiorem esse.

*Hypoth. p. cas.*

Esto  $a$ , maior, quàm  $c$ .

*Demonstr.*

14. 5. | Quoniam  $a$ , maior est, quàm  $c$ ; etiam  $b$ , ma-  
54. b. | ior est, quàm  $d$ : & inter  $a, b$ , maior est hyperlo-  
58. b. | garithmus, quàm inter  $c, d$ : sed inter  $c, d$ , hy-  
perlogarithmus hypologarithmo est maior: ergo  
inter  $a, b$  hyperlogarithmus, hypologarithmo in-  
ter  $c, d$ , est maior. Quod &c.

*Hypoth. 2. cas.*

Esto  $a$ , minor, quàm  $c$ .

*Demonstr.*

14. 5. | Quoniam  $a$ , minor est, quàm  $c$ ; etiam  $b$  mi-  
58. b. | nor est, quàm  $d$ : & inter  $a, b$ , hyperlogarithmus  
55. b. | hypologarithmo est maior: hypologarithmus au-  
tem inter  $a, b$ , hypologarithmo inter  $c, d$ , est  
maior. Ergo inter  $a, b$  hyperlogarithmus, hy-  
pologarithmo inter  $c, d$ , est maior. Quod &c.  
Quare &c.



*Probl. I. Prop. 59.*

**D**ata ratione, terminos inuenire cuiuspiam determinatæ rationis numerosæ, in serie harmonica naturali ab vnitatem, quos inter hypologarithmus ad vltimum, maior est, quàm in data ratione.

*Hypoth.*

Sit data ratio  $a$  ad  $b$ : & sit determinata ratio numerosa  $c$  ad  $d$ .

Oportet inuenire in serie harmonica naturali ab vnitatem, terminos proportionales, vt  $c$  ad  $d$ : quos inter hypologarithmus ad vltimum eorum, maior est, quàm vt  $a$  ad  $b$ .

*Confir.*

Rationis  $c$  ad  $d$ , minimi numeri inueniantur  $c$ ,  $d$ : & esto  $c$  minor, quàm  $d$ ; cuius defectus  $e$ : & inueniatur  $f$  multiplex ipsius  $e$ , & maior ad vnitatem, quàm vt  $a$  ad  $b$ : & quotuplex est  $f$  ad  $e$ , totus numerus accipiatur  $g$ : per quem multiplicentur  $c$ ,  $d$ , termini, & fiant  $gc$ ,  $gd$  producti: quibus denominatæ sumantur vnitates in serie harmonica naturali,  $1(gc)$ ,  $1(gd)$ .

Dico inter  $1(gc)$ ,  $1(gd)$  hypologarithmum ad  $1(gd)$ , maiorem esse, quàm vt  $a$  ad  $b$ .

*Demonstr.*

9. h. | Quoniam  $c$ , minor est, quàm  $d$ : &  $gc$ , minor  
12. h. | quàm  $gd$ : ergo reciprocè  $1(gc)$  maior est, quàm  
def. 19. b. |  $1(gd)$ : & singuli medij harmonici inter  $1(gc)$ ,  $1-$   
p. 3. |  $(gd)$ , sunt maiores, quàm  $1(gd)$ : & simul omnes  
ad



p. 3. ad  $1(gd)$  maiores sunt, quàm vt eorum multitu-  
do ad vnitatem. & componendo hypologari-  
thmus inter  $1(gc)$ ,  $1(gd)$ , maior est ad  $1(gd)$ ,  
quàm vt eius multitudo terminorum ad vnitatem.

44. b. Termini autem seriei harmonicę ab vnitatem in-  
clusiue, vsque ad  $1(gd)$  inclusiue, tot sunt, quotus  
est  $gd$ : & vsque ad  $1(gc)$  inclusiue, quotus est,  $gc$ :  
& ab  $1(gc)$  exclusiue, vsque ad  $1(gd)$  inclusiue,  
30. b. tot, quotus est,  $gd---gc$ . Sed  $d---c$ , est  $c$ : &  $gd$   
--- $gc$ , est  $ge$ : &  $g$  multiplicans  $e$ , facit  $f$ . Ergo

def. 23b termini ab  $1(gc)$  exclusiue, vsque ad  $1(gd)$  inclu-  
siue, tot sunt, quotus est  $f$ . Sed termini ab  $1(gc)$   
exclusiue, vsque ad  $1(gd)$  inclusiue, componunt  
hypologarithmum inter  $1(gc)$ ,  $1(gd)$ : ergo mul-  
tutudo terminorum hypologarithmi inter  $1(gc)$ ,  
constr.  $1(gd)$ , est  $f$ . Sed  $f$  ad vnitatem maior est, quàm  
vt  $a$  ad  $b$ . Ergo hypologarithmus inter  $1(gc)$ ,  
 $1(gd)$ , ad  $1(gd)$ , maior est, quàm vt  $a$  ad  $b$ .  
Quod &c.

Quare &c.

---

Probl. 2. Prop. 60.

**D**ata ratione, terminos inuenire cuiuspiam determi-  
natę rationis numerosę, in serie harmonica natu-  
rali ab vnitatem, quos inter hyperlogarithmus ad primum  
maior est, quàm in data ratione.

Hy-



*Hypoth.*

Sit data ratio  $a$  ad  $b$ : & sit determinata ratio numero-  
fa  $c$  ad  $d$ : & esto  $c$ , minor, quàm  $d$ .

Oportet inuenire, in serie harmonica naturali ab vni-  
tate, terminos proportionales vt  $c$  ad  $d$ : quos inter hy-  
perlogarithmus ad primum eorum, maior est, quàm vt  $a$   
ad  $b$ .

*Constr.*

59. *b.* | Fiat vt  $d$  ad  $c$ , ita  $b$  ad  $e$ : & inueniantur ter-  
mini in serie harmonica naturali ab vnitae, pro-  
portionales  $f$  ad  $g$ , vt  $d$  ad  $c$ ; inter quos hypolo-  
garithmus, maior sit ad  $g$ , quàm vt  $a$  ad  $e$ .

Dico inter  $f, g$  hyperlogarithmum, ad  $f$ , maiorem ef-  
fe, quàm vt  $a$  ad  $b$ .

*Demonstr.*

*constr.* | Inter  $f, g$  hypologarithmus, ad  $g$ , maior est,  
*constr.* | quàm vt  $a$  ad  $e$ :  $g$  ad  $f$ , est vt  $e$  ad  $b$ : ergo inter  
4. 3. |  $f, g$  hypologarithmus, ad  $f$ , maior est, quàm vt  
57. *b.* |  $a$  ad  $b$ . Sed inter  $f, g$  hyperlogarithmus hypo-  
8. 5. | logarithmo est maior; maioremque habet ad  $f$  ra-  
13. 5. | tionem: ergo inter  $f, g$  hyperlogarithmus, ad  $f$ ,  
maior est, quàm vt  $a$  ad  $b$ . Quod &c.

Quare &amp;c.

*Probl. 3. Prop. 61.*

**D**Atis duabus numerosis, & non æquealtis rationi-  
bus, vtriusque maioris, vel vtriusque minoris inæ-  
quali-



qualitatis: iuuenire in serie harmonica naturali, terminos duarum rationum, vt hypologarithmus altioris, maior sit hyperlogarithmo depressioris.

*Hypoth.*

Sint duæ rationes numerosæ, vtræque maioris, vel vtræque minoris inæqualitatis, *A* altior, *B* depressior.

Oportet in serie harmonica naturali, terminos inuenire vtrarumque, vt hypologarithmus *A*, sit maior hyperlogarithmo *B*.

*Constr.*

35. 7. Inueniantur *c*, *d*, minimi numeri numerosæ rationis *A*: quorum *c*, minor, quàm *d*. Item  
35. 7. inueniantur *e*, *f*, minimi numerosæ rationis *B*:  
def. 28. b. quorum *e*, minor, quàm *f*. Fiat ex *c*, *e* pro-

|  |               |              |              |               |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
|  | <i>A</i>      |              | <i>B</i>     |               |
|  | <i>c</i>      | <i>d</i>     | <i>e</i>     | <i>f</i>      |
|  | <i>ce</i>     |              | <i>cf</i>    | <i>g</i>      |
|  | <i>cef</i>    | <i>eg</i>    | <i>cfz</i>   | <i>fg</i>     |
|  | <i>I(cef)</i> | <i>I(eg)</i> | <i>I(fg)</i> | <i>I(def)</i> |

9. b. ductus *ce*: & vt *c* ad *d*, ita *ce* ad *de*: & vt *e* ad *f*, ita *ce* ad *cf*. Et quoniam altior est *A*, quàm *B*; idest, *c* ad *d*, quàm *e* ad *f*; idest, *ce* ad *de*, quàm *ce* ad *cf*. & sunt minoris inæqualitatis. ergo *ce* minor est ad *de*, quàm ad *cf*. Ergo *cf*,  
def. p. 4. minor est, quàm *de*. Sumatur inter *cf*, *de* me-  
10. 5. dius quilibet numerus *g*. & multiplicentur om-  
def. 28. b. nes *ce*, *cf*, *g*, *de*, communiter per *f*: & sint pro-



def. 28b | producti  $cef$ ,  $cf2$ ,  $fg$ , def. necnon multiplicetur  
 9. b. |  $g$ , per  $e$ : & sit productus  $eg$ . Et quoniam  $cef$  ad  $cf2$ , est  
 11. 5. | vt  $e$  ad  $f$ : item  $eg$  ad  $fg$ , est vt  $e$  ad  $f$ : ergo  $cef$  ad  $cf2$ ,  
 constr. | est vt  $eg$  ad  $fg$ . Est autem  $cf$ , minor, quam  $g$ : er-  
 14. 5. | go  $cf2$ , minor est, quam  $fg$ : ergo  $cef$ , minor est,  
 quam  $eg$ : ergo sunt quatuor numeri, hoc ordine,  
 $cef$ ,  $eg$ ,  $fg$ , def, priores minores posterioribus; à  
 27. b. | quibus denominatae unitates  $1(cef)$ ,  $1(eg)$ ,  $1(fg)$ ,  
 $1(def)$ , sunt in serie harmonica naturali ab unitate  
 24. b. | te, hoc ordine, priores maiores posterioribus. &  
 24. & | est  $1(cef)$  ad  $1(def)$ , vt  $d$  ad  $c$ ; &  $1(eg)$  ad  $1-$   
 9. b. |  $(fg)$ , vt  $f$  ad  $e$ .

Dico hypologarithmum inter terminos  $1(cef)$ ,  $1(def)$ ,  
 maiorē esse hyperlogarithmo inter terminos  $1(eg)$ ,  $1(fg)$ .

*Demonstr.*

def. 23b | Nam hypologarithmus inter terminos  $1(cef)$ ,  
 $1(def)$ , ex  $1(eg)$ , ex  $1(fg)$ , & ex omnibus inter-  
 def. 22b | medijs, alijsque terminis componitur: hyperloga-  
 rithmus verò inter  $1(eg)$ ,  $1(fg)$ , ex  $1(eg)$ , & ex  
 intermedijs terminis, vsque ad  $1(fg)$  exclusiue,  
 componitur. Ergo hyperlogarithmus inter  $1-$   
 $(cef)$ ,  $1(def)$ , maior est hyperlogarithmo inter  
 $1(eg)$ ,  $1(fg)$ . Quod &c. Quare &c.

*Probl. 4. Prop. 62.*

**D**Ata qualibet ratione inaequalitatis, inuenire in serie  
 harmonica naturali ab unitate, terminos determi-

M m

natam



natam habentes rationem inter quos hyperlogarithmus ad hypologarithmum propior est æqualitati, quàm in data ratione.

*Hypoth.*

Sit data ratio inæqualitatis  $a$  ad  $b$ : & sit determinata quædam ratio  $C$ .

Oportet inuenire terminos in serie harmonica naturali ab vnitate, habentes eandem  $C$  rationem; inter quos hyperlogarithmus ad hypologarithmum est propior æqualitati, quàm vt  $a$  ad  $b$ .

*Constr.*

60. b. | Esto  $a$  maior quàm  $b$ . & inueniantur in serie harmonica naturali ab vnitate, termini, prior  $d$ , posterior  $e$ ; inter quos hyperlogarithmus ad priorem  $d$ , maior est, quàm vt  $a$  ad  $a --- b$ .

Dico inter  $d$ ,  $e$  hyperlogarithmum ad hypologarithmum, maiorem esse, quàm vt  $a$  ad  $b$ ; maiorem, quàm vt  $b$  ad  $a$ .

*Prepar.*

Inter  $d$ ,  $e$ , assumatur mediorum omnium harmonicorum summa  $f$ .

*Demonstr.*

def. 22. | Inter  $d$ ,  $e$  hyperlogarithmus est  $d+f$ ; & hypologarithmus  $f+e$ : & est  $d+f$  ad  $d$ , maior, quàm  
 & 23 b. | vt  $a$  ad  $a --- b$ : & per conuersionem rationis,  $d$   
 constr. |  $+f$  ad  $f$ , minor, quàm vt  $a$  ad  $b$ . Sed  $d+f$  ad  $f$   
 3. 3. |  $+e$ , minor est, quàm vt  $d+f$  ad  $f$ . Ergo  $d+f$  ad  
 8. 5. |  $f+e$ ,  
 13. 5. |



$f+e$ , minor est, quàm vt  $a$  ad  $b$ . Ergo inter  $d$ ,  $e$  hyperlogarithmus ad hypologarithmum, minor est, quàm vt  $a$  ad  $b$ . Quod &c.

58.  $b$ . Et est hyperlogarithmus hypologarithmo maior:  $b$  autem, minor, quàm  $a$ . Ergo hyperlogarithmus ad hypologarithmum maior est, quàm vt  $b$  ad  $a$ . Quod &c.

Quare &c.

---

*Theor. 59. Prop. 63.*

**S**I fuerit prima ad secundam, minor, quàm vt tertia ad quartam; fuerit autem prima, quàm tertia, maior: erit & secunda, quàm quarta, maior.

*Demonstr.*

8. 5. Nam si esset secunda æqualis quartæ: esset prima ad secundam, maior, quàm vt tertia ad quartam: contra hypothesim. Quod si secunda esset minor, quàm quarta: esset prima ad secundam, maior, quàm vt ad quartam: prima autem ad quartam, maior est quàm vt tertia ad quartam: esset ergo prima ad secundam, maior, quàm vt tertia ad quartam, contra hypothesim. Est ergo secunda, quàm quarta maior. Quod &c. Quare &c.

---

*Theor. 60. Prop. 64.*

**S**I fuerit prima ad secundam, maior, quàm vt tertia ad quartam; fuerit autem prima, quàm tertia minor:

M m 2

erit



erit & secunda, quàm quarta, minor.

*Demonstr.*

8. 5. | Nam si esset secunda æqualis quartæ: esset pri-  
 8. 5. | ma ad secundam minor, quàm vt tertia ad quar-  
 8. 5. | tam. contra hypothesim. Quòd si secunda esset  
 13. 5. | maior, quàm quarta: esset prima ad secundam,  
 13. 5. | minor, quàm vt ad quartam: prima autẽ ad quar-  
 13. 5. | tam, minor est, quàm vt tertia ad quartam: esset  
 13. 5. | ergo prima ad secundam, minor, quàm vt tertia  
 13. 5. | ad quartam. contra hypothesim. Est ergo se-  
 13. 5. | cunda, quàm quarta; minor.

Quare &c.

*Theor. 61. Prop. 65.*

**E** Arundem numerosarum rationum vna tantum  
 quantitas est logarithmus.

*Hypoth.*

Sunto duæ quantitates inæquales  $a, b$ : & esto  $a$ , loga-  
 rithmus rationis  $C$ .

Dico  $b$  non esse logarithmum rationis  $C$ .

*Præpar.*

62. b. | Sumatur eiusdem rationis  $C$ , hyperlogarithmus  
 62. b. |  $d$ , & hypologarithmus  $e$ , propiores æqualitati,  
 62. b. | quàm vt  $a$  ad  $b$ .

*Demonstr.*

57. b. |  $d$ : maior quàm  $e$ .  
 57. b. | Si  $a$ , maior est, quàm  $b$ .

$d$ ;  $e$ .



*constr.* |  $d; e$ : minor, quàm  $a; b$ .  
*def. 24b* |  $d$ : maior, quàm  $a$ .  
*63. h.* |  $e$ : maior, quàm  $b$ .  
*def. 24b* |  $b$ , non est logarithmus rationis  $C$ . Quod &c.  
 Si  $a$ , minor est, quàm  $b$ .  
*constr.* |  $e; d$ : maior, quàm  $a; b$ .  
*def. 24b* |  $e$ : minor, quàm  $a$ .  
*64. h.* |  $d$ : minor, quàm  $b$ .  
*def. 24b* |  $b$ , non est logarithmus rationis  $C$ . Quod &c.  
 Quare &c.

---

*Theor. 62. Prop. 66.*

**D**eterminatæ numerosæ rationis hypologarithmi ad ultimum terminum, & hyperlogarithmi ad primum, sunt rationes quasi infinitæ.

*Demonstr.*

*59. h.* | Possunt enim inueniri cuiusque determinatæ rationis numerosæ termini in serie harmonica naturali ab vnitare, quorum ad ultimum, hypologarithmus maior est, quàm in data quacunque ratione: item, quorum ad primum, hyperlogarithmus maior est, quàm in data quacunque ratione. Quare hypologarithmi ad ultimum terminum, & hyperlogarithmi ad primum, ratio quasi est infinita.  
*60. h.* |  
*def. p. 3.* |

---

*Theor.*



*Theor. 63. Propos. 67.*

**S**I trium inæqualium quantitatum, maxima, & minima, fuerint propiores æqualitati, quàm data ratio inæqualitatis: etiam maxima, & media; media, & minima, erunt propiores æqualitati, quàm data eadem ratio.

*Hypoth.*

Sint inæquales quantitates  $a, b, c$ ; maxima quidem  $a$ , minima  $c$ : & sit data ratio inæqualitatis  $d$  ad  $e$ ; cuius maior terminus  $d$ , minor  $e$ : & sit  $a$  ad  $c$ , propior æqualitati, quàm  $d$  ad  $e$ .

Dico  $a; b$ , &  $b; c$ : propiores æqualitati, quàm  $d; e$ :

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $a; c$ : propior æqualitati, quàm  $d; e$ .  
*def. 3. 3.* |  $a; c$ : minor, quàm  $d; e$ . &  $c; a$ : maior, quàm  $e; d$ .  
 8. 5. |  $a; b$ : minor, quàm  $a; c$ . &  $b; a$ : maior, quàm  $c; a$ .  
 13. 5. |  $a; b$ : minor, quàm  $d; e$ . &  $b; a$ : maior, quàm  $e; d$ .  
*def. 3. 3.* |  $a; b$ : propior æqualitati, quàm  $d; e$ . Quod &c.  
 8. 5. |  $b; c$ : minor, quàm  $a; c$ . &  $c; b$ : maior, quàm  $c; a$ .  
 13. 5. |  $b; c$ : minor, quàm  $d; e$ . &  $c; b$ : maior, quàm  $e; d$ .  
*def. 3. 3.* |  $b; c$ : propior æqualitati, quàm  $d; e$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Probl. 5. Prop. 68.*

**D**Ata qualibet ratione inæqualitatis, inuenire cuiusdam determinatæ rationis hyperlogarithmos, & hypologarithmos ad inuicem, & ad logarithmum propiores æqualitati, quàm in data ratione.

*Hy-*



*Hypoth.*

Sit data ratio inæqualitatis  $a$  ad  $b$ ; cuius maior terminus  $a$ , minor  $b$ : & sit determinata quædam ratio  $C$ .

Oportet inuenire hyperlogarithmos, & hypologarithmos ad inuicem, & ad logarithmum rationis  $C$ , propiores æqualitati, quàm in ratione  $a$  ad  $b$ .

*Constr.*

62. *b.* Inueniantur in serie harmonica naturali ab unitate duo termini  $d, e$ , habentes eandem rationem  $C$ ; inter quos hyperlogarithmus  $f$ , ad hypologarithmum  $g$ , sit propior æqualitati, quàm in ratione  $a$  ad  $b$ . Sumanturque minores termini quàm  $d, e$ , eandem habentes rationem  $C$ ; inter quos esto hyperlogarithmus  $h$ ; & esto hypologarithmus  $i$ : & eiusdem rationis  $C$ , esto logarithmus  $k$ .

Dico  $f, g, h, i, k$ , propiores esse æqualitati, quàm in ratione  $a$  ad  $b$ .

*Demonstr.*

54. *b.*  $f$ : maior est, quàm  $h$ .

def. 24<sup>b</sup>  $h$ : maior, quàm  $k$ .

def. 24<sup>b</sup>  $k$ : maior, quàm  $i$ .

56. *b.*  $i$ : maior, quàm  $g$ .

constr.  $f, g$ : propior æqualitati, quàm  $a, b$ .

67. *b.*  $f, h, k, i, g$ , propiores æqualitati, quàm in ratione  $a$  ad  $b$ . Quod &c.

Quare &c.



*Theor. 64. Prop. 69.*

**E**iusdem rationis hyperlogarithmi, hypologarithmi,  
& logarithmus, quasi sunt æquales.

*Demonstr.*

68. b.

Possunt enim inueniri eiusdem rationis hyperlogarithmi, & hypologarithmi, & ad inuicem, & ad logarithmum propiores æqualitati, quàm in data qualibet ratione inæqualitatis. Quare eiusdem rationis hyperlogarithmi, hypologarithmi, & logarithmus, quasi sunt æquales.

*Theor. 65. Prop. 70.*

**Æ**quealtarum numerosarum rationum, æquales sunt logarithmi.

*Demonstr.*

65. b.

Earumdem enim numerosarum rationum, vna tantum quantitas, est logarithmus. Sed æquealtæ, sunt eadem inter se. nam si non essent eadem, cum vel vtraque sit maioris, vel vtraque minoris inæqualitatis; vtrarumque maioris, quæ minor esset, vel vtrarumque minoris inæqualitatis, quæ maior esset, propior esset æqualitati: & non essent inter se æquealtæ; contra hypothesim. Ergo etiam æquealtarum rationum, vna tantum quantitas est logarithmus.

Quare &amp;c.

*Theo-*



*Theor. 66. Prop. 71.*

**N**umerosarum rationum, altioris, maior est logarithmus, & depressioris, minor.

*Hypoth.*

Sunto numerosæ rationes, *A* altior, *B* depressior: & esto ipsius *A*, logarithmus *a*; & ipsius *B*, logarithmus *b*.

Dico *a*, maiorem esse, quàm *b*.

*Prepar.*

61. *b.* | Inueniatur *c*, hypologarithmus rationis *A*; & *d*, hyperlogarithmus rationis *B*; vt sit *c*, maior, quàm *d*.

*Demonstr.*

def. 24 *b.* | *a*: maior, quàm *c*.

constr. | *c*: maior, quàm *d*.

def. 24 *b.* | *d*: maior, quàm *b*.

| *a* maior, quàm *b*. Quod &c. Quare &c.

*Theor. 67. Prop. 72.*

**M**ultiplicatarum numerosarum rationum hyperlogarithmi sunt quasi æquemultiplices: item hypologarithmi, quasi æquemultiplices.

*Hypoth.*

Sunto rationes numerosæ *A*, *B*: & esto *A*, triplicata ipsius *B*.

Dico hyperlogarithmos *A*, hyperlogarithmorum *B*, quasi triplices esse. item hypologarithmos hypologarithmorum.

N n

De-



*Demonstr.*

53. b. | Ex  $B, B$  rationibus deinceps, duplicatæ rationis hyperlogarithmus, est ex hyperlogarithmis utrarumque  $B, B$  compositus. Et ex  $B, B, B$  rationibus deinceps, triplicatæ rationis  $A$ , hyperlogarithmus, est ex hyperlogarithmis trium  $B, B, B$  compositus. item hypologarithmus ex hypologarithmis. Sed rationum  $B, B, B$  deinceps, hyperlogarithmi, sunt quasi æquales: item hypologarithmi, quasi æquales. Ergo componendo, rationis ex duabus  $B, B$ , duplicatæ hyperlogarithmus, ad hyperlogarithmum unius  $B$ , quasi est duplex: & iterum componendo, rationis  $A$ , ex tribus  $B, B, B$ , triplicatæ hyperlogarithmus ad hyperlogarithmum unius  $B$ , quasi est triplex. item hypologarithmus ad hypologarithmum, quasi est triplex. Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 68. Prop. 73.*

**M**ultiplicatarum numerosarum rationum, sunt æquemultiplices logarithmi.

*Hypoth.*

Sunto rationes  $A, B$ , numerosæ: & esto  $A$ , multiplicata ipsius  $B$ .

Dico logarithmum  $A$ , logarithmi  $B$ , totuplicem esse, quotuplicata est  $A$  ad  $B$ .

*De-*



*Demonstr.*

69. b. Hyperlogarithmi, hypologarithmi, & logarithmus  $A$ , sunt quasi æquales: item hyperlogarithmi, hypologarithmi, & logarithmus  $B$ , sunt quasi æquales. Sed hyperlogarithmi  $A$ , ad hyperlogarithmos  $B$ ; & hypologarithmi, ad hypologarithmos, sunt quasi totuplices, quotuplicata est  $A$  ad  $B$ . Ergo hyperlogarithmi  $A$ , ad logarithmum  $B$ , sunt quasi totuplices. Sunt autem logarithmi  $A$ , &  $B$ , quantitates determinatæ. Ergo logarithmus  $A$ , ad logarithmum  $B$ , totuplex est, quotuplicata est  $A$  ad  $B$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 69. Prop. 74.*

**R**ationes numerosæ logarithmicam inter se rationem habentes, logarithmicè sunt proportionales, ut earum logarithmi.

*Hypoth.*

Sunto numerosæ rationes  $A$ ,  $B$ , logarithmicam inuicem rationem habentes: & esto rationis  $A$ , logarithmus  $a$ ; & rationis  $B$ , logarithmus  $b$ .

Dico  $A$  ad  $B$ , esse logarithmicè, sicut  $a$  ad  $b$ .

*Prepar.*

Rationis  $A$ , & quantitatis  $a$ , sumantur multiplicata ratio  $3A$ , & æquemultiplex quantitas  $3a$ ; item rationis  $B$ , & quantitatis  $b$ , multiplicata  $4B$ , & æquemultiplex  $4b$ .

N n 2

De-



*Demonstr.*

*hypoth.* | Rationis  $A$ , logarithmus est  $a$ .  
 73. *b.* | Rationis  $3A$ , logarithmus est  $3a$ .  
*hypoth.* | Rationis  $B$ , logarithmus est  $b$ .  
 73. *b.* | Rationis  $4B$ , logarithmus est  $4b$ .  
 71. *b.* | Si  $3A$ , est altior, quàm  $4B$ ; etiam  $3a$ , est maior,  
 70. *b.* | quàm  $4b$ : si depressior; minor: si æqualta;  
 æqualis.  
*def. 8. 4.* |  $A$  ad  $B$ , est logarithmicè, sicut  $a$  ad  $b$ . Quod &c.  
 Quare &c.

---

*Probl. 6. Prop. 75.*

**D**ata ratione, numerosam depressior inuenire.

*Hypoth.*

Est data ratio  $a$  ad  $b$ : cuius maior terminus  $a$ , minor  $b$ .

Oportet numerosam inuenire depressiorem, quàm  $a$  ad  $b$ .

*Constr.*

Est  $c$ , excessus  $a$  ---  $b$ : & multiplicetur  $c$ , donec fiat maior, quàm  $b$ : & sit multiplicationis numerus  $d$ : cui addita vnitas faciat  $e$ .

Dico  $e$  ad  $d$ , depressiorem esse, quàm  $a$  ad  $b$ .

*Demonstr.*

Quoniam  $cd$ , maior est quàm  $b$ : ergo  $cd+c$ , maior est, quàm  $b+c$ ; idest, maior, quàm  $a$ : &  $cd+c$  ad  $c$ , maior est, quàm  $a$  ad  $c$ : ergo per conuersionem rationis  $cd$

+c



+c ad cd, minor est, quàm a ad b. Sed cd+c ad cd, est  
vt d+u ad d: & e est d+u: ergo e ad d minor est, quàm  
a ad b: & est e. maior, quàm d: ergo e ad d, est depref-  
fior, quàm a ad b. Quod &c.

Quare &c.

*Probl. 7. Prop. 76.*

**D**Atis duabus rationibus non æquealtis, logarithmi-  
cam rationem habentibus: inuenire numerosam  
rationem, depressiorem altiore datarum, & altiore de-  
pressiore.

*Hypoth.*

a g e h b  
c f d

Sunto rationes datae maioris inæqualitatis, a ad b al-  
tior, & c ad d depressior.

Oportet rationem numerosam inuenire, depressiorem,  
quàm a ad b, & altiore, quàm c ad d.

*Constr.*

Sumatur inter a, b, media proportionalis e: & inter c,  
d, media f. Et vt f ad c, ita fiat e ad g: & vt f ad d, ita  
c ad h: & erit ex æquali g ad h, vt c ad d: eritque g, ma-  
ior, quàm h: & erunt g, e, h, tres continuè proportio-  
nales: eritque g maior, quàm e; & e, maior, quàm h.

Et quoniam sicut a ad b, duplicata est rationum a ad  
e, & e ad b; sic g ad h, duplicata est rationum g ad e, &  
e ad h:



$a$   $g$   $e$   $h$   $b$   
 $c$   $f$   $d$   
 $l$   $i$   $k$

18. 4.  $e$  ad  $h$ : permutando erit sicut  $a$  ad  $b$ , altior, quàm  
 $g$  ad  $h$ ; sic  $a$  ad  $e$ , &  $e$  ad  $b$ , altior, quàm  $g$  ad  $e$ ,  
 &  $e$  ad  $h$ : suntque rationes maioris inæqualitatis:  
 ergo  $a$  ad  $e$ , maior est, quàm  $g$  ad  $e$ : &  $a$ , maior,  
 quàm  $g$ . item  $e$  ad  $b$ , maior est, quàm  $e$  ad  $h$ : &  
 $h$ , maior, quàm  $b$ .

Duarum quantitatum  $h$  ---  $b$ , vel  $b$ , sumatur vna non  
 maior, quàm altera: quæ sit  $h$  ---  $b$ : cuius æqualiter diuise  
 secundum quemlibet numerum particula sit  $i$ . & multipli-  
 cetur  $i$ , donec fiat primò maior, quàm  $b$ : & esto multi-  
 plicationis numerus  $k$ . Deinde multiplicetur  $i$ , donec fiat  
 primò maior, quàm  $g$ : & sit multiplicationis numerus  $l$ .

Dico  $l$  ad  $k$ , depressoire esse, quàm  $a$  ad  $b$ : altiore,  
 quàm  $c$  ad  $d$ .

*Demonstr.*

Maior est  $h$  ---  $b$ , quàm  $i$ : sed  $Ki$  ---  $b$  non maior: ergo  
 $h$  ---  $b$ , maior est, quàm  $Ki$  ---  $b$ : &  $h$ , maior, quàm  $Ki$ : &  
 est  $Ki$  maior, quàm  $b$ . Deinde  $a$  ad  $e$ , est vt  $e$  ad  $b$ : &  $e$   
 ad  $g$ , est vt  $h$  ad  $e$ : ergo ex æquali in perturbata,  $a$  ad  $g$ ,  
 est vt  $h$  ad  $b$ . & permutando  $a$  ad  $h$ , vt  $g$  ad  $b$ : &  $a$  ---  $g$   
 ad  $h$  ---  $b$  vt  $a$  ad  $g$ : sed  $a$  maior est, quàm  $g$ : ergo  $a$  ---  $g$ ,  
 maior est, quàm  $h$  ---  $b$ : sed  $h$  ---  $b$ , maior est, quàm  $i$ : er-  
 go  $a$  ---  $g$ , maior est, quàm  $i$ . sed  $li$  ---  $g$ , non maior est,  
 quàm  $i$ , ergo  $a$  ---  $g$ , maior est, quàm  $li$  ---  $g$ : ergo  $a$  ma-  
 ior



ior est, quàm  $li$ . Ergo  $li$  ad  $ki$ , vel  $l$  ad  $k$  minor est, quàm  $a$  ad  $b$ : & sunt maioris inæqualitatis: ergo  $l$  ad  $K$  depressiore est, quàm  $a$  ad  $b$ . Quod &c. Rursum  $li$  maior est, quàm  $g$ : &  $h$  maiore est quàm  $Ki$ . Ergo  $li$  ad  $Ki$ , vel  $l$  ad  $K$ , maior est, quàm  $g$  ad  $h$ , vel quàm  $c$  ad  $d$ : & sunt maioris inæqualitatis rationes: ergo  $l$  ad  $K$ , altior est, quàm  $c$  ad  $d$ . Quod &c.

Quare &c.

*Probl. 8. Prop. 77.*

**D**ata qualibet non numerosa ratione, dataque altera qualibet ratione inæqualitatis: duas numerosas rationes inuenire altiore & depressiore, quàm data non numerosa; logarithmicè proportionales, vt numerus ad numerum; propiores æqualitati logarithmicæ, quàm sit data altera ratio.

*Hypoth.*

Sit data qualibet ratio non numerosa; cuius maior terminus  $a$ , minor  $b$ : & sit data altera ratio inæqualitatis; cuius maior terminus  $c$ , minor  $d$ .

Oportet inuenire duas rationes numerosas, altiore, quàm  $a$  ad  $b$ , & depressiore, quàm  $a$  ad  $b$ ; logarithmicè proportionales, vt numerus ad numerum: sed vt altior ad depressiore logarithmicè sit minor, quàm vt  $c$  ad  $d$ .

*Constr.*

175. b. | Inueniatur ratio numerosa  $e$  ad  $f$ , depressior, quàm  $c$  ad  $d$ . sumaturque numerus  $g$ , pariter par, ma-



53. 3. maior quàm  $c$ : & quotus est  $g$ , subtoruplicata,  
 rationis  $a$  ad  $b$ , ratio inueniatur  $h$  ad  $i$ : & inue-  
 niatur numerosa ratio  $K$  ad  $l$ , depressior, quàm  
 $h$  ad  $i$ : & rationis  $K$  ad  $l$ , sumantur duplicata,  
 triplicata, & deinceps reliquæ multiplicata, donec  
 fiat ratio  $M$ , primò altior, quàm  $a$  ad  $b$ : & sit  
 multiplicationis numeris  $m$ : qui vnitate multatus,  
 relinquatur  $n$ : & quotus est  $n$ , totuplicata, ratio-  
 nis  $K$  ad  $l$ , fiat ratio  $N$ .

Dico rationem  $N$  depressiorem esse, quàm  $a$  ad  $b$ : &  
 $M$  ad  $N$  logarithmicè minorem esse, quàm vt.  $c$  ad  $d$ .

*Demonstr.*

Si enim ratio  $N$ , non esset depressior, quàm  $a$  ad  $b$ :  
 esset vel æquealta, vel altior. Sed non est altior alioquin  
 $M$ , non esset primò altior, quàm  $a$  ad  $b$ . neque est æque-  
 alta, alioquin esset eadem, atque  $a$  ad  $b$ : & esset etiam  $a$   
 ad  $b$  ratio numerosa, contra hypothesim. Ergo ratio  $N$ ,  
 est depressior, quàm  $a$  ad  $b$ .

Deinde quoniam  $K$  ad  $l$ , est depressior, quàm  
 $h$  ad  $i$ : &  $h$  ad  $i$ , totuplicata quotus est  $g$ , est  $a$   
 19. 4. ad  $b$ : ergo  $K$  ad  $l$ , totuplicata quotus est  $g$ , est  
 depressior, quàm  $a$  ad  $b$ . sed  $K$  ad  $l$ , totuplicata  
 5. 3. quotus est  $m$ , est altior, quàm  $a$  ad  $b$ . Ergo nu-  
 def. p. 4. merus  $m$ , maior est, quàm  $g$ : sed  $g$ , est maior,  
 quàm  $c$ : ergo  $m$ , multò est maior, quàm  $c$ : & est  
 $m$  ad vnitatem, maior, quàm  $e$  ad eandem vni-  
 tatem: & per conuersionem rationis,  $m$  ad  $n$ , mi-  
 nor

nor



*constr.* | nor est, quàm  $e$  ad  $f$ . Sed vt  $m$  ad  $n$ , ita logari-  
 17. 4. | thmicè est ratio  $M$  ad rationem  $N$ . ergo ratio  
 |  $M$  ad rationem  $N$ , minor est logarithmicè, quàm  
 | vt  $e$  ad  $f$ . & multò minor, quàm vt  $c$  ad  $d$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 70. Prop. 78.*

**N**on numerosæ rationis vna tantum quantitas est lo-  
 garithmus.

*Hypoth. p.*

Estio ratio  $a$  ad  $b$  non numerosa: sintque duæ quanti-  
 tates inæquales,  $c$  maior,  $d$  minor: quarum vna  $c$ , estio lo-  
 garithmus rationis  $a$  ad  $b$ .

Dico  $d$ , non esse logarithmum rationis  $a$  ad  $b$ .

*Præpar.*

77. b. | Inueniantur duæ rationes numerosæ,  $E$  altior,  
 | quàm  $a$  ad  $b$ , &  $F$  depressior: vt sit  $E$  ad  $F$ , lo-  
 | garithmicè sicut numerus ad numerum, & minor,  
 | quàm vt  $c$  ad  $d$ . & assignentur ipsarum  $E$ ,  $F$  ra-  
 | tionum, logarithmi  $e$ ,  $f$ .

*Demonstr.*

*præpar.* |  $E$ ;  $F$ : logarithmicè minor, quàm  $e$ ;  $d$ .

74. b. |  $E$ ;  $F$ :  $e$ ;  $f$ .

17. 4. |  $e$ ;  $f$ : minor, quàm  $c$ ;  $d$ .

def. 34<sup>b</sup> |  $e$ : maior, quàm  $c$ .

63. b. |  $f$ : maior, quàm  $d$ .

def. 34<sup>b</sup> |  $d$ , non est logarithmus rationis  $a$  ad  $b$ . Quod &c.

O o

Hy-



*Hypoth. 2.*Eſto  $d$ , logarithmus rationis  $a$  ad  $b$ .Dico  $c$ , non eſſe logarithmum rationis  $a$  ad  $b$ .*Demonſtr.**ſup.* |  $e$ ;  $f$ : minor, quàm  $c$ ;  $d$ .2. 3. |  $f$ ;  $e$ : maior, quàm  $d$ ;  $c$ .*def. 34<sup>b</sup>* |  $f$ : minor, quàm  $d$ .64. *b.* |  $e$ : minor, quàm  $c$ .*def. 34<sup>b</sup>* |  $c$ , non eſt logarithmus rationis  $a$  ad  $b$ . Quod &c.

Quare &amp;c.

*Theor. 71. Prop. 79.***N**on numerofarum rationum, altioris maior eſt logarithmus, & depreſſioris minor.*Hypoth.*Sunt non numerofæ rationes,  $A$  altior,  $B$  depreſſior: & eſto ipſius  $A$ , logarithmus  $a$ ; & ipſius  $B$ , logarithmus  $b$ .Dico  $a$ , maiorem eſſe, quàm  $b$ .*Præpar.*76. *b.* | Inter  $A$ ,  $B$  rationes, inueniatur numerofa ratio  $C$ , depreſſior, quàm  $A$ , altior quàm  $B$ : cuius logarithmus eſto  $c$ .*Demonſtr.**def. 34<sup>b</sup>* |  $a$ : maior eſt, quàm  $c$ .*def. 34<sup>b</sup>* |  $c$ : maior, quàm  $b$ .|  $a$ : maior, quàm  $b$ . Quod &c. Quare &c.*Theo-*



Theor. 72. Prop. 80.

**M**ultiplicatarum rationum, sunt æquemultiplices logarithmi.

*Hypoth.*

Est ratio *A* rationis *B* triplicata: & esto rationis *A*, logarithmus *a*; & rationis *B*, logarithmus *b*.

Dico *a* ad *b* triplicem esse.

*Hypothesis contradictoria in primo casu.*

|          |          |          |          |                   |
|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|          | <i>c</i> | <i>d</i> |          |                   |
| <i>E</i> | <i>A</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>B</i> <i>H</i> |
| <i>e</i> | <i>a</i> | <i>f</i> | <i>g</i> | <i>b</i> <i>h</i> |

Est si fieri potest *a* maior, quàm triplex ad *b*.

*Præpar.*

76. *b.* | Inter rationem *a* ad *b* altio rem, & rationem triplicem depressiorem, ratio numerosa sumatur *c* ad  
 77. *b.* | *d*, depressior, quàm *a* ad *b*, altior, quàm triplex, & ut *a*, sit maior, quàm *c*; & *d*, maior, quàm *b*.  
 Et inueniantur duæ numerosæ rationes, *E* altior quàm *A*, & *F* depressior: ut sit *E* ad *F* logarithmicè sicut numerus ad numerum, & minor, quàm  
 77. *b.* | ut *a* ad *c*. Item inueniantur duæ numerosæ rationes, *G* altior quàm *B*, & *H* depressior: ut sit *G* ad *H* logarithmicè sicut numerus ad numerum, & minor quàm ut *d* ad *b*. Sint autem rationum *E*,  
 | *E*, *G*, *H*, logarithmi *e*, *f*, *g*, *h*.

○ ○ 2

De-



$E$   $A$   $F$   
 $e$   $a$   $f$

$G$   $B$   $H$   
 $g$   $l$   $h$

## Demonstr.

- prepar.  $A$ : altior, quàm  $F$ .  
 14. 4.  $A$ ;  $B$ : logarithmicè maior, quàm  $F$ ;  $B$ .  
 prepar.  $G$ : altior, quàm  $B$ .  
 14. 4.  $F$ ;  $B$ : logarithmicè maior, quàm  $F$ ;  $G$ .  
 17. 4.  $A$ ;  $B$ : logarithmicè maior, quàm  $F$ ;  $G$ .  
 hypoth.  $A$ ;  $B$ : triplicata.  
 17. 4.  $F$ ;  $G$ : depressior, quàm triplicata.  
 74. b.  $F$ ;  $G$ : logarithmicè  $f$ ;  $g$ .  
 17. 4.  $f$ ;  $g$ : minor, quàm triplex.  
 prepar.  $E$ ;  $F$ : logarithmicè minor, quàm  $a$ ;  $c$ .  
 74. b.  $E$ ;  $F$ : logarithmicè  $e$ ;  $f$ .  
 17. 4.  $e$ ;  $f$ : minor, quàm  $a$ ;  $c$ .  
 def. 34b  $e$ : maior, quàm  $a$ .  
 63. b.  $f$ : maior, quàm  $c$ .  
 prepar.  $G$ ;  $H$ : logarithmicè minor, quàm  $d$ ;  $b$ .  
 74. b.  $g$ ;  $h$ : logarithmicè  $G$ ;  $H$ .  
 17. 4.  $g$ ;  $h$ : minor, quàm  $d$ ;  $b$ .  
 2. 3.  $h$ ;  $g$ : maior, quàm  $b$ ;  $d$ .  
 def. 32b  $h$ : minor, quàm  $b$ .  
 64. b.  $g$ : minor, quàm  $d$ .  
 67. b.  $f$ ;  $g$ : maior, quàm  $c$ ;  $d$ .  
 prepar.  $c$ ;  $d$ : maior, quàm triplex.

$f$ ;  $g$ :



13. 5.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{si } g: \text{ maior, quàm triplex.} \\ \text{sup. } \text{si } g: \text{ minor, quàm triplex.} \end{array} \right\}$  quæ sunt contradi-  
ctoria.

Ergo  $a$  ad  $b$ , non est maior, quàm triplex.

*Hypoth. contrad. in secundo casu.*

$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & d \\ c & & & & & & \\ E & A & F & & G & B & H \\ & e & a & f & & g & b & h \end{array}$

Esto si fieri potest  $a$  minor, quàm triplex ad  $b$ .

*Præpar.*

76. b. Inter rationem  $a$  ad  $b$  depresso-rem, & ratio-  
nem triplicem altio-rem ratio numero-  
sa sumatur  
77. b.  $c$  ad  $d$ , depresso-rior, quàm triplex; altior, quàm  $a$   
ad  $b$ : & ut  $c$  sit maior quàm  $a$ : &  $b$  maior, quàm  
77. b.  $d$ . Et inueniantur duæ numero-  
sæ rationes,  $E$  al-  
tior quàm  $A$ , &  $F$  depresso-rior; ut sit  $E$  ad  $F$  lo-  
garithmicè, sicut numerus ad numerum, & minor,  
quàm ut  $c$  ad  $a$ . Item inueniantur duæ numero-  
sæ rationes;  $G$  altior, quàm  $B$ ; &  $H$ , depresso-rior;  
ut sit  $G$  ad  $H$ , logarithmicè sicut numerus ad nu-  
merum, & minor, quàm ut  $b$  ad  $d$ . Sint autem ra-  
tionum  $E, F, G, H$ , logarithmi  $e, f, g, h$ .

*Demonstr.*

*præpar.*  $E$ : altior, quàm  $A$ .

14. 4.  $E; H$ : logarithmicè maior, quàm  $A; H$ .

*præpar.*  $B$ : altior, quàm  $H$ .

14. 4.  $A; H$ : logarithmicè maior, quàm  $A; B$ .

17. 4.  $E; H$ : logarithmicè maior, quàm  $A; B$ .

$A; B$ :



|     |     |     |     |  |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| $c$ | $E$ | $A$ | $F$ |  | $G$ | $B$ | $H$ | $d$ |
|     | $e$ | $a$ | $f$ |  | $g$ | $b$ | $h$ |     |

- hypoth.* |  $A; B$ : triplicata.
17. 4. |  $E; H$ : maior, quàm triplicata.
74. b. |  $e; h$ : logarithmicè vt  $E; H$ .
17. 4. |  $e; h$ : maior, quàm triplex.
- præpar.* |  $E; F$ : minor, quàm  $c; a$ .
74. b. |  $E; F$ : logarithmicè vt  $e; f$ .
17. 4. |  $e; f$ : minor, quàm  $c; a$ .
2. 3. |  $f; e$ : maior, quàm  $a; c$ .
- def. 34b |  $f$ : minor, quàm  $a$ .
64. b. |  $c$ : minor, quàm  $c$ .
- præpar.* |  $G; H$ : logarithmicè minor, quàm  $b; d$ .
74. b. |  $g; h$ : logarithmicè, vt  $G; H$ .
17. 4. |  $g; h$ : minor, quàm  $b; d$ .
- def. 32b |  $g$ : maior, quàm  $b$ .
63. b. |  $h$ : maior, quàm  $d$ .
67. b. |  $e; h$ : minor, quàm  $c; d$ .
- præpar.* |  $c; d$ : minor, quàm triplex.
13. 5. |  $e; h$ : minor, quàm triplex. } quæ sunt contradi-
- inp.* |  $e; h$ : maior, quàm triplex. } ctoria.

Ergo  $a$  ad  $b$ , non est minor, quàm triplex.

Ergo  $a$  ad  $b$  est triplex. Quod &c.

Quare &c.

Theo-



**O**mnifariam rationes, logarithmicam inter se rationem habentes, logarithmicè sunt proportionales, ut earum logarithmi. *Hypoth.*

Dico  $A$  ad  $B$ , esse logarithmicè, sicut  $a$  ad  $b$ .

Sunto rationes  $A$ ,  $B$ , logarithmicam inuicem rationem habentes: & esto rationis  $A$ , logarithmus  $a$ ; & rationis  $B$ , logarithmus  $b$ .

*Præpar.*

Rationis  $A$ , & quantitatis  $a$ , sumantur multiplicata ratio  $3A$ , & æquemultiplex quantitas  $3a$ : item rationis  $B$ , & quantitatis  $b$ , multiplicata  $4B$ , & æquemultiplex  $4b$ .

*Demonstr.*

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>hypoth.</i>       | Rationis $A$ , logarithmus est $a$ .                                                                              |
| 80. <i>b.</i>        | Rationis $3A$ , logarithmus est $3a$ .                                                                            |
| <i>hypoth.</i>       | Rationis $B$ , logarithmus est $b$ .                                                                              |
| 80. <i>b.</i>        | Rationis $4B$ , logarithmus est $4b$ .                                                                            |
| def. 34. <i>b.</i>   | Si $3A$ , est altior, quàm $4B$ ; etiam $3a$ , est maior, quàm $4b$ : si depressior; minor: si æquealta; equalis. |
| def. 8. 4. <i>b.</i> | $A$ ad $B$ , est logarithmicè, sicut $a$ ad $b$ . Quod &c. Quare &c.                                              |

Theor. 74. Prop. 82.

**D**Varum quarumlibet numerosarum rationum, hyperlogarithmus unius ad hypologarithmum alterius, maior est, quàm ut logarithmus ad logarithmum.

*De-*



*Demonstr.*

def. 24b | Est enim hyperlogarithmus vnus, eiusdem lo-  
 37. 26b | garithmo maior: & est hypologarithmus alterius,  
 3. 5. | minor eiusdem logarithmo. Ergo hyperlogari-  
 p. 3. | thmus ad logarithmum vnus, maior est, quàm vt  
 | hypologarithmus ad logarithmum alterius. Quare  
 | permutando, vnus hyperlogarithmus ad hypo-  
 | logarithmum alterius, maior est, quàm vt logari-  
 | thmus ad logarithmum.

*Probl. 9. Prop. 83.*

**D**Varum datarum non æquealtarum numerosarum  
 rationum, datis terminis altioris: inuenire termi-  
 nos depressioris, inter quos ad hyperlogarithmum, maior  
 sit hyperlogarithmus altioris, quàm vt logarithmus ad lo-  
 garithmum.

*Hypoth.*

Sint datæ duæ non æquealtæ numerosæ rationes, *A* al-  
 tior, *B* depressior: sintque rationis *A*, dati termini *c*, *d*.

Oportet rationis *B* terminos inuenire, inter quos ad  
 hyperlogarithmum, maior est hyperlogarithmus inter *c*,  
*d*; quàm vt logarithmus *A* ad logarithmum *B*.

*Constr.*

Sumatur inter *c*, *d*, hyperlogarithmus *e*: & in-  
 54. b. | ter alios quoslibet eiusdem rationis *A* terminos  
 62. b. | minores, quàm *c*, *d*, sumatur alius minor hyper-  
 | logarithmus *f*: & inueniantur termini *g*, *h*, in ra-  
 | tione



tione  $B$ , inter quos hyperlogarithmus  $i$ , ad hypologarithmum  $K$ , propior sit æqualitati, quàm vt  $e$  ad  $f$ .

Dico  $e$  ad  $i$  maiorem esse, quàm vt logarithmus rationis  $A$ , ad logarithmum rationis  $B$ .

*Præpar.*

Esto  $a$ , logarithmus rationis  $A$ : &  $b$ , logarithmus rationis  $B$ .

*Demonstr.*

def. 24b. |  $f$ : maior est, quàm  $a$ .

8. 5. |  $e$ ;  $a$ : maior, quàm  $e$ ;  $f$ .

constr. |  $e$ ;  $f$ : maior, quàm  $i$ ;  $k$ .

def. 24b. |  $b$ : maior, quàm  $k$ .

8. 5. |  $i$ ;  $k$ : maior, quàm  $i$ ;  $b$ .

13. 5. |  $e$ ;  $a$ : maior, quàm  $i$ ;  $b$ .

p. 3. |  $e$ ;  $i$ : maior, quàm  $a$ ;  $b$ . Quod &c.

Quare &c.

*Probl. 10. Prop. 84.*

**D**Varium datarum non æquealtarum numerosarum rationum, datis terminis depressioris: inuenire terminos altioris, inter quos hyperlogarithmus, ad hyperlogarithmum depressioris, minor sit, quàm vt logarithmus ad logarithmum.

*Hypoth.*

Sint datae duæ non æquealtæ numerosæ rationes,  $A$  altior,  $B$  depressior: sintque rationis  $B$  dati termini  $c$ ,  $d$ .

Oportet rationis  $A$  terminos inuenire, inter quos hy-

P p

per-



perlogarithmus, ad hyperlogarithmum inter  $c$ ,  $d$  minor est, quàm vt logarithmus  $A$  ad logarithmum  $B$ .

*Constr.*

Sumatur inter  $c$ ,  $d$ , hyperlogarithmus  $e$ : & inter alios quoslibet minores terminos, quàm  $c$ ,  $d$ ,  
 54.  $b$ . sumatur eiusdem rationis  $B$  alius minor hyper-  
 62.  $b$ . logarithmus  $f$ : rationis autem  $A$ , inueniantur termini,  $g$ ,  $h$ , inter quos hyperlogarithmus  $i$ , ad hypologarithmum  $k$ , minor sit, quàm vt  $e$  ad  $f$ .

Dico  $i$  ad  $e$ , minorem esse, quàm vt logarithmus  $A$  ad logarithmum  $B$ .

*Præpar.*

Esto  $a$ , logarithmus rationis  $A$ : &  $b$ , logarithmus rationis  $B$ .

*Demonstr.*

def. 24b |  $a$ : maior est, quàm  $K$ .

8. 5. |  $i$ ;  $a$ : minor, quàm  $i$ ;  $K$ .

constr. |  $i$ ;  $K$ : minor, quàm  $e$ ;  $f$ .

def. 24b |  $b$ : minor, quàm  $f$ .

8. 5. |  $e$ ;  $f$ : minor, quàm  $e$ ;  $b$ .

13. 5. |  $i$ ;  $a$ : minor, quàm  $e$ ;  $b$ .

p. 3. |  $i$ ;  $e$ : minor, quàm  $a$ ;  $b$ . Quod &c.

Quare &c.

*Probl. II. Prop. 85.*

**D**Varum datarum non æquealtarum numerosarum rationum, datis terminis altioris: inuenire terminos



nos depressioris, inter quos ad hypologarithmum minor fit hypologarithmus altioris, quàm ut logarithmus ad logarithmum.

*Hypoth.*

Sint datae duae non æqualtae rationes numerosæ,  $A$  altior,  $B$  depressior: sintque rationis  $A$  dati termini  $c, d$ .

Oportet rationis  $B$  terminos inuenire, inter quos ad hypologarithmum minor fit hypologarithmus inter  $c, d$ , quàm ut logarithmus  $A$  ad logarithmum  $B$ .

*Constr.*

Sumatur inter  $c, d$ , hypologarithmus  $e$ : & inter alios terminos eiusdem rationis  $A$ , minores quàm  $c, d$ , sumatur alius maior hypologarithmus  $f$ : & inueniantur in ratione  $B$ , termini  $g, h$ ; inter quos hypologarithmus  $i$  ad hyperlogarithmum  $k$  maior sit, quàm ut  $e$  ad  $f$ .

Dico  $e$  ad  $i$ , minorem esse, quàm ut logarithmus  $A$  ad logarithmum  $B$ .

*Præpar.*

Esto  $a$ , logarithmus rationis  $A$ : &  $b$ , logarithmus rationis  $B$ .

*Demonstr.*

*constr.* |  $e, f$ : minor, quàm  $i, k$ .

*p. 3.* |  $e, i$ : minor, quàm  $f, k$ .

*def. 24b* |  $k$ : maior, quàm  $b$ .

*8. 5.* |  $f, k$ : minor, quàm  $f, b$ .

*def. 24b* |  $a$ : maior, quàm  $f$ .

Pp 2

$f, b$ :



8.5. |  $f; b$ : minor, quàm  $a; b$ .

13.5. |  $e; i$ : minor, quàm  $a; b$ . Quod &c.

Quare &c.

Probl. 12. Prop. 86.

**D**Varum datarum non æquealtarum numerosarum rationum, datis terminis depressioris: inuenire terminos altioris, inter quos hypologarithmus ad hypologarithmum depressioris, maior sit, quàm vt logarithmus ad logarithmum.

*Hypoth.*

Sint datae duæ non æqualtæ numerosæ rationes,  $A$  altior,  $B$  depressior: sintque rationis  $B$  dati termini  $c, d$ .

Oportet rationis  $A$  terminos inuenire, inter quos hypologarithmus ad hypologarithmum inter  $c, d$ , maior est, quàm vt logarithmus  $A$  ad logarithmum  $B$ .

*Constr.*

Sumatur inter  $c, d$ , hypologarithmus  $e$ : & inter alios minores terminos, eiusdem rationis  $B$ , sumatur alius maior hypologarithmus  $f$ : & rationis  $A$ , inueniantur termini  $g, h$ , quos inter hypologarithmus  $i$  ad hyperlogarithmum  $K$  maior sit, quàm vt  $e$  ad  $f$ .

Dico  $i$  ad  $e$ , maiorem esse, quàm vt logarithmus  $A$  ad logarithmum  $B$ .

*Prepar.*

Esto rationis  $A$ , logarithmus  $a$ : & rationis  $B$  logarithmus  $b$ .

De



*Demonstr.*

- constr.* |  $i; K$ : maior est, quàm  $e; f$ .  
*p. 3.* |  $i; e$ : maior, quàm  $K; f$ .  
*def. 24b* |  $b$ : maior, quàm  $f$ .  
*8. 5.* |  $K; f$ : maior, quàm  $K; b$ .  
*def. 24b* |  $K$ : maior, quàm  $a$ .  
*8. 5.* |  $K; b$ : maior, quàm  $a; b$ .  
*13. 5.* |  $i; e$ : maior, quàm  $a; b$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 75. Prop. 87.*

**A**rithmetice dispositorum terminorum ratio, quàm habent bini minores ad inuicem, altior est ratione, quàm habent bini maiores.

*Hypoth.*

- Sint arithmetice dispositæ quantitates  $a, b, c, d$ :  
*4. b.* | & sit  $a$  minor, quàm  $c$ . unde quoniam permutando  $a, c, b, d$ , sunt arithmetice dispositæ, etiam  
*def. 5. b.* |  $b$  est minor, quàm  $d$ .

Dico rationes terminorum  $a, b$  ad inuicem, altiores esse rationibus  $c, d$  ad inuicem.

*Præpar.*

Quoniam  $a, b$  sunt inæquales; esto  $a$  minor, quàm  $b$ : & sit defectus  $e$ .

*Demonstr.*

- sup.* |  $b$ : minor, quàm  $d$ .  
*8. 5.* |  $b; e$ : minor, quàm  $d; e$ .

$b; a$ :



3. 3. |  $b$ ;  $a$ : maior, quàm  $d$ ;  $c$ .  
*hypoth.* |  $b$ : maior, quàm  $a$ . &  $d$ : maior, quàm  $c$ .  
*def.p. 4.* |  $b$ ;  $a$ : altior, quàm  $d$ ;  $c$ . Quod &c.  
 2. 3. |  $a$ ;  $b$ : minor, quàm  $c$ ;  $d$ .  
*hypoth.* |  $a$ : minor, quàm  $b$ . &  $c$ : minor, quàm  $d$ .  
*def.p. 4.* |  $a$ ;  $b$ : altior, quàm  $c$ ;  $d$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theor. 76. Prop. 88.*

**H** Armonicè dispositum terminorum ratio, quàm habent bini maiores ad inuicem, altior est ratione, quàm habent bini minores.

*Hypoth.*

34.  $b$ . | Sint harmonicè dispositæ quantitates  $a, b, c, d$ :  
*def. 13b* | & sit  $a$  maior, quàm  $c$ . vnde quoniam permutando  
 |  $a, c, b, d$ , sunt harmonicè dispositæ, etiam  $b$ , est  
 | maior, quàm  $d$ .

Dico rationes terminorum  $a, b$  ad inuicem, altiores esse rationibus  $c, d$  ad inuicem.

*Præpar.*

Sumatur vna quælibet quantitas  $e$ : & fiat

$a$ ;  $e$ ;  $c$ ;  $f$ .

$b$ ;  $e$ ;  $c$ ;  $g$ .

$c$ ;  $e$ ;  $e$ ;  $h$ .

$d$ ;  $e$ ;  $c$ ;  $i$ .

*De-*



*Demonstr.*

33. b. | *f, g, g, i* sunt arithmetice ordinate.

constr. | *c; e; e; h. e; a; f; e.*

p. p. | *c; a; f; h.*

| *c* minor, quàm *a.* & *f* minor, quàm *h.*

def. 5. b. | *g* minor, quàm *i.*

87. b. | *f; g*: altior, quàm *h; i.* & *g; f*: altior, quàm *i; h.*

sup. | *f; g*: *b; a.* & *g; f*: *a; b.*

sup. | *h; i*: *d; c.* & *i; h*: *c; d.*

| *b; a*: altior, quàm *d; c.* & *a; b*: altior, quàm

| *c; d.* Quod &c. Quare &c.

*Theor. 77. Prop. 89.*

**S**I fuerint quotcunque magnitudines, & aliæ ipsis æquales numero; sitque maior proportio primæ priorum, ad primam posteriorum, quàm secundæ, ad secundam; & hæc maior, quàm tertiæ, ad tertiam: & sic deinceps: habebunt omnes priores simul, ad omnes posteriores simul, maiorem rationem, quàm omnes priores, relictæ prima, ad omnes posteriores, relictæ quoque prima: & multò maiorem, quàm omnes priores, relictis duabus primis, ad omnes posteriores, relictis duabus primis: & sic deinceps etiam maiorem, quàm vltima, ad vltimam: sed minorem, quàm omnes priores, relictæ vltima, ad omnes posteriores, relictæ etiam vltima: & multò minorem, quàm omnes priores, relictis duabus vltimis, ad omnes posteriores, relictis pariter duabus vltimis: & sic deinceps etiam minorem, quàm prima, ad primam.

*Hy-*



*Hypoth.*

$a$       $e$   
 $b$       $f$   
 $c$       $g$   
 $d$       $h$

$a$ ;  $e$ : maior, quàm  $b$ ;  $f$ .

$b$ ;  $f$ : maior, quàm  $c$ ;  $g$ .

$c$ ;  $g$ : maior, quàm  $d$ ;  $h$ .

Dico  $a+b+c+d$ ;  $e+f+g+h$ : maiorem esse, quàm  $b+c+d$ ;  $f+g+h$ .

Et  $b+c+d$ ;  $f+g+h$ : maiorem, quàm  $c+d$ ;  $g+h$ .

Et  $c+d$ ;  $g+h$ : maiorem, quàm  $d$ ;  $h$ .

Dico etiam  $a+b+c+d$ ;  $e+f+g+h$ : minorem esse, quàm  $a+b+c$ ;  $e+f+g$ .

Et  $a+b+c$ ;  $e+f+g$ : minorem, quàm  $a+b$ ;  $e+f$ .

Et  $a+b$ ;  $e+f$ : minorem, quàm  $a$ ;  $e$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* |  $c$ ;  $g$ : maior, quàm  $d$ ;  $h$ .

*p. 3.* |  $c$ ;  $d$ : maior, quàm  $g$ ;  $h$ .

*p. 3.* |  $c+d$ ;  $d$ : maior, quàm  $g+h$ ;  $h$ .

*p. 3.* |  $c+d$ ;  $g+h$ : maior, quàm  $d$ ;  $h$ . Quod &c.

*3. 3.* |  $c+d$ ;  $c$ : minor, quàm  $g+h$ ;  $g$ .

*2. 3.* |  $c$ ;  $c+d$ : maior, quàm  $g$ ;  $g+h$ .

*p. 3.* |  $c$ ;  $g$ : maior, quàm  $c+d$ ;  $g+h$ .

*hypoth.* |  $b$ ;  $f$ : maior, quàm  $c$ ;  $g$ .

*13. 5.* |  $b$ ;  $f$ : maior, quàm  $c+d$ ;  $g+h$ .

*p. 3.* |  $b$ ;  $c+d$ : maior, quàm  $f$ ;  $g+h$ .

 $b+c$



- p. 3. |  $b+c+d$ ;  $c+d$ : maior, quàm  $f+g+h$ ;  $g+h$ .
- p. 3. |  $b+c+d$ ;  $f+g+h$ : maior, quàm  $c+d$ ;  $g+h$ . Quod &c.
- sup. |  $a+b+c+d$ ;  $e+f+g+h$ : maior, quàm  $b+c+d$ ;  $f+g+h$ . Quod &c.
- hypoth. |  $a$ ;  $e$ : maior, quàm  $b$ ;  $f$ .
- p. 3. |  $a$ ;  $b$ : maior, quàm  $e$ ;  $f$ .
- p. 3. |  $a+b$ ;  $b$ : maior, quàm  $e+f$ ;  $f$ .
3. 3. |  $a+b$ ;  $a$ : minor, quàm  $e+f$ ;  $e$ .
- p. 3. |  $a+b$ ;  $e+f$ : minor, quàm  $a$ ;  $e$ . Quod &c.
- sup. |  $a+b$ ;  $b$ : maior, quàm  $e+f$ ;  $f$ .
- p. 3. |  $a+b$ ;  $e+f$ : maior, quàm  $b$ ;  $f$ .
- hypoth. |  $b$ ;  $f$ : maior, quàm  $c$ ;  $g$ .
13. 5. |  $a+b$ ;  $e+f$ : maior, quàm  $c$ ;  $g$ .
- p. 3. |  $a+b$ ;  $c$ : maior, quàm  $e+f$ ;  $g$ .
- p. 3. |  $a+b+c$ ;  $c$ : maior, quàm  $e+f+g$ ;  $g$ .
3. 3. |  $a+b+c$ ;  $a+b$ : minor, quàm  $e+f+g$ ;  $e+f$ .
- p. 3. |  $a+b+c$ ;  $e+f+g$ : minor, quàm  $a+b$ ;  $e+f$ .  
Quod &c.
- sup. |  $a+b+c+d$ ;  $e+f+g+h$ : minor, quàm  $a+b+c$ ;  $e+f+g$ . Quod &c.
- Quare &c.

---

Theor. 78. Prop. 90.

**E** Serie harmonica naturali ab unitate, terminorum  
 harmonicè dispositorum, altioris rationis maior  
 terminus, ad maiorem depressioris, maior est, quàm ut hy-  
 perlogarithmus, ad hyperlogarithmum: & hyperlogari-  
 Qq thmus,



thmus, ad hyperlogarithmum, maior, quàm vt hypologarithmus, ad hypologarithmum: & hypologarithmus, ad hypologarithmum maior, quàm vt minor terminus, ad minorem.

*Hypoth.*

Sint è serie harmonica naturali ab vnitte, termini harmonicè dispositi  $a, b, c, d$ , quorum altior sit ratio  $a$  ad  $b$ , quàm  $c$  ad  $d$ . Sitque  $a$ , maior, quàm  $b$ : ideoque &  $c$ , maior, quàm  $d$ .  
def. 13b

Quoniam  $a$  ad  $b$ , altior est, quàm  $c$  ad  $d$ : oportet  $a$ , maiorem esse, quàm  $c$ ; &  $b$ , quàm  $d$ . alioquin permutando, dispositorem harmonicè  $a, c, b, d$ , esset  $c$  maior, quàm  $a$ ; ideoque &  $d$  maior, quàm  $b$ ; &  $c$  ad  $d$ , altior ratio, quàm  $a$  ad  $b$ ,  
34. b.  
def. 13. b.  
38. b.  
contra hypoth.

Deinde quoniam  $a, b, c, d$ , sunt in serie harmonica naturali ab vnitte, harmonicè dispositi; sunt denominati à numeris arithmeticè dispositis: 27. b.  
26. b.  
24. b.  
def. 5. b.  
27. b.  
quorum denominator  $a$ , reciprocè minor est denominatore  $b$ , necnon reciprocè minor denominatore  $c$ . & quot sunt numeri omnes medij inter denominatores  $a, b$ ; totidem sunt inter denominatores  $c, d$ : totidemque in serie harmonica sunt inter  $a, b$ ; totidemque etiam inter  $c, d$ .

Sint ergo inter  $a, b$  termini  $e, f$ : & inter  $c, d$ , totidem termini  $g, h$ : eritque  $a+c+f$ , hyperlogarithmus rationis  $a$ , ad  $b$ ; &  $e+f+b$ , hypologarithmus  
def. 22b  
def. 23b  
gari-



garithmus eiusdem rationis, inter eosdem terminos  $a, b$ .  
erit quoque  $c+g+h$ , hyperlogarithmus rationis  $c$  ad  $d$ ; &  
 $g+h+d$ , eiusdem hypologarithmus inter eosdem termi-  
nos  $c, d$ .

Dico  $a$  ad  $c$ , maiorem esse, quàm  $a+e+f$  ad  $c+g+h$ :

Et  $a+e+f$  ad  $c+g+h$ , maiorem, quàm  $e+f+b$  ad  
 $g+h+d$ .

Et  $e+f+b$  ad  $g+h+d$ , maiorem, quàm  $b$  ad  $d$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* Quoniam  $a, e, f, b$ , necnon  $c, g, h, d$ , sunt  
harmonicè ordinati, in serie harmonica naturali  
27. *b.* ab vnitate: ergo eorum denominatores, sunt arith-  
meticè ordinati, in serie arithmetica naturali ab  
*sup.* vnitate: totidemque sunt  $a, e, f, b$ ; quot  $c, g, h,$   
*def. 8. b.*  $d$ : ergo denominatores  $a, e, f, b$ ; sunt similiter  
arithmeticè dispositi, atque denominatores  $c, g,$   
16. *b.*  $h, d$ : ergo etiam  $a, e, f, b$  sunt similiter harmoni-  
*def. 16 b* cè dispositi, atque  $c, g, h, d$ : ergo  $a, e, c, g$  sunt  
34. *b.* harmonicè dispositi: ergo permutando  $a, c, e, g$ ,  
sunt harmonicè dispositi. Similiter ostendetur,  
quòd  $e, g, f, h$  sunt harmonicè dispositi: necnon  
 $f, h, b, d$ .

*def. 19 b* Rursum quoniam  $a, e, f, b$  sunt harmonicè or-  
dinati, & est  $a$  maior, quàm  $b$ : ergo  $a$  maior, est  
quàm  $e$ ; &  $e$ , maior, quàm  $f$ : &  $f$ , quàm  $b$ : item  
*sup.*  $c$ , maior est quàm  $g$ ;  $g$ , quàm  $h$ ;  $h$ , quàm  $d$ . Et  
*hypoth.* quoniam  $a, c, e, g$  sunt harmonicè dispositi, & est

Qq 2

$a$ , ma-



*def. 13b* |  $a$ , maior, quàm  $c$ ; ergo &  $e$ , maior est, quàm  $g$ ;  
 82. *b.* | item  $f$ , quàm  $h$ ; &  $b$ , quàm  $d$ . & est  $a$  ad  $e$  ratio  
*def. p. 4.* | altior, ideoque maior, quàm  $e$  ad  $g$ ; &  $e$  ad  $g$ , al-  
 tior, & maior, quàm  $f$  ad  $h$ ; &  $f$  ad  $h$ , altior, &  
 maior, quàm  $b$  ad  $d$ .

83. *b.* | Ergo  $a$  ad  $c$  maior est, quàm vt  $a+e+f$  ad  
 $c+g+h$ . Quod &c. Et est  $a+e+f$  ad  $c+g+h$  ma-  
 ior, quàm  $e+f$  ad  $g+h$ : &  $e+f$  ad  $g+h$  maior,  
 quàm  $e+f+b$  ad  $g+h+d$ : ergo  $a+e+f$  ad  $c+g$   
 $+h$ , est maior, quàm  $e+f+b$  ad  $g+h+d$ . Quod  
 &c. Et est  $e+f+b$  ad  $g+h+d$ , maior, quàm  $b$   
 ad  $d$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 79. Prop. 91.*

**S**I quatuor quantitatum prima ad secundam maior fue-  
 rit, quàm tertia ad quartam: productus extremarum,  
 maior est producto mediarum.

*Hypoth.*

$a$ ;  $b$ : maior, quàm  $c$ ;  $d$ .

Dico  $ad$ : maiorem esse, quàm  $bc$ .

*Prepar.*

Fiat productus  $bd$ .

*Demonstr.*

9. *b.* |  $ad$ ;  $bd$ :  $a$ ;  $b$ .

9. *b.* |  $bc$ ;  $bd$ :  $c$ ;  $d$ .

*hypoth.* |  $a$ ;  $b$ : maior, quàm  $c$ ;  $d$ .

$ad$ ;



13. 5. | *ad*; *bd*: maior, quàm *bc*; *bd*.

10. 5. | *ad*: maior, quàm *bc*. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 80. Prop. 92.*

**S**I quatuor quantitatum productus extremarum maior fuerit producto mediarum: erit prima ad secundam maior, quàm vt tertia ad quartam.

*Hypoth.*

Sunt quatuor quantitates *a*, *b*, *c*, *d*: & est *ad* maior, quàm *bc*.

Dico *a*; *b*; maiorem esse, quàm *c*; *d*.

*Præpar.*

Assumatur productus *bd*.

*Demonstr.*

*hypoth.* | *ad*: maior, quàm *bc*.

8. 5. | *ad*; *bd*: maior, quàm *bc*; *bd*.

9. *b*. | *ad*; *bd*: *a*; *b*.

9. *b*. | *bc*; *bd*: *c*; *d*.

13. 5. | *a*; *b*: maior, quàm *c*; *d*. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 81. Prop. 93.*

**S**I fuerit prima ad secundam, maior, quàm vt tertia ad quartam: fuerit autem & tertia ad quartam maior, quàm vt quinta ad sextam: item quinta ad sextam maior fuerit, quàm vt septima ad octauam: erit composita prima cum



cum tertia, ad compositam secundam cum quarta, maior, quàm ut composita quinta cum septima, ad compositam sextam cum octaua.

*Hypoth.*

$a$        $b$

$c$        $d$

$e$        $f$

$g$        $h$

$a$ ;  $b$ : maior, quàm  $c$ ;  $d$ .

$c$ ;  $d$ : maior, quàm  $e$ ;  $f$ .

$e$ ;  $f$ : maior, quàm  $g$ ;  $h$ .

Dico  $a+c$ ;  $b+d$ : maiorem, quàm  $e+g$ ;  $f+h$ .

*Præpar.*

Fiant producti  $af$ ,  $ah$ ,  $cf$ ,  $ch$ ,  $be$ ,  $bg$ ,  $de$ ,  $dg$ .

*Demonstr.*

$af+ah$ : productus  $a$  per  $f+h$ .

$cf+ch$ : productus  $c$  per  $f+h$ .

29.  $h$ .  $af+ah+cf+ch$ : productus  $a+c$  per  $f+h$ .

$be+bg$ : productus  $b$ , per  $e+g$ .

$de+dg$ : productus  $d$ , per  $e+g$ .

$be+bg+de+dg$ , productus  $b+d$ , per  $e+g$ .

*hypoth.*  $a$ ;  $b$ : maior, quàm  $c$ ;  $d$ .

*hypoth.*  $c$ ;  $d$ : maior, quàm  $e$ ;  $f$ .

13. 5.  $a$ ;  $b$ : maior, quàm  $e$ ;  $f$ .

*hypoth.*  $e$ ;  $f$ : maior, quàm  $g$ ;  $h$ .

13. 5.  $a$ ;  $b$ : maior, quàm  $g$ ;  $h$ .

13. 5.  $c$ ;  $d$ : maior, quàm  $g$ ;  $h$ .

$af$ :



93. b.  $\left\{ \begin{array}{l} af: \text{ maior, quàm } be. \\ ah: \text{ maior, quàm } bg. \\ cf: \text{ maior, quàm } de. \\ ch: \text{ maior, quàm } dg. \end{array} \right.$   
 $| af+ah+cf+ch: \text{ maior, quàm } be+bg+de+dg.$   
 94. b.  $| a+c; b+d: \text{ maior, quàm } e+g; f+h. \text{ Quod \&c.}$   
 Quare \&c.

*Theor. 82. Prop. 94.*

**S**I fuerint è serie harmonica naturali ab vnitate, quatuor termini harmonicè dispositi; & alij quatuor eorum submultipli: inter simplos terminos altioris rationis hyperlogarithmus, ad hyperlogarithmum depressioris, maiorem habebit rationem, quàm inter submultiplos. hypologarithmus verò inter simplos altioris, ad inter simplos depressioris, minorem habebit, quàm inter submultiplos.

*Hypoth.*

$1(3) \quad 1(4) \quad 1(5) \quad 1(6)$   
 $1(6) \quad 1(7) \quad 1(8) \quad 1(9) \quad 1(10) \quad 1(11) \quad 1(12)$

$1(7) \quad 1(8) \quad 1(9) \quad 1(10)$   
 $1(14) \quad 1(15) \quad 1(16) \quad 1(17) \quad 1(18) \quad 1(19) \quad 1(20)$

$|$  Sint è serie harmonica naturali ab vnitate, quatuor termini harmonicè dispositi  $1(3), 1(6), 1(7), 1(10)$ : quorum  $1(3)$ , maior, quàm  $1(6)$ : ideo-



1(3)      1(4)      1(5)      1(6)  
 1(6) 1(7) 1(8) 1(9) 1(10) 1(11) 1(12)

---

1(7)      1(8)      1(9)      1(10)  
 1(14) 1(15) 1(16) 1(17) 1(18) 1(19) 1(20)

*def. 13b* | ideoq; & 1(7), maior, quàm 1(10). & esto altior  
*def p. 4.* | ratio 1(3) ad 1(6), quàm 1(7) ad 1(10): ideo-  
*36. b.* | que etiam maior. sint autem & istorum æque-  
*15. 5.* | submultipli, 1(6), 1(12), 1(14), 1(20), pa-  
 riter harmonicè dispositi, & æquè cum prædictis  
 proportionales. Sumantur etiam inter 1(3), 1-  
 (6) medij omnes harmonici 1(4), 1(5): & inter  
 1(7), 1(10), medij omnes 1(8) 1(9); quorum  
 æque submultipli 1(8), 1(10), 1(16), 1(18).  
*def. 16b* | Constat quod sicut 1(3), 1(4), 1(5), 1(6), &  
*def. 19b* | similiter 1(7), 1(8), 1(9), 1(10) harmonicè  
 sunt ordinati, sic 1(6), 1(8), 1(10), 1(12), &  
*15. 5.* | similiter 1(14), 1(16), 1(18), 1(20) sunt har-  
 monicè ordinati, & æquè cum prædictis propor-  
 tionales. Deinde inter 1(6), 1(12), & inter  
 1(14), 1(20) sumantur omnes reliqui medij har-  
 monici 1(7), 1(9), 1(11), & 1(15), 1(17),  
 1(19).

Dico primò  $1(3) + 1(4) + 1(5)$  ad  $1(7) + 1(8) + 1(9)$   
 maiorem esse, quàm  $1(6) + 1(7) + 1(8) + 1(9) + 1(10)$   
 $+ 1(11)$  ad  $1(14) + 1(15) + 1(16) + 1(17) + 1(18) + 1-$   
 $(19)$ .

De-



*Demonstr.*

*sup.*  $I(3); I(7): I(6); I(14).$

88. *h.*  $I(6); I(14):$  maior, quàm  $I(7); I(15).$

89. *h.*  $I(6); I(14):$  maior, quàm  $I(6)+I(7); I(14)$   
 $+I(15).$

13. 5.  $I(3); I(7):$  maior, quàm  $I(6)+I(7); I(14)$   
 $+I(15).$

Similiter demonstrabitur.

*sup.*  $I(4); I(8):$  maior, quàm  $I(8)+I(9); I(16)$   
 $+I(17).$  Et

*sup.*  $I(5); I(9):$  maior, quàm  $I(10)+I(11); I(18)$   
 $+I(19).$

89. *h.*  $I(6)+I(7); I(14)+I(15):$  maior, quàm  $I(8);$   
 $I(16).$

*sup.*  $I(8); I(16): I(4); I(8).$

13. 5.  $I(6)+I(7); I(14)+I(15):$  maior, quàm  $I(4);$   
 $I(8).$

Similiter demonstrabitur.

*sup.*  $I(8)+I(9); I(16)+I(17):$  maior, quàm  $I(5);$   
 $I(9).$  Et

*sup.*  $I(6)+I(7)+I(8)+I(9); I(14)+I(15)+I(16)$   
 $+I(17):$  maior, quàm  $I(5); I(9).$

93. *h.*  $I(3)+I(4); I(7)+I(8):$  maior, quàm  $I(6)+I(7)$   
 $+I(8)+I(9); I(14)+I(15)+I(16)$   
 $+I(17).$

Similiter demonstrabitur.

93. *h.*  $I(3)+I(4)+I(5); I(7)+I(8)+I(9):$  maior,  
 R r quàm



314 ELEMENTVM

1(3) 1(4) 1(5) 1(6)  
1(6) 1(7) 1(8) 1(9) 1(10) 1(11) 1(12)

1(7) 1(8) 1(9) 1(10)  
1(14) 1(15) 1(16) 1(17) 1(18) 1(19) 1(20)

quàm 1(6)+1(7)+1(8)+1(9)+1(10)+1(11); 1(14)  
+1(15)+1(16)+1(17)+1(18)+1(19). Quod &c.

Dico secundò 1(4)+1(5)+1(6); 1(8)+1(9)+1(10):  
maiolem esse, quàm 1(7)+1(8)+1(9)+1(10)+1(11)  
+1(12); 1(15)+1(16)+1(17)+1(18)+1(19)+1(20).

*Demonstr.*

1(7)+1(8); 1(15)+1(16): maior, quàm 1(4);  
1(8).

89. b. 1(4); 1(8): maior, quàm 1(9)+1(10); 1(17)  
+1(18).

1(9)+1(10); 1(17)+1(18): maior, quàm 1(5);  
1(9).

93. b. 1(7)+1(8)+1(9)+1(10); 1(15)+1(16)+1(17)  
+1(18): maior, quàm 1(4)+1(5); 1(8)+1(9).

89. b. 1(4)+1(5); 1(8)+1(9): maior, quàm 1(11)  
+1(12); 1(19)+1(20).

89. b. 1(11)+1(12); 1(19)+1(20): maior, quàm  
1(6); 1(10).

93. b. 1(7)+1(8)+1(9)+1(10)+1(11)+1(12); 1-  
(15)+1(16)+1(17)+1(18)+1(19)+1(20):  
maior, quàm 1(4)+1(5)+1(6); 1(8)+1(9)+1(10).

Quod



Quod è conuerſo eſt demonſtrandum.

Quare &c.

*Theor. 83. Prop. 95.*

**S**I fuerint eiufdem rationis duo hyperlogarithmi, alter ex paucioribus, alter ex terminis vno pluribus; & ſubmultiplicati fuerint vtrorumque termini, per alterius multitudinem terminorum: ſubmultipli eius, qui ex paucioribus, & ſubmultipli eius, qui ex pluribus, primi ſunt æquales; & reliqui deinceps ſunt minores, hoc ordine; ſecundus eius, qui ex pluribus; & ſecundus eius, qui ex paucioribus; & tertius eius, qui ex pluribus; & tertius eius, qui ex paucioribus; & ſic deinceps. Quod ſi fuerint hypologarithmi: ſubmultipli eius, qui ex paucioribus, & ſubmultipli eius, qui ex pluribus, vltimi ſunt æquales; & reliqui deinceps ſunt maiores, hoc ordine; penultimus eius, qui ex pluribus; & penultimus eius, qui ex paucioribus; & tritultimus eius, qui ex pluribus; & tritultimus eius, qui ex paucioribus; & ſic deinceps.

*Hypoth.*

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| $1(a)$  | $1(b)$  | $1(c)$  |
| $1(d)$  | $1(e)$  | $1(f)$  |
| $1(3a)$ | $1(3b)$ | $1(3c)$ |
| $1(2d)$ | $1(2e)$ | $1(2f)$ |

Sint earumdem rationum  $1(a)$ , ad  $1(c)$ , &  $1(d)$  ad  $1(g)$   
duo hyperlogarithmi; vnus ex duobus terminis  $1(a)$ ,  $1(b)$ ;

R r 2

alter



$1(a)$        $1(b)$        $1(c)$   
 $1(d)$        $1(e)$        $1(f)$        $1(g)$   
 $1(3a)$        $1(3b)$        $1(3c)$   
 $1(2d)$        $1(2e)$        $1(2f)$        $1(2g)$

alter ex tribus  $1(d)$ ,  $1(e)$ ,  $1(f)$ : item duo hypologarithmi, ex duobus  $1(b)$ ,  $1(c)$ , & ex tribus  $1(e)$ ,  $1(f)$ ,  $1(g)$ . & subtriplici accipiantur  $1(3a)$ ,  $1(3b)$ ,  $1(3c)$ , necnon subdupli  $1(2d)$ ,  $1(2e)$ ,  $1(2f)$ ,  $1(2g)$ .

Dico  $1(3a)$ ,  $1(2d)$  esse æquales: necnon  $1(3c)$ ,  $1(2g)$  esse æquales: & hoc ordine, priores maiores esse, & posteriores minores  $1(3a)$ ,  $1(2e)$ ,  $1(3b)$ ,  $1(2f)$ ,  $1(3c)$ .

*Demonstr.*

24. h. |  $1(a)$ ;  $1(c)$ :  $1(d)$ ;  $1(g)$ :  $c$ ;  $a$ :  $g$ ;  $d$   
 p. p. |  $c$ ;  $g$ :  $a$ ;  $d$ :  $c---a$ ;  $g---d$ .  
 27. h. |  $c---a$ : 2.       $g---d$ : 3.  
 11. 5. |  $c$ ;  $g$ :  $a$ ;  $d$ : 2; 3.  
 31. h. |  $3c$ :  $2g$ .       $3a$ :  $2d$ .  
 10. h. |  $1(3c)$ :  $1(2g)$ .       $1(3a)$ :  $1(2d)$ . Quæ &c.  
 6. h. |  $2g---2f$ :  $2f---2e$ :  $2e---2d$ : 2.  
 6. h. |  $3c---3b$ :  $3b---3a$ : 3.  
 |  $3a$ ,  $2e$ ,  $3b$ ,  $2f$ ,  $3c$  sunt, hoc ordine, minores, &  
 | deinceps maiores.  
 10. h. |  $1(3a)$ ,  $1(2e)$ ,  $1(3b)$ ,  $1(2f)$ ,  $1(3c)$  sunt, hoc or-  
 | dine, maiores, & deinceps minores. Quod &c.  
 Quare &c.

Theo-



*Theor. 84. Prop. 96.*

**S**I fuerint è serie harmonica naturali ab vnitare, quatuor termini harmonicè dispositi; & alij quatuor eorum subdupli; alijque subtripli; & subquadrupli, & sic deinceps in infinitum: inter simplos terminos altioris, rationis hyperlogarithmus ad hyperlogarithmum depressioris maiorem habet rationem, quàm inter subduplos: & inter subduplos, maiorem, quàm inter subtriplos; & sic deinceps. hypologarithmus verò inter simplos altioris, ad inter simplos depressioris, minorem habet rationem, quàm inter subduplos; & inter subduplos, minorem, quàm inter subtriplos; & sic deinceps.

*Hypoth.*

1(3) 1(4) 1(5) 1(6)  
 1(6) 1(7) 1(8) 1(9) 1(10) 1(11) 1(12)  
 1(9) 1(10) 1(11) 1(12) 1(13) 1(14) 1(15) 1(16) 1(17) 1(18)

1(7) 1(8) 1(9) 1(10)  
 1(14) 1(15) 1(16) 1(17) 1(18) 1(19) 1(20)  
 1(21) 1(22) 1(23) 1(24) 1(25) 1(26) 1(27) 1(28) 1(29) 1(30)

Sint è serie harmonica naturali ab vnitare, quatuor termini harmonicè dispositi 1(3), 1(6), 1(7), 1(10); quorum 1(3) maior, quàm 1(6); ideoque, & 1(7) maior, quàm 1(10). Et esto altior ratio 1(3) ad 1(6), quàm 1(7) ad 1(10). Sint autem istorum subdupli 1(6), 1(12), 1(14), 1(20): & subtripli 1(9), 1(18), 1(21), 1(30). inter quos accipiantur medij harmonici, & ex his Hyperloga-



|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1(3)  |       | 1(4)  |       | 1(5)  |       | 1(16) |
| 1(6)  | 1(7)  | 1(8)  | 1(9)  | 1(10) | 1(11) | 1(12) |
| 1(9)  | 1(10) | 1(11) | 1(12) | 1(13) | 1(14) | 1(15) |
| 1(16) | 1(17) | 1(18) |       |       |       |       |
| 1(7)  |       | 1(8)  |       | 1(9)  |       | 1(10) |
| 1(14) | 1(15) | 1(16) | 1(17) | 1(18) | 1(19) | 1(20) |
| 1(21) | 1(22) | 1(23) | 1(24) | 1(25) | 1(26) | 1(27) |
| 1(28) | 1(29) | 1(30) |       |       |       |       |

logarithmi, & Hypologarithmi.

94. h. | Constat primò, quòd inter simplos, maior est hyperlogarithmus altioris, ad hyperlogarithmum depressioris, quàm inter subduplos: & hypologarithmus minor.

Dico  $1(6) + 1(7) + 1(8) + 1(9) + 1(10) + 1(11)$ ;  $1(14) + 1(15) + 1(16) + 1(17) + 1(18) + 1(19)$ : maiorem esse, quàm  $1(9) + 1(10) + 1(11) + 1(12) + 1(13) + 1(14) + 1(15) + 1(16) + 1(17)$ ;  $1(21) + 1(22) + 1(23) + 1(24) + 1(25) + 1(26) + 1(27) + 1(28) + 1(29)$ .

*Prepar.*

Sumantur ipsorum  $1(6)$ ,  $1(7)$ ,  $1(4)$ ,  $1(5)$  subtripli: &  $1(9)$ ,  $1(10)$ ,  $1(11)$ ,  $1(21)$ ,  $1(22)$ ,  $1(23)$  subdupli.

*Demonstr.*

95. h. |  $1(18)$ ,  $1(20)$ ,  $1(21)$ ,  $1(22)$  sunt maiores, & deinceps minores.

95. h. |  $1(42)$ ,  $1(44)$ ,  $1(45)$ ,  $1(46)$  sunt maiores, & deinceps minores.

40. h. |  $1(18)$ ,  $1(20)$ ,  $1(21)$ ,  $1(22)$ , &  $1(42)$ ,  $1(44)$ ,  $1(45)$ ,  $1(46)$  sunt similiter harmonicè dispositi.

$1(18)$ ,



88. b. { 1(18); 1(42): maior, quàm 1(20); 1(44).  
 { 1(20); 1(44): maior, quàm 1(21); 1(45).  
 { 1(21); 1(45): maior, quàm 1(22); 1(46).  
 { 1(18), 1(22), 1(42), 1(45) similiter proportio-  
 nales, atque 1(6), 1(7), 1(14), 1(15).  
 36. b. { 1(18), 1(20), 1(22), 1(42), 1(44), 1(46) simi-  
 liter proportionales, atque 1(9), 1(10), 1(11),  
 1(21), 1(22), 1(23).  
 89. b. { 1(6); 1(14): maior, quàm 1(9)+1(10); 1(21)+1(22).  
 89. b. { 1(9)+1(10); 1(21)+1(22): maior quàm 1(7);  
 1(15).  
 13. 5. { 1(7); 1(15): maior, quàm 1(11); 1(23).  
 { 1(11); 1(23): maior, quàm 1(8); 1(16).  
 { 1(8); 1(16): maior, quàm 1(12)+1(13); 1(24)  
 sup. { +1(25).  
 { 1(12)+1(13); 1(24)+1(25): maior, quàm 1(9);  
 1(17).  
 Et sic deinceps quoad fuerint termini.
93. b. { 1(6)+1(7)+1(8)+1(9)+1(10)+1(11); 1(14)+1(15)+1(16)+1(17)+1(18)+1(19): maior, quàm  
 1(9)+1(10)+1(11)+1(12)+1(13)+1(14)+1(15)+1(16)+1(17); 1(21)+1(22)+1(23)+1(24)+1(25)+1(26)+1(27)+1(28)+1(29).  
 Quod &c.

Dico etiam 1(7)+1(8)+1(9)+1(10)+1(11)+1(12); 1(15)+1(16)+1(17)+1(18)+1(19)+1(20): minorem esse, quàm 1(10)+1(11)+1(12)+1(13)+1(14)+1(15)+1(16)



1(3) 1(4) 1(5) 1(6)  
 1(6) 1(7) 1(8) 1(9) 1(10) 1(11) 1(12)  
 1(9) 1(10) 1(11) 1(12) 1(13) 1(14) 1(15) 1(16) 1(17) 1(18)

1(7) 1(8) 1(9) 1(10)  
 1(14) 1(15) 1(16) 1(17) 1(18) 1(19) 1(20)  
 1(21) 1(22) 1(23) 1(24) 1(25) 1(26) 1(27) 1(28) 1(29) 1(30)

+1(16)+1(17)+1(18); 1(22)+1(23)+1(24)+1(25)  
 +1(26)+1(27)+1(28)+1(29)+1(30).

*Demonstr.*

*sup.* { 1(10); 1(22): maior, quàm 1(7); 1(15).  
 1(7); 1(15): maior, quàm 1(11)+1(12); 1(13)  
 +1(14).  
 1(11)+1(12); 1(23)+1(24): maior, quàm 1(8);  
 1(16).  
 1(8); 1(16): maior, quàm 1(13); 1(25).  
 Et sic deinceps, quoad fuerint termini.

93. b. { 1(10)+1(11)+1(12)+1(13)+1(14)+1(15)+1(16)+1(17)+1(18); 1(22)+1(23)+1(24)+1(25)+1(26)+1(27)+1(28)+1(29)+1(30): maior, quàm 1(7)+1(8)+1(9)+1(10)+1(11)+1(12); 1(15)+1(16)+1(17)+1(18)+1(19)+1(20). Quod è conuerso &c.

Quare &c.

*Theo-*



*Theor. 85. Prop. 97.*

**E**iusdem rationis numerosæ inter maiores terminos, maior est hyperlogarithmus ad hypologarithmum, quàm inter minores.

*Demonstr.*

Nàm sunt maiores, & deinceps minores, hoc ordine, hyperlogarithmus inter maiores terminos, hyperlogarithmus inter minores, hypologarithmus inter minores, & hypologarithmus inter maiores. Quare inter maiores, hyperlogarithmus ad hypologarithmum, maior est, quàm inter minores.

*Theor. 86. Prop. 98.*

**E**serie harmonica naturali ab unitate, terminorum harmonicè dispositorum, altioris rationis logarithmus ad logarithmum depressioris, minor est, quàm ut hyperlogarithmus ad hyperlogarithmum; & maior, quàm ut hypologarithmus ad hypologarithmum.

*Hypoth. commun.*

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
|          | <i>N</i> | <i>O</i> |          |
| <i>G</i> | <i>H</i> | <i>I</i> | <i>K</i> |
| <i>R</i> | <i>S</i> | <i>P</i> | <i>Q</i> |
| <i>E</i> |          | <i>F</i> |          |

Sint è serie harmonica naturali ab unitate, quatuor termini *A, B, C, D*, harmonicè dispositi: quorum ratio *A* ad







æqueproportionales ad  $A, B$ : inter quos rationis quidem  $C$  ad  $D$  sint hyperlogarithmus  $P$ , & hypologarithmus  $Q$ ; & rationis  $A$  ad  $B$  hyperlogarithmus  $R$ , & hypologarithmus  $S$ .

*Demonstr.*

96. h. |  $R; P$ : minor est, quàm  $G; H$ .  
 97. h. |  $P; Q$ : minor, quàm  $N; O$ : & minor, quàm  $L; M$ .  
 4. 3. |  $R; Q$ : minor, quàm  $G; H, + L; M$ .  
 suppos. |  $E; F; G; H, + L; M$ .  
 13. 5. |  $R; Q$ : minor, quàm  $E; F$ . contra 82. h.  
 Ergo  $E$  ad  $F$ , non est maior, quàm  $G$  ad  $H$ .

*Præpar.*

Esto  $E$  ad  $F$ , eadem, quæ  $G$  ad  $H$ , si potest: & inter minores terminos, quàm quos inter sunt hyperlogarithmi  $G, H$ , sumantur alij  $R, P$ .

*Demonstr.*

96. h. |  $G; H$ : maior, quàm  $R; P$ .  
 suppos. |  $E; F; G; H$ .  
 13. 5. |  $E; F$ : maior, quàm  $R; P$ . contra demonstrata  
 superius.

Ergo  $E$  ad  $F$ , non est, vt  $G$  ad  $H$ .

Ergo  $E$  ad  $F$ , est minor, quàm vt  $G$  ad  $H$ . Quod &c.

*Præpar.*

Esto deinde  $E$  ad  $F$ , minor, quàm  $I$  ad  $K$ : & sumatur  $L$  ad  $M$  ratio, quæ cum  $E$  ad  $F$ , rationem  $I$  ad  $K$  componit. Et quoniam maior, quàm  $E$ , ad  $F$ , est vt  $I$  ad  $K$ :  $L$  ad  $M$ , est vt maior, quàm  $E$ , ad  $E$ : &  $L$ , maior



A

B

C

D

N

O

G

H

I

K

R

S

P

Q

E

F

ior est, quàm  $M$ . Deinde fiant eadem, quæ supra.

*Demonstr.*

82. h. |  $S$ ;  $P$ : minor est, quàm  $E$ ;  $F$ .

præpar. |  $P$ ;  $Q$ : minor, quàm  $L$ ;  $M$ .

4. 3. |  $S$ ;  $Q$ : minor, quàm  $E$ ;  $F$ , +  $L$ ;  $M$ .

suppos. |  $I$ ;  $K$ :  $E$ ;  $F$ , +  $L$ ;  $M$ .

13. 5. |  $S$ ;  $Q$ : minor, quàm  $I$ ;  $K$ . contra 96. h.

*Præpar.*

Ergo  $E$  ad  $F$  non est minor, quàm  $I$  ad  $K$ .

*Præpar.*

Esto  $E$  ad  $F$ , eadem, quæ  $I$  ad  $K$ : & inter minores terminos, quàm quos inter sunt hypologarithmi  $I$ ,  $K$ , sumantur alij  $S$ ,  $Q$ .

*Demonstr.*

suppos. |  $E$ ;  $F$ :  $I$ ;  $K$ .

96. h. |  $I$ ;  $K$ : minor est, quàm  $S$ ;  $Q$ .

13. 5. |  $E$ ;  $F$ : minor, quàm  $S$ ;  $Q$ . contra superius demonstrata.

Ergo  $E$  ad  $F$ , non est eadem, quæ  $I$  ad  $K$ .

Ergo  $E$  ad  $F$ , est maior, quàm  $I$  ad  $K$ . Quod &c.

Quare &c.



Theor. 87. Prop. 99.

**Q**uatuor terminorum è serie harmonica naturali ab unitate dispositorum harmonicè, altioris rationis maior terminus ad maiorem depreffioris, maior est, quàm vt logarithmus ad logarithmum: & logarithmus ad logarithmum, maior, quàm vt minor ad minorem.

*Hypoth.*

Sint è serie harmonica naturali ab unitate, quatuor termini  $a, b, c, d$ , harmonicè dispositi: quorum ratio  $a$  ad  $b$ , altior, quàm  $c$  ad  $d$ : &  $a$ , maior, quàm  $b$ : ideoque etiam  $c$ , maior, quàm  $d$ . Et esto rationis  $a$  ad  $b$ , logarithmus  $e$ : & rationis  $c$  ad  $d$ , logarithmus  $f$ .

Dico  $a; c$ : maiorem, quàm  $e; f$ .

Et  $e; f$ : maiorem, quàm  $b; d$ .

*Prepar.*

Rationis  $a$  ad  $b$ , sumantur hyperlogarithmus  $g$ , & hypologarithmus  $h$ : & rationis  $c$  ad  $d$ , hyperlogarithmus  $l$ , & hypologarithmus  $m$ .

*Demonstr.*

90.  $h$ . |  $a; c$ : maior, quàm  $g; l$ .  
 98.  $h$ . |  $g; l$ : maior, quàm  $e; f$ .  
 98.  $h$ . |  $e; f$ : maior, quàm  $h; m$ .  
 90.  $h$ . |  $h; m$ : maior, quàm  $b; d$ .  
 13. 5. |  $a; c$ : maior, quàm  $e; f$ . Quod &c.  
 13. 5. |  $e; f$ : maior, quàm  $b; d$ . Quod &c.  
 Quare &c.

*Theo-*



*Theor. 88. Prop. 100.*

**Q**uatuor numerorum arithmetice dispositorum, ratio primi ad secundum, totuplicata, quotus est primus, maior est, quàm tertij ad quartum totuplicata, quotus est quartus: atque totuplicata ratio primi ad secundum, quotus est secundus, minor est, quàm totuplicata tertij ad quartum, quotus est tertius.

*Hypoth.*

Sint quatuor numeri arithmetice dispositi  $a, b, c, d$ .

Dico rationem  $a$  ad  $b$  totuplicatam, quotus est  $a$ , maiorem esse, ratione  $c$  ad  $d$ , totuplicata, quotus est  $d$ : & rationem  $a$  ad  $b$  totuplicatam, quotus est  $b$ , minorem esse, ratione  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $c$ .

*Præparatio.*

Sumantur in serie harmonica naturali ab unitate termini æqueordinati cum numeris  $a, b, c, d$ , in serie arithmetica naturali: nempe unitates denominatæ ab ipsis:  $1(a)$ ,  $1(b)$ ,  $1(c)$ ,  $1(d)$ . Et esto rationis  $c$  ad  $b$ , logarithmus  $e$ : & rationis  $c$  ad  $d$ , logarithmus  $f$ .

*Demonstr. p.*

Terminus  $a$ , vel minor est, vel maior, quàm  $b$ : & rursum  $a$ , vel minor est, vel maior, quàm  $c$ . Esto  $a$ , minor, quàm  $b$ : & minor, quàm  $c$ .

*hypoth.*  $a, b, c, d$ : arithmetice dispositi.

*14. b.*  $1(a), 1(b), 1(c), 1(d)$ : harmonicè dispositi.

*sup.*  $1(a)$ : maior, quàm  $1(b)$ : & maior, quàm  $1(c)$ .

*28. b.*  $1(a); 1(b)$ : altior, & maior, quàm  $1(c); 1(d)$ .

$1(a);$



65. b.  $I(a); I(b)$ : logarithmus  $e$ .  
 65. b.  $I(c); I(d)$ : logarithmus  $f$ .  
 12. b.  $I(a)$ : maior, quàm  $I(b)$ .  
 def 13 b  $I(c)$ : maior, quàm  $I(d)$ .  
 8. 5.  $I(a); I(d)$ : maior, quàm  $I(a); I(c)$ .  
 99. b.  $I(a); I(c)$ : maior, quàm  $e; f$ .  
 99. b.  $e; f$ : maior, quàm  $I(b); I(d)$ .  
 8. 5.  $I(b); I(d)$ : maior, quàm  $I(b); I(c)$ .  
 13. 5.  $I(a); I(d)$ : maior, quàm  $e; f$ .  
 13. 5.  $e; f$ : maior, quàm  $I(b); I(c)$ .  
 12. b.  $I(a); I(d)$ :  $d; a$ .  
 12. b.  $I(b); I(c)$ :  $c; b$ .  
 13. 5.  $d; a$ : maior, quàm  $e; f$ .  
 13. 5.  $e; f$ : maior, quàm  $c; b$ .  
 91. b.  $df$ : maior, quàm  $ae$ .  
 91. b.  $cb$ : maior, quàm  $fc$ .  
 hypoth. Et quoniam  $f$ , logarithmus est rationis  $c$  ad  $d$ :  
 73. b. ergo  $df$ , logarithmus est rationis  $c$  ad  $d$ , totu-  
 hypoth. plicatæ, quotus est  $d$ . item quoniam  $e$ , logari-  
 73. b. thmus est rationis  $a$  ad  $b$ : ergo  $ae$ , logarithmus  
 est rationis  $a$  ad  $b$  totuplicatæ, quotus est  $e$ . Et  
 74. b. ut  $ae$  ad  $df$ , ita est ratio  $a$  ad  $b$  totuplicata, quo-  
 71. b. tus est  $a$ , ad rationem  $c$  ad  $d$  totuplicatam quo-  
 tus est  $d$ . est autem  $ae$ , minor, quàm  $df$ : ergo ra-  
 71. b. tio  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $a$ , depressior  
 hypoth. est  $a$  ratione  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $d$ . est  
 def 5. b. autem  $a$  minor, quàm  $b$ ; &  $c$ , minor, quàm  $d$ :  
 Ergo



*def. 2. 4.* Ergo maior est ratio  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $a$ , quàm  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $d$ . Quod &c.

*73. b.* Similiter ostendetur, quod  $eb$ , logarithmus est rationis  $a$  ad  $b$ , totuplicatae, quotus est  $b$ : & *fc* logarithmus  $c$  ad  $d$  totuplicatae, quotus est  $c$ : sed *sup.* est  $eb$ , maior, quàm  $fc$ : ergo ratio  $a$  ad  $b$  totuplicata quotus est  $b$ , altior est, quàm  $c$  ad  $d$  totuplicata quotus est  $c$ . & est  $a$  minor, quàm  $b$ ; & *def. 5. b.*  $c$  minor, quàm  $d$ : ergo minor est ratio  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $b$ , quàm ratio  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $c$ . Quod &c.

*Demonstr. 2.*

*hypoth.* Esto  $a$ , minor, quàm  $b$ : & maior, quàm  $c$ .  
*def. 5. b.* ergo  $c, d, a, b$ , sunt quatuor numeri arithmetice dispositi; quorum  $c$ , minor est, quàm  $d$ ; & minor, quàm  $a$ . Et ratio  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $c$ , maior est, quàm  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $b$ : &  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $d$ , minor, quàm  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $a$ . Quod &c.

*Demonstr. 3.*

*hypoth.* Esto  $a$ , maior, quàm  $b$ , & minor, quàm  $c$ .  
*def. 5. b.* Ergo  $b, a, d, c$ , sunt quatuor numeri arithmetice dispositi; quorum  $b$ , minor, quàm  $a$ ; & minor, quàm  $d$ . Et ratio  $b$  ad  $a$  totuplicata, quotus est  $b$ , maior, quàm  $d$  ad  $c$  totuplicata, quotus  
 tus



2.3.

tus est  $c$ : &  $b$  ad  $a$  totuplicata, quotus est  $a$ , minor, quàm  $d$  ad  $c$  totuplicata, quotus est  $d$ . Et conuertendo  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $a$ , maior, quàm  $c$  ad  $d$ , totuplicata, quotus est  $d$ : &  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $b$ , minor, quàm  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $c$ . Quod &c.

*Demonstr. 4.*

def.5. b.  
sup.

2.3.

Esto  $a$  maior vtrisque  $b$ , &  $c$ : eritque  $d$  minor vtrisque  $c$ , &  $b$ . Sunt ergo quatuor numeri  $d$ ,  $c$ ,  $b$ ,  $a$  dispositi arithmetice: quorum ratio  $d$  ad  $c$  totuplicata, quotus est  $d$ , maior, quàm  $b$  ad  $a$  totuplicata, quotus est  $a$ : &  $d$  ad  $c$  totuplicata, quotus est  $c$ , minor, quàm  $b$  ad  $a$  totuplicata, quotus est  $b$ . Et conuertendo,  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $d$ , minor, quàm  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $a$ : &  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $c$ , maior, quàm  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $b$ . Quod &c. Quare &c.

*Theor. 89. Prop. 101.*

**S**I fuerint quatuor numeri arithmetice dispositi, & primus maior secundo; fuerint autem & alij duo numeri, quintus ad sextum, maior quàm vt primus ad quartum: erit primi ad secundum totuplicata ratio, quotus est quintus, maior, quàm tertij ad quartum totuplicata ratio, quotus est sextus.

Tt

Hy-



*Hypoth.*

Sint quatuor arithmeticè dispositi numeri  $a, b, c, d$ : & sit primus  $a$ , maior secundo  $b$ ; ideoque etiam tertius  $c$ , maior quarto  $d$ : & sint alij duo, quintus  $e$  ad sextum  $f$ , maior quàm  $a$  ad  $d$ .

Dico rationem  $a$  ad  $b$  totuplicatam, quotus est  $e$ , maiorem esse ratione  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $f$ .

*Prepar.*

Rationis  $a$  ad  $b$ , logarithmus assumatur  $g$ : & rationis  $c$  ad  $d$ , logarithmus  $h$ .

*Demonstr.*

Ratio  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $a$ , maior est ratione  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $d$ : & ambæ sunt maioris inæqualitatis: ergo ratio  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $a$ , altior est, quàm  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $d$ . Est autem rationis  $a$  ad  $b$  totuplicatæ, quotus est  $a$ , logarithmus  $ag$ : & rationis  $c$  ad  $d$  totuplicatæ, quotus est  $d$ , logarithmus  $hd$ : ergo  $ag$  maior est, quàm  $hd$ . Et quoniam  $e$  ad  $f$  maior est, quàm vt  $a$  ad  $d$ : permutando,  $e$  ad  $a$ , maior est, quàm vt  $f$  ad  $d$ . Sed  $e$  ad  $a$ , est vt  $eg$  ad  $ag$ : &  $f$  ad  $d$ , vt  $fh$  ad  $dh$ . Ergo  $eg$  ad  $ag$ , maior est, quàm vt  $fh$  ad  $dh$ : & permutando,  $eg$  ad  $fh$ , maior, quàm vt  $ag$  ad  $dh$ . Et est  $eg$ , logarithmus rationis  $a$  ad  $b$  totuplicatæ, quotus est  $e$ : &  $fh$ , logarithmus rationis  $c$  ad  $d$  totuplicatæ, quotus est  $f$ . ergo ratio  $a$  ad  $b$  totu-



*hypoth.* | totuplicata, quotus est  $e$ , altior est ratione  $c$  ad  $d$   
*def. p. 4.* | totuplicata, quotus est  $f$ . Et vtraque maioris est  
 inæqualitatis. Ergo ratio  $a$  ad  $b$  totuplicata, quo-  
 tus est  $e$ , maior est ratione  $c$  ad  $d$  totuplicata,  
 quotus est  $f$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 90. Prop. 102.*

**S**I fuerint quatuor numeri arithmeticè dispositi, & pri-  
 mus minor secundo; fuerint autem & alij duo numeri,  
 quintus ad sextum, minor, quàm vt primus ad quartum:  
 erit primi ad secundum totuplicata ratio, quotus est quin-  
 tus, maior, quàm tertij ad quartum totuplicata ratio, quo-  
 tus est sextus.

*Hypoth.*

*def. 5. b.* | Sint quatuor numeri arithmeticè dispositi,  $a, b,$   
 $c, d$ : & sit  $a$ , minor, quàm  $b$ : ideoque etiam  $c$ ,  
 minor, quàm  $d$ : & sit  $e$ , ad  $f$ , minor, quàm vt  $a$   
 ad  $d$ .

Dico  $a$  ad  $b$  totuplicatam rationem, quotus est  $e$ , ma-  
 iorem esse ratione  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $f$ .

*Demonstr.*

*hypoth.* | Sunt enim  $d, c, b, a$ , arithmeticè dispositi: & est  
 2. 3. |  $d$ , maior, quàm  $c$ : &  $f$  ad  $e$ , maior, quàm  $d$  ad  $a$ :  
 101. b. | ergo  $d$  ad  $c$  totuplicata, quotus est,  $f$  maior est,  
 2. 3. | quàm  $b$  ad  $a$  totuplicata, quotus est  $e$ : & conuer-  
 tendo  $c$  ad  $d$  totuplicata, quotus est  $f$ , minor,

T t 2

quàm




quàm  $a$  ad  $b$  totuplicata, quotus est  $e$ . Quod &c.

Quare &c.

*Probl. 13. Prop. 103.*

**D**ata quantitate, dataque ratione inæqualitatis, inuenire terminos in data ratione, quorum differentia est quantitas data.

*Hypoth.*



Sit data quantitas  $AB$ , dataque ratio  $c$  ad  $d$ ; & esto  $c$ , maior, quàm  $d$ .

Oportet inuenire terminos in ratione  $c$  ad  $d$ , quorum excessus  $AB$ .

*Constr.*

Fiat  $c---d$ ;  $d$ :  $AB$ ;  $BE$ .

Dico  $AE$ ;  $EB$ :  $c$ ;  $d$ .

*Demonstr.*

*constr.* |  $AB$ ;  $BE$ :  $c---d$ ;  $d$ .

2. p. |  $AE$ ;  $EB$ :  $c$ ;  $d$ . Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 91. Prop. 104.*

**S**i quatuor quantitatum non numerosas rationes habentium, harmonicè dispositarum, prima maior fuerit, quàm vtralibet secunda, & tertia: logarithmus rationis pri-



primæ ad secundam ad logarithmum tertiæ ad quartam,  
non erit maior, quàm vt prima ad tertiam, nec minor,  
quàm vt secunda ad quartam.

*Hypoth.*

$p$   $r$   $q$   $s$   $t$   $x$   $u$   $y$   
 $l$   $m$   $n$   $o$   
 $K$   
 $z$   $\beta$   $\delta$   $\epsilon$   $\theta$   $\lambda$   $\mu$   $\xi$   
 $a$   $b$   $c$   $d$   
 $\pi$   $e$   $\phi$   $\psi$   $f$   $\omega$   
 $g$   $i$   $h$

Sunto quatuor quantitates harmonicè dispositæ,  $a, b, c, d$ : quarum  $a$ , maior, quàm  $b$ , & maior, quàm  $c$ . & sunt  $a$  ad  $b$ , &  $c$  ad  $d$ , rationes non numerosæ. & rationis  $a$  ad  $b$ , esto logarithmus  $e$ : rationis autem  $c$  ad  $d$ , logarithmus  $f$ .

Dico  $e$  ad  $f$ , non maiorem esse, quàm vt  $a$  ad  $b$ ; nec minorem, quàm vt  $c$  ad  $d$ .

*Supposito falsa alternatiua.*

Esto, si fieri potest, vel maior  $e$  ad  $f$ , quàm vt  $a$  ad  $b$ , ratione  $g$  ad  $h$ , maioris inæqualitatis, vel minor, quàm vt  $c$  ad  $d$ , ratione  $g$  ad  $h$ , maioris inæqualitatis.

*Prepar.*

Fiat  $g$ ;  $i$ ;  $i$ ;  $h$ .

Sumatur quantitas  $K$ .

Fiat  $a$ ;  $K$ ;  $K$ ;  $l$ .

$b$ ;  $K$ ;  $K$ ;  $m$ .

$c$ ;  $K$ ;  $K$ ;  $n$ .

$d$ ;  $K$ ;  $K$ ;  $o$ .

Da-



$p$   $r$   $q$   $s$   $t$   $x$   $n$   $y$   
 $l$   $m$   $n$   $o$   
 $K$   
 $\alpha$   $\beta$   $\delta$   $\epsilon$   $\theta$   $\lambda$   $\mu$   $\xi$   
 $a$   $b$   $c$   $d$   
 $\pi$   $e$   $\phi$   $\psi$   $f$   $\omega$   
 $g$   $i$   $h$

77. b. Datis non numerosis rationibus  $a$  ad  $b$ , &  $c$  ad  $d$ , vel  $m$  ad  $l$ , &  $o$  ad  $n$ : dataque ratione  $g$  ad  $i$ , vel  $i$  ad  $h$ , maioris inæqualitatis, quatuor inueniantur numerosæ rationes,  $p$  ad  $q$ , altior, quàm  $l$  ad  $m$ ; &  $r$  ad  $s$  depressior: propiores æqualitati logarithmicæ, quàm vt in ratione  $g$  ad  $i$ , vel  $i$  ad  $h$ .
88. b. Et quoniam  $a$  ad  $b$ , ratio est altior, quàm  $c$  ad  $d$ : & sunt  $l$ ,  $m$ ,  $n$ ,  $o$ , reciprochè, sicut  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$ : etiam  $l$  ad  $m$ , ratio est altior, quàm  $n$  ad  $o$ . Itaq; si forte contingeret  $r$  ad  $s$ , non altior, quàm  $n$  ad  $o$ : inueniatur altera  $r$  ad  $s$ , depressior quidem, quàm  $l$  ad  $m$ ; sed ei propior; atque altior, quàm  $n$  ad  $o$ . Et similiter inueniatur  $t$  ad  $u$ , depressior, quàm  $r$  ad  $s$ ; altior, quàm  $n$  ad  $o$ : necnon inueniatur  $x$  ad  $y$ , depressior, quàm  $n$  ad  $o$ ; vt fiant  $t$  ad  $u$ , &  $x$  ad  $y$ , propiores æqualitati logarithmicæ, quàm vt in ratione  $g$  ad  $i$ , vel  $i$  ad  $h$ .
103. b. Dataque differentia  $l$ ,  $m$ : datis quoque rationibus  $p$ , ad  $q$ ,  $r$  ad  $s$ ,  $t$  ad  $u$ ,  $x$  ad  $y$ , inueniantur



tur earumdem termini  $p, q, r, s, t, u, x, y$ , easdem habentes rationes, & eandem differentiam  $l, m$ .

*Fiat*  $p; K: K; z$ .

$r; K: K; \beta$ .

$q; K: K; \delta$ .

$s; K: K; \epsilon$ .

$t; K: K; \theta$ .

$x; K: K; \lambda$ .

$u; K: K; \mu$ .

$y; K: K; \xi$ .

Et rationis  $z$  ad  $\delta$ , logarithmus esto  $\pi$ .

rationis  $\beta$  ad  $\epsilon$ , logarithmus  $\varphi$ .

rationis  $\theta$  ad  $u$ , logarithmus  $\psi$ .

rationis  $\lambda$  ad  $\xi$ , logarithmus  $\omega$ .

*Demonstr. commun.*

*hypoth.*  $a, b, c, d$ , sunt harmonicè dispositæ.

33. *h.*  $l, m, n, o$ , arithmeticè dispositæ.

*hypoth.*  $a$ , maior, quàm  $b$ : & maior, quàm  $c$ .

24. *h.*  $l$ , minor, quàm  $m$ : & minor, quàm  $n$ .

*constr.*  $p, q; l, m; r, s; t, u; n, o; x, y$ : binæ, & binæ sunt arithmeticè dispositæ, antecedentes minores consequentibus.

def. 34. *h.*  $\pi$ : maior, quàm  $e$ . &  $e$ : maior, quàm  $\varphi$ .

$\psi$ : maior, quàm  $f$ . &  $f$ : maior, quàm  $\omega$ .

*constr.* Et quoniam  $g$ , ad  $i$ , maior est logarithmicè, quàm ut ratio  $z$  ad  $\delta$ , ad rationem  $\beta$  ad  $\epsilon$ : ratio autem  $z$  ad  $\delta$ , ad rationem  $\beta$  ad  $\epsilon$ , logarithmicè maior



$p$   $r$   $q$   $s$   $t$   $x$   $u$   $y$   
 $l$   $m$   $n$   $o$   
 $K$   
 $z$   $\beta$   $\delta$   $\epsilon$   $\theta$   $\lambda$   $\mu$   $\xi$   
 $a$   $b$   $c$   $d$   
 $\pi$   $e$   $\phi$   $\psi$   $f$   $\omega$   
 $g$   $i$   $h$

81. *h.* maior est, quàm vt ad rationem  $a$  ad  $b$ : & ratio  $z$  ad  $\delta$ , ad rationē  $a$  ad  $b$ , est logarithmicè, vt  $\pi$  ad  $e$ : ergo  $g$  ad  $i$  est maior, quàm vt  $\pi$  ad  $e$ . Similiter ostendetur  $g$  ad  $i$ , maior, quàm  $e$  ad  $\phi$ : & maior, quàm  $\psi$  ad  $f$ : & maior, quàm  $f$  ad  $\omega$ .
- constr.* Deinde quoniam  $p$  ad  $q$ , vel  $z$  ad  $\delta$  ratio est altior, quàm  $l$  ad  $m$ , vel  $a$  ad  $b$ ; & sunt  $z$ ,  $\delta$ , *sup.*  $a$ ,  $b$  harmonicè dispositæ; & est  $a$ , maior, quàm *hypoth.*  $b$ : oportet  $z$ , &  $\delta$  maiores esse, quàm  $a$ ,  $b$ . si enim essent æquales; esset ratio  $z$  ad  $\delta$ , æquealta rationi  $a$  ad  $b$ : si verò esset  $z$ , minor, quàm  $a$ ; ideoque &  $\delta$ , minor, quàm  $b$ ; esset ratio  $z$  ad  $\delta$ , *def. 13 h* depressior, quàm  $a$  ad  $b$ : contra assumptum. Similiter ostendetur, quòd  $a$ , maior est, quàm  $e$ ; &  $b$ , quàm  $\epsilon$ : item  $\theta$ , maior, quàm  $c$ ; &  $\mu$ , quàm  $d$ : &  $c$ , quàm  $\lambda$ ; &  $d$ , quàm  $\xi$ .

*Suppositio falsa prima.*

Esto  $e$  ad  $f$ , maior, quàm  $a$  ad  $c$ : si potest.

De-



*Demonstr. p.*

*prapar.*  $e; f; a; c; +g; i; +i; h.$   
*def. 5.6.*  $e; \phi; +\phi; \psi; +\psi; f; e; f.$   
*11. 5.*  $e; \phi; +\phi; \psi; +\psi; f; a; c; +g; i; +i; h.$   
*sup.*  $e; \phi$ : minor, quàm  $g; i.$   
*sup.*  $\psi; f$ : minor, quàm  $i; h.$   
*4. 3.*  $\phi; \psi$ : maior, quàm  $a; c.$  si enim esset eadem,  
 vel minor: esset  $e; f$ : minor, quàm  $a; c; +g; h.$   
 contra assumptum.

*prapar.* Sunt autem  $\beta, \epsilon, \theta, \mu$ , harmonicè dispositæ  
*23. h.* quantitates, numerosasque habentes rationes; &  
*prapar.* proportionales sicut quidam termini è serie har-  
*sup.* monica naturali ab unitate: quorum rationis  $\beta$  ad  
 $\epsilon$ , logarithmus est  $\phi$ ; & rationis  $\theta$  ad  $\mu$ , loga-  
*sup.* rithmus est  $\psi$ . Est autem sicut  $r$  ad  $s$  ratio altior,  
 quàm  $t$  ad  $u$ : sic  $\beta$  ad  $\epsilon$ , altior, quàm  $\theta$  ad  $\mu$ : &  
*sup.* est  $\beta$ , maior, quàm  $\epsilon$ ; ideoque &  $\theta$ , maior,  
*99. h.* quàm  $\mu$ . Ergo  $\beta$  ad  $\theta$ , maior est, quàm  $\phi$  ad  $\psi$ .  
*13. 5.* Ergo  $\beta$  ad  $\theta$ , maior est, quàm  $a$  ad  $c.$  contra 8.5.  
 Ergo  $e$  ad  $f$  non maior est, quàm  $a$  ad  $c.$  Quod &c.

*Suppos. fals. 2.*

Esto  $e$  ad  $f$ , minor, quàm  $b$  ad  $d$ , si potest.

*Demonstr. 2.*

*prapar.*  $e; f; +g; h; b; d.$   
*sup.*  $e; \phi$ : minor, quàm  $g; i.$   
*sup.*  $f; \omega$ : minor, quàm  $i; h.$   
*sup.*  $\pi; \omega$ : minor, quàm  $e; f; +g; h.$

Vv

 $\pi; \omega$



13. 5.  $\pi; \omega$ : minor, quàm  $b; d$ .

*prepar.* Sunt autem  $z, \delta, \lambda, \xi$ , harmonicè dispositæ, numerosas rationes habentes; & proportionales,

25. *b. prepar.* sicut quidam termini è serie harmonica naturali ab vnitæ: quorum rationis  $z$  ad  $\delta$ , logarithmus

*sup.* est  $\pi$ ; & rationis  $\lambda$  ad  $\xi$ , logarithmus est  $\omega$ : & est  $z$  ad  $\delta$  ratio altior, quàm  $a$  ad  $b$ ; sicut  $p$  ad

$q$ , altior, quàm  $l$  ad  $m$ : &  $l$  ad  $m$  altior, quàm  $n$  ad  $o$ , vel  $c$  ad  $d$ ; &  $c$  ad  $d$ , altior, quàm  $\lambda$  ad

$\xi$ ; sicut  $n$  ad  $o$ , altior, quàm  $x$  ad  $y$ : ergo  $z$  ad  $\delta$ , altior est, quàm  $\lambda$  ad  $\xi$ : & est  $z$ , maior, quàm

29. *b.*  $\delta$ ; &  $\lambda$ , maior, quàm  $\xi$ : Ergo  $\pi$  ad  $\omega$  maior

13. 5. est, quàm  $\delta$  ad  $\xi$ . Ergo  $\delta$  ad  $\xi$  minor est, quàm  $b$  ad  $d$ . *contra* 8. 5.

Ergo  $e$  ad  $f$ , non minor est, quàm  $b$  ad  $d$ . Quod &c.  
Quare &c.

---

*Theor. 92. Prop. 105.*

**Q**uatuor arithmeticè dispositarum quantitatum, si prima ad vltimam, fuerit vt numerus ad numerum: erit primæ ad secundam totuplicata ratio, quotus est homologus primæ, maior, quàm tertiæ ad quartam totuplicata ratio, quotus est homologus quartæ. quod si secunda ad tertiam fuerit vt numerus ad numerum: erit primæ ad secundam totuplicata ratio, quotus est homologus secundæ, minor, quàm tertiæ ad quartam totuplicata, quotus est homologus tertiæ.

*Hy-*



*Hypoth.*

Sunto quatuor arithmeticè dispositæ quantitates  $A, B, C, D$ . & esto, vel alterutrum, vel vtrumque istorum, videlicet:  $A$  ad  $D$ , vt numerus  $a$ , ad numerum  $d$ : &  $B$  ad  $C$ , vt numerus  $b$ , ad numerum  $c$ .

Dico rationem  $A$  ad  $B$  totuplicatam, quotus est  $a$ , maiorem esse ratione  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $d$ : & rationem  $A$  ad  $B$  totuplicatam, quotus est  $b$ , minorem ratione  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $c$ .

*Præpar. commun.*

Sumatur rationalis  $u$ : & per quantitates denominetur arithmeticè dispositas, vt fiant fractiones  $u(A), u(B), u(C), u(D)$ , harmonicè dispositæ. Sitque rationis  $A$  ad  $B$  logarithmus  $e$ : & rationis  $C$  ad  $D$ , logarithmus  $f$ .

*Demonstr. p.*

Quantitatum  $A, B, C, D$ , vel duæ tantum extremæ  $A, D$ , erunt vt numeri; vel duæ tantum mediæ  $B, C$ : vel binæ tantum extremæ inuicem  $A, D$ ; & mediæ inuicem  $B, C$ : vel tres inuicem sunt vt numeri.

Sunto tres inuicem  $A, B, C$ , vt numeri: & assumantur tres numeri  $g, h, i$  proportionales, vt  $A, B, C$ : quod si  $A$ , minor est, quàm  $B$ ; etiam  $C$ , minor est, quàm  $D$ ; &  $g$  minor, quàm  $h$ . & per homologiam, est defectus  $g, h$ , ad  $i$ , vt defectus  $A, B$ , ad  $C$ . addatur defectus  $g, h$ , numero  $i$ , & fiat numerus  $l$ . erit ergo componendo vt  $l$  ad  $i$ ,

V v 2

ita



def. 5. b. ita  $D$  ad  $C$ . Si verò  $A$ , maior est, quàm  $B$ : pro-  
fectò  $C$ , maior est, quàm  $C --- D$ , vel quàm  $A$   
2. p.  $--- B$ : & per homologiam, sicut  $C$ , maior est, quàm  
 $A --- B$ , ita  $i$ , maior est, quàm  $g --- h$ . Auferatur  
itaque  $g --- h$ , ab  $i$  numero; & relinquatur  $l$ : &  
2. p. erit, diuidendo,  $C$  ad  $D$ , vt  $i$  ad  $l$ .

Quare  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  sunt proportionales inui-  
cem, vt numeri,  $g$ ,  $h$ ,  $i$ ,  $l$ . & numeri  $g$ ,  $h$ ,  $i$ ,  $l$ ,  
sunt arithmeticè dispositi: quorum ratio  $g$  ad  $h$   
100. b. totuplicata, quotus est  $g$ , maior est, quàm ratio  $i$   
ad  $l$  totuplicata, quotus est  $l$ : & ratio  $g$  ad  $h$  to-  
tuplicata, quotus est  $h$ , minor, quàm ratio  $i$  ad  $l$   
6. 4. totuplicata, quotus est  $i$ . Sed  $g$  ad  $h$  totuplicata  
ratio, quotus est  $g$ , ad eandem totuplicatam,  
quotus est  $a$ , est logarithmicè, vt  $g$  ad  $a$ : &  $i$  ad  
 $l$  totuplicata, quotus est  $l$ , est logarithmicè ad  
eandem totuplicatam, quotus est  $d$ , vt  $l$  ad  $d$ .  
Et quoniam  $g$  ad  $l$  est vt  $A$  ad  $D$ : &  $A$  ad  $D$ , vt  
11. 5.  $a$  ad  $d$ : ergo  $g$  ad  $l$ , est vt  $a$  ad  $d$ : & permutan-  
2. p. do  $g$  ad  $a$ , vt  $l$  ad  $d$ . Ergo ratio  $g$  ad  $h$  totupli-  
15. 4. cata, quotus est  $g$ , ad eandem totuplicatam, quo-  
tus est  $a$ , est vt  $i$  ad  $l$  totuplicata, quotus est  $l$ ,  
18. 4. ad eandem totuplicatam, quotus est  $d$ . Ergo si  
 $g$  ad  $h$  totuplicata, quotus est  $g$ , altior est, quàm  
 $i$  ad  $l$  totuplicata, quotus est  $l$ , etiam  $g$  ad  $h$  to-  
tuplicata, quotus est  $a$ , altior est, quàm  $i$  ad  $l$  to-  
tuplicata, quotus est  $d$ : si depressior, depressior.  
ergo



100. h. | ergo sicut  $g$  ad  $h$  totuplicata, quotus est  $g$ , maior est, quàm  $i$  ad  $l$  totuplicata, quotus est  $l$ , siue  
 def. 5. h. | sint  $g$  ad  $h$ , &  $i$  ad  $l$  rationes maioris inæquali-  
 deff. 1. | tatis, siue sint minoris ambæ: erit &  $g$  ad  $h$  totu-  
 & 2. 4. | plicata, quotus est  $a$ , maior, quàm  $i$  ad  $l$  totupli-  
 cata, quotus est  $d$ . Et est  $g$  ad  $h$ , eadem, quæ  $A$   
 ad  $B$ : &  $i$  ad  $l$ , eadem, quæ  $C$  ad  $D$ . ergo  $A$  ad  
 $B$  totuplicata ratio, quotus est  $a$ , maior est, quàm  
 $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $d$ . Quod &c.

Simili prorus demonstratione ostendetur, quòd ratio  
 $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $b$ , minor est, quàm  $C$  ad  
 $D$  totuplicata, quotus est  $c$ . Quod &c.

*Demonstr. 2.*

Sunto vel duo tantum extremi  $A$ ,  $D$ , vt numeri; vel  
 duo tantum medij  $C$ ,  $D$ ; vel bini, & bini  $A$ ,  $D$ , &  $B$ ,  $C$ ;  
 non autem tres, aut quatuor. profectò ve est quantitas  $A$ ,  
 minor, quàm  $B$ , vel maior: & rursus quantitas  $A$ , minor,  
 quàm  $C$ , vel maior.

Esto  $A$ , minor, quàm  $B$ , & minor, quàm  $C$ .

14. h. |  $u(A)$ ,  $u(B)$ ,  $u(C)$ ,  $u(D)$ , sunt harmonice dispositi.  
 12. h. |  $u(A)$ : maior, quàm  $u(B)$ .  
 12. h. |  $u(A)$ : maior, quàm  $u(C)$ .  
 88. h. |  $u(A)$ ;  $u(B)$ : altior, & maior, quàm  $u(C)$ ;  $u(D)$ .  
 78. h. |  $u(A)$ ;  $u(B)$ : logarithmus  $e$ .  
 78. h. |  $u(C)$ ;  $u(D)$ : logarithmus  $f$ .  
 def. 13 h |  $u(C)$ : maior, quàm  $u(D)$ .  
 8. 5. |  $u(A)$ ;  $u(D)$ : maior, quàm  $u(A)$ ;  $u(C)$ .

$u(A)$ ;



104. b.  $u(A); u(C)$ : non minor, quàm  $e; f$ .  
 104. b.  $e; f$ : non minor, quàm  $u(B); u(D)$ .  
 8. 5.  $u(B); u(D)$ : maior, quàm  $u(B); u(C)$ .  
 13. 5.  $u(A); u(D)$ : maior, quàm  $e; f$ .  
 13. 5.  $e; f$ : maior, quàm  $u(B); u(C)$ .  
 12. b.  $u(A); u(D)$ :  $D; A$ :  $d; a$ .  
 12. b.  $u(B); u(C)$ :  $C; B$ :  $c; b$ .  
 13. 5.  $d; a$ : maior, quàm  $e; f$ .  
 13. 5.  $e; f$ : maior, quàm  $c; b$ .  
 91. b.  $df$ : maior, quàm  $ae$ .  
 91. b.  $eb$ : maior, quàm  $fc$ .  
 prepar. Et quoniam  $f$ , logarithmus est rationis  $C$  ad  
 80. b.  $D$ : ergo  $df$ , logarithmus est rationis  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $d$ . item quoniam  $e$ , logarithmus est rationis  $A$  ad  $B$ : ergo  $ae$ , logarithmus est rationis  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $a$ . Similiter  $fc$ , logarithmus est rationis  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $c$ : &  $eb$ , logarithmus, rationis  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $b$ . Sicut ergo  $ae$ , minor est, quàm  $df$ : sic depressior est  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $a$ , quàm  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $d$ . Item sicut  $eb$ , maior est, quàm  $fc$ : sic  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $b$ , altior est, quàm  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $c$ .  
 81. b.  $Sunt$  autem  $A$  ad  $B$ , &  $C$  ad  $D$ , minoris inequalitatis rationes, quarum depressior altiore maior est. Ergo  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $a$ , maior  
 hypoth.  $deff. 1. \odot$   
 2. 4.



ior est, quàm  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $d$ : &  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $b$ , minor, quàm  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $c$ . Quod &c.

*Demonstr. 3.*

Est  $A$  minor, quàm  $B$ , & maior, quàm  $C$ .  
Ergo  $C, D, A, B$ , sunt quatuor quantitates arithmetice dispositæ; quarum  $C$ , minor, quàm  $D$ , & minor, quàm  $A$ . Et ratio  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $c$ , maior est, quàm  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $b$ . &  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $d$ , minor, quàm  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $a$ . Quod &c.

*Demonstr. 4.*

Est  $A$ , maior, quàm  $B$ , & minor, quàm  $C$ .  
Ergo  $B, A, D, C$ , sunt quatuor quantitates arithmetice dispositæ, quarum  $B$  minor, quàm  $A$ , & minor, quàm  $D$ . ideoque  $B$  ad  $A$  totuplicata ratio, quotus est  $b$ , maior est, quàm  $D$  ad  $C$  totuplicata, quotus est  $c$ : &  $B$  ad  $A$  totuplicata, quotus est  $a$ , minor, quàm  $D$  ad  $C$  totuplicata, quotus est  $d$ . Ergo conuertendo,  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $b$ , minor est, quàm  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $c$ : &  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $a$ , maior, quàm  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $d$ . Quod &c.

*Demonstr. 5.*

Est  $A$  maior, quàm  $B$ , & maior, quàm  $C$ . Ergo  $D,$   
 $C, B, A,$



*def. 5. b.* *sup.* *2. 3.*  $C, B, A$ , sunt quantitates arithmetice dispositæ, quarum  $D$  minor, quàm  $C$ , & minor, quàm  $B$ . quarum ratio  $D$  ad  $C$  totuplicata, quotus est  $d$ , maior est, quàm  $B$  ad  $A$  totuplicata, quotus est  $a$ : &  $D$  ad  $C$  totuplicata, quotus est  $c$ , minor, quàm  $B$  ad  $A$  totuplicata, quotus est  $b$ : Ergo conuertendo,  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $d$ , minor est, quàm  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $a$ : &  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $c$ , maior, quàm  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $b$ . Quod &c.

Quare &c.

---

*Theor. 93. Prop. 106.*

**S**i fuerint quatuor quantitates arithmetice dispositæ, & prima minor secunda; fuerint autem & duo numeri prior ad posteriorem, minor, quàm vt prima quantitas ad quartam: erit primæ ad secundam totuplicata ratio, quotus est prior numerus, maior, quàm tertiæ ad quartam totuplicata, quotus est posterior.

*Hypoth.* Sint quatuor quantitates arithmetice dispositæ,  $A, B, C, D$ : & sit  $A$ , minor, quàm  $B$ : ideoque etiam  $C$ , minor, quàm  $D$ : & sit  $e$  numerus ad numerum  $f$ , minor, quàm vt  $A$  ad  $D$ .

Dico  $A$  ad  $B$  totuplicatam, quotus est  $e$ , maiorem esse, quàm  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $f$ .

*Pre-*



*Præpar.*

Denominetur  $u$ , per quantitates arithmetice  
 13. b. dispositas  $A, B, C, D$ , ut fiant fractiones har-  
 monice dispositæ,  $u(A), u(B), u(C), u(D)$ . Et  
 esto rationis  $u(A)$  ad  $u(B)$ , logarithmus  $g$ : & ra-  
 tionis  $u(C)$  ad  $u(D)$ , logarithmus  $h$ .

*Demonstr.*

Vel  $u(A)$ , maior est, quàm  $u(C)$ ; vel minor.  
 def. 13. b. Si  $u(A)$ , maior est, quàm  $u(C)$ : etiam  $u(B)$ , ma-  
 88. b. ior est, quàm  $u(D)$ : &  $u(A)$  ad  $u(B)$ , ratio est al-  
 def. p. 4. tior, & maior, quàm  $u(C)$  ad  $u(D)$ . Ergo  $g$  ad  $h$   
 104. b. non maior est, quàm ut  $u(A)$  ad  $u(C)$ .

11. b.  $u(A); u(C): C; A$ .

12. b.  $C$ : maior, quàm  $A$ .

13. 5.  $g; h$ : non maior, quàm  $C; A$ .

8. 5.  $D; A$ : maior, quàm  $C; A$ .

13. 5.  $g; h$ : minor, quàm  $D; A$ .

2. 3.  $f; e$ : maior, quàm  $D; A$ .

13. 5.  $g; h$ : minor, quàm  $f; e$ .

91. b.  $ge$ : minor, quàm  $fh$ .

Est autem  $g$  logarithmus rationis  $u(A)$  ad  
 12. b.  $u(B)$ , vel  $B$  ad  $A$ : ideoque  $ge$ , logarithmus est  
 80. b. rationis  $B$  ad  $A$  totuplicatæ, quotus est  $e$ . item  
 81. b.  $fh$ , logarithmus est rationis  $D$  ad  $C$  totuplicatæ,  
 quotus est  $f$ . Ergo sicut  $ge$ , minor est, quàm  $fh$ :  
 sic totuplicata ratio  $B$  ad  $A$ , quotus est  $e$ , depresi-  
 fior est, quàm totuplicata  $D$  ad  $C$ , quotus est  $f$ .

X x

&amp; est



*hypoth.* & est  $B$ , maior, quàm  $A$ , &  $D$  maior, quàm  $C$ :  
*def. p. 4.* ergo totuplicata ratio  $B$  ad  $A$ , quotus est  $e$ , mi-  
 nor est, quàm totuplicata  $D$  ad  $C$ , quotus est  $f$ .  
 2. 3. & conuertendo, totuplicata  $A$  ad  $B$ , quotus est  
 $e$ , maior, quàm totuplicata  $C$  ad  $D$ , quotus est  $f$ .  
 Quod &c.  
*def. 13. h.* Si  $u(A)$ , minor est, quàm  $u(C)$ : etiam  $u(B)$ , mi-  
 88. *h.* nor est, quàm  $u(D)$ : & est ratio  $u(C)$  ad  $u(D)$ , al-  
 tior, quàm  $u(A)$  ad  $u(B)$ : & est  $u(C)$ , maior vtra-  
 libet  $u(D)$ , &  $u(A)$ .  
 104. *h.*  $h; g$ : non minor, quàm  $u(C); u(A)$ .  
 12. *h.*  $u(C); u(A): A; C$ .  
 13. 5.  $h; g$ : non minor, quàm  $A; C$ .  
 8. 5.  $A; C$ : maior, quàm  $A; D$ .  
*hypoth.*  $A; D$ : maior, quàm  $e; f$ .  
 13. 5.  $h; g$ : maior, quàm  $e; f$ .  
 91. *h.*  $hf$ : maior, quàm  $eg$ .  
*sup.* Totuplicata  $A$  ad  $B$ , quotus est  $e$ , maior, quàm  
 totuplicata  $C$  ad  $D$ , quotus est  $f$ . Quod &c.  
 Quare &c.

Theor. 94. Prop. 107.

**S**I fuerint quatuor quantitates arithmeticè dispositæ,  
 & prima, maior, quàm secunda: fuerint autem & duo  
 numeri, prior ad posteriorem maior, quàm vt prima quan-  
 titas ad quartam: erit primæ ad secundam totuplicata ra-  
 tio, quotus est prior numerus, maior, quàm tertiæ ad quar-  
 tam



tam totuplicata, quotus est posterior.

*Hypoth.*

Sint quatuor quantitates  $A, B, C, D$ , arithmeticè dispositæ: & sit  $A$ , maior, quàm  $B$ ; ideoque etiam  $C$ , maior, quàm  $D$ : & sit  $e$  numerus ad numerum  $f$ , maior, quàm ut  $A$  ad  $D$ .

Dico  $A$  ad  $B$  totuplicatam, quotus est  $e$ , maiorem esse, quàm  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $f$ .

*Demonstr.*

Sunt enim quatuor quantitates arithmeticè dispositæ  $D, C, B, A$ : & est  $D$  minor, quàm  $C$ :  
 2. 3. &  $f$  ad  $e$ , minor est, quàm ut  $D$  ad  $A$ . ergo  $D$   
 106. h. ad  $C$  totuplicata ratio, quotus est  $f$ , maior est,  
 2. 3. quàm  $B$  ad  $A$  totuplicata, quotus est  $e$ . Et conuertendo,  $C$  ad  $D$  totuplicata, quotus est  $f$ , minor, quàm  $A$  ad  $B$  totuplicata, quotus est  $e$ .  
 Quod &c.

Quare &c.







Perillust. & Excellentiss. D. Io. Dominico Cassino  
Astronomo D. S. Petrus Mengolus S. D.



*N*unquam mihi satis credo, Vir Excellentiss. cum  
publicanda conscribo; ideoque merito nec omnino  
scholaribus credendum puto: quorum licet ope  
me fateor plurimum profecisse; non tamen au-  
thoritate oportuit confirmari. Tu vero, qui scis,  
et potes, tuis in me multis hucusque positis, hoc addas officium  
velim: prava, si quae sunt, emendes primum: in ijs, quae ma-  
le posita sunt, consilio adiuues; in ceteris, mihi duplices intelli-  
ctum. Quod ut praestes facilius, retexam breuiter huiusce  
operis narrationem: quam cum legeris, praefationemque ad le-  
ctorem percurreris; plurima quidem cursim praetereundo intelli-  
gere; paucis vero difficilioribus lectis attentius, demonstratisque,  
possis de toto volumine sententiam ferre.

Ante annos duodecim, occasione cuiusdam problematis mihi  
propositi à D. Io. Antonio Rocca Regiensi, de figura unilinea de-  
scribenda, quae secaret ellipsim in duobus punctis innumerabiles  
eiusmodi figuras excogitavi, quas tunc per Geometriam indiui-  
sibilem quadrabam, adhibito tamen prius hoc lemmate.


Lem-



*Lemma.*

Data recta linea, diuifa primùm bifariam, deinde non bifariam in duobus punctis, vtrunque à medio puncto æqualiter distantibus: assignatisque vnus eiusdem gradus potestatibus abscissarum; necnon alius eiusdem gradus potestatibus residuarum: inuenire cui sit æquale aggregatum ex duobus productis synonymis, sub potestatibus abscissarum assignatis, per suarum assignatas potestates residuarum.

Est autem hoc lemma affine illi, quod recitat Bonaventura Cauallerius b. m. præceptor meus ex Io. Beugrand: quod idcirco in expositione placet imitari.



Sit recta  $AR$ , diuifa bifariam in  $T$ , & non bifariam in punctis  $C, B$ , æqualiter hinc inde à  $T$  distantibus. Oportet inuenire, cui sit æquale aggregatum productorum synonymorum sub potestatibus partium inæqualium  $AB, BR$ , &  $AC, CR$ . Vt autem breuiori via id obtineamus, procedemus per Algebram Speciosam, partes  $AT, TR$ , vocantes  $t$ : & partes  $BT, TC$ , vocantes  $a$ . Erant ergo  $AB, CR, t - a$ : & erunt  $AC, BR, t + a$ . Assignatis itaque primis potestatibus abscissarum  $AB, AC$ , necnon primis residuarum  $BR, CR$ ; volens inuenire cui æquetur summa productorum sub primis potestatibus  $ABR, ACR$ , statim ducendo  $t - a$  per  $t + a$  produco vnum: & ducendo



$$A_1 \text{ --- } \overset{B}{1} \text{ --- } \overset{T}{1} \text{ --- } \overset{C}{1} \text{ --- } R$$

do  $t+a$  per  $t-a$ , produco alterum, quorum summa,  $2t2$   
 $---2a2$ .

*Exemplum primum in Vniprimis.*

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| $AB:$ | $t-a$ | $AC:$ | $t+a$ |
| $BR:$ | $t+a$ | $CR:$ | $t-a$ |

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| $ABR:$ | $t2-a2$ | $ACR:$ | $t2-a2$ |
|        |         |        | $t2-a2$ |

$$ABR+ACR: 2t2--2a2$$

Vnde sequitur aggregatum productorum sub primis potestatibus  $ABR$ ,  $ACR$ , equale esse, duplæ secundæ potestati  $AT$ , dempta dupla secunda  $TC$ .

Quod si assignatis secundis potestatibus abscissarum  $AB$ ,  $AC$ , & primis residuarum  $BR$ ,  $CR$ , velim scire cui æquetur summa productorum sub potestatibus secunda  $AB$ , & prima  $BR$ , & sub secunda  $AC$  & prima  $CR$ ; effingo secundam potestatem à radice  $t-a$ , quàm duco in primam  $t+a$ ; vt fiat vnus productus: item effingo secundam  $t+a$ , quàm duco in primam  $t-a$ ; vt fiat alter productus: quorum summam inuenio  $2t3--2a2$ .

*Exem-*



*Exemplum 2. in Biprimis .*

$$AB: t2---2ta+a2$$

$$BR: t+a$$

$$t3---2t2a+ta2$$

$$+ t2a---2ta2+a3$$

$$ABR: t3---t2a---ta2+a3$$

$$AC: t2+2ta+a2$$

$$CR: t---a$$

$$t3+2t2a+ta2$$

$$---t2a---2ta2---a3$$

$$ACR: t3+t2a---ta2---a3$$

$$t3---t2a---ta2+a3$$

$$ABR+ACR: 2t3---2ta2.$$

Vnde manifestum est aggregatum productorum sub potestatibus, secunda *AB* & prima *BR*, & sub secunda *AC* & prima *CR*, æquale esse duplæ potestati tertiæ *AT*, dempto duplo producto sub prima *AT*, & secunda *TC*.

Similiter in cuiuslibet appellationis proportionalibus progrediendo, consequemur optatum: vt exemplis subiectis liquidò appareat.

*Exem-*







$$ABR: t4---2t2a2+a4$$

$$\text{Similiter } ACR: t4---2t2a2+a4$$

$$ABR+ACR: 2t4---4t2a2+2a4.$$


---

*Exemplum 5. in Quadriprimis.*

$$AB: t4---4t3a+6t2a2---4ta3+a4$$

$$BR: t+a$$


---

$$t5---4t4a+6t3a2---4t2a3+ta4$$

$$+t4a---4t3a2+6t2a3---4ta4+a5$$


---

$$ABR: t5---3t4a+2t3a2+2t2a3---3ta4+a5$$


---

$$AC: t4+4t3a+6t2a2+4ta3+a4$$

$$CR: t---a$$


---

$$t5+4t4a+6t3a2+4t2a3+ta4$$

$$---t4a---4t3a2---6t2a3---4ta4---a5$$


---

$$ACR: t5+3t4a+2t3a2---2t2a3---3ta4---a5$$

$$t5---3t4a+2t3a2+2t2a3---3ta4+a5$$


---

$$ABR+ACR: 2t5+4t3a2---6ta4.$$

Y y

Exem-



$$A_1 \quad \begin{array}{c} B \quad T \quad C \\ \hline 1 \quad 1 \quad 1 \end{array} \quad R$$

*Exemplum 6. in Trifecundis.*

$$AB: t_3 --- 3t_2a + 3ta_2 --- a_3$$

$$BR: t_2 + 2ta + a_2$$


---

$$\begin{aligned} & t_5 --- 3t_4a + 3t_3a_2 --- t_2a_3 \\ & \quad + 2t_4a --- 6t_3a_2 + 6t_2a_3 --- 2ta_4 \\ & \quad + t_3a_2 --- 3t_2a_3 + 3ta_4 --- a_5 \end{aligned}$$


---

$$ABR: t_5 --- t_4a --- 2t_3a_2 + 2t_2a_3 + ta_4 --- a_5.$$


---

$$AC: t_3 + 3t_2a + 3a_2 + a_3$$

$$CR: t_2 --- 2ta + a_2$$


---

$$\begin{aligned} & t_5 + 3t_4a + 3t_3a_2 + t_2a_3 \\ & \quad --- 2t_4a --- 6t_3a_2 --- 6t_2a_3 --- 2ta_4 \\ & \quad + t_3a_2 + 3t_2a_3 + 3ta_4 + a_5. \end{aligned}$$


---

$$ACR: t_5 + t_4a --- 2t_3a_2 --- 2t_2a_3 + ta_4 + a_5$$

$$t_5 --- t_4a --- 2t_3a_2 + 2t_2a_3 + ta_4 --- a_5$$


---

$$ABR + ACR: 2t_5 --- 4t_3a_2 + 2ta_4.$$

*Similiter in Quintiprimis.*

$$ABR + ACR: 2t_6 + 10t_4a_2 --- 20t_2a_4 --- 2a_6.$$

*In*



*In Quadrisecundis.*

$$ABR+ACR: 2t6---2t4a2---2t2a4+2a6.$$

*In Tritertijs.*

$$ABR+ACR: 2t6---6t4a2+6t2a4---2a6.$$

*In Sextiprimis.*

$$ABR+ACR: 2t7+18t5a2--10t3a4--10ta6.$$

*In Quintisecundis.*

$$ABR+ACR: 2t7+2t5a2--10t3a4+8ta6.$$

*In Quadrutertijs.*

$$ABR+ACR: 2t7---6t5a2+6t3a4--2ta6.$$

*In Septimiprimis.*

$$ABR+ACR: 2t8+28t6a2---28t2a6---2a8.$$

*In Sextisecundis.*

$$ABR+ACR: 2t8+8t6a2---30t4a4+8t2a6+2a8.$$

*In Quintitertijs.*

$$ABR+ACR: 2t8---4t6a2+4t2a6---2a8.$$

*In Quadriquantis.*

$$ABR+ACR: 2t8---8t6a2+12t4a4---8t2a6+2a8.$$

*In Octauiprimis.*

$$ABR+ACR: 2t9+40t7a2+28t5a4---56t3a6---14ta8.$$

*In Septimisecundis.*

$$ABR+ACR: 2t9+16t7a2--28t5a4+10ta8.$$

*In Sextitertijs.*

$$ABR+ACR: 2t9--12t5a4+16t3a6--6ta8.$$


*In Quintiquantis.*

$$ABR+ACR: 2t9---8t7a2+12t5a4---8t3a6+2ta8.$$

Yy 2

In





*In Noniprimis.*

$$ABR+ACR: 2t10 + 54t8a2 + 84t6a4 --- 84t4a6 --- 54t2a8 --- 2a10.$$

*In Octanifecundis.*

$$ABR+ACR: 2t10 + 26t8a2 --- 28t6a4 --- 28t4a6 + 26t2a8 + 2a10.$$

*In Septimitertijs.*

$$ABR+ACR: 2t10 + 6t8a2 --- 28t6a4 + 28t4a6 --- 6t2a8 --- 2a10.$$

*In Sextiquartis.*

$$ABR+ACR: 2t10 --- 6t8a2 + 4t6a4 + 4t4a6 --- 6t2a8 + 2a10.$$

*In Quintiquintis.*

$$ABR+ACR: 2t10 --- 10t8a2 + 20t6a4 --- 20t4a6 + 10t2a8 --- 2a10.$$

*Propositio.*

In parallelogrammo ducta diametro, regula basi: omnes sexcuplae uniprimae sub triangulis, sunt aequales omnibus secundis potestatibus parallelogrammi.

Et omnes duodecuplae biprimae, omnibus tertijs potestatibus parallelogrammi.

Et omnes 20plae triprimae: necnon omnes 30plae bifecundae; omnibus quartis potestatibus.

Et



Et omnes 3 oplæ quadriprimæ: necnon omnes 6 oplæ trisecundæ; omnibus quintis potestatibus.

Et omnes 42 plæ quintiprimæ: item omnes 105 plæ quadrisecondæ: & omnes 140 plæ tritertiæ; omnibus sextis potestatibus.

Et omnes 56 plæ sextiprimæ: item omnes 168 plæ quintisecundæ: item omnes 280 plæ quadriritertiæ; omnibus septimis potestatibus.

Et omnes 72 plæ septimiprimæ: item omnes 252 plæ sextisecundæ: necnon omnes 504 plæ quintitertiæ: & omnes 630 plæ quadriquantæ; omnibus octavis potestatibus.

Et omnes 90 plæ octauprimæ: & omnes 360 plæ septimisecundæ: & omnes 840 plæ sextitertiæ: & omnes 1260 plæ quintiquartæ; omnibus nonis potestatibus.

Et omnes 110 plæ noniprimæ: & omnes 495 plæ octavisecundæ: & omnes 1320 plæ septimitertiæ: & omnes 2310 plæ sextiquartæ: & omnes 2772 plæ quintiquintæ; omnibus decimis potestatibus.


Et sic deinceps in infinitum iuxta numeros tabulæ quadratricum, vel quadraturarum, cōtinuatæ quātum oportet.

*Meth. Demonstr.*

Affinis est hæc propositio, tribus propositionibus, quas loco citato refert Cauallerius ex eodem Beugrand *Exerc.* 4. *prop.* 25, 26, & 27: Eademque illarum methodo demonstrabitur, ex Lemmate præcedenti. Porro satis puto ad ostensionem eiusdem methodi, ex decem propositis, tria tantum demonstrare.

*Hy-*



*Hypoth.*

Est parallelogrammum  $AB$ , cuius diameter  $CD$ ; diuidaturque  $CD$  bifariam in  $E$ : ducanturque per  $E$ , rectæ  $FG$ ,  $IH$ , parallelogrammi  $AB$  lateribus parallelæ: ducanturque hinc inde ab  $E$  distantes quantumlibet, sed æqualiter, & intra quadratum, duæ  $KLMN$ , &  $OPQR$ .

Dico sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , omnes sextuplas vniprimas, æquales esse, omnibus secundis potestatibus parallelogrammi  $AB$ .

*Demonstr. p.*

Quoniam aggregatum ex vniprimis  $KMN$ ,  $OPR$ , est æquale duplæ secundæ potestati  $KL$ , dempta dupla secunda potestate  $LM$ : &  $KN$  ducta est utcumque. Ergo ex omnibus vniprimis, sub trapezio  $A FEC$ , & sub triangulo  $CEG$ , & ex omnibus, sub triangulo  $EFD$ , & sub trapezio  $EDBG$ , aggregatum; quod est omnes vniprimæ

mæ



mæ sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ : est æquale omnibus duplis secundis potestatibus parallelogrammi  $AE$ , dempris omnibus duplis secundis potestatibus trianguli,  $IEC$ ; idest omnibus simplis secundis potestatibus parallelogrammi  $AH$ , dempris omnibus secundis potestatibus, vtrorumq; triangulorum  $IEC$ ,  $DEH$ .


Sed qualium trianguli  $IEC$  omnes secundæ potestates, sunt vnitas: talium parallelogrammi  $AE$ , sunt 3. Ideoq; qualium omnes secundæ potestates triangulorum  $IEC$ ,  $DEH$ , sunt 2: talium omnes secundæ potestates parallelogrammi  $AH$ , sunt 6. Et omnes vniprimæ sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , sunt vtrorumque differentia, nempe 4: & omnes sexcuplæ vniprimæ, sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , sunt 24. Item qualium omnes secundæ potestates  $AH$ , sunt 6: talium omnes secundæ potestates  $AB$ , sunt 24. Ergo omnes sextuplæ vniprimæ, sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , sunt æquales, omnibus secundis potestatibus  $AB$ . Quod &c.

Dico sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , omnes duodecuplas biprimas, æquales esse, omnibus tertijs potestatibus parallelogrammi  $AB$ .

*Demonstr. 2.*

Quoniam aggregatum ex biprimis  $KMN$ ,  $OPR$ , est æquale duplæ tertiæ potestati  $KL$ , dempta dupla vniseconda  $KLM$  (idest, dempto duplo producto sub potestatibus, prima  $KL$ , & secunda  $LM$ ). Ostendetur similiter vt supra, quod omnes biprimæ sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ ,  
sunt





sunt æquales omnibus tertijs potestatibus parallelogrammi  $AH$ , demptis omnibus vnifecundis sub potestatibus primis eiusdem  $AH$ , & sub secundis vtrorumque triangulorum  $IEC$ ,  $DEH$ .

Qualium autem omnes secundæ potestates trianguli  $IEC$ , sunt vnitas: talium omnes secundæ potestates parallelogrammi sunt 3: ideoque qualium omnes vnifecundæ sub parallelogrammo  $AE$ , & sub triangulo  $IEC$ , sunt vnitas: talium omnes tertiæ potestates parallelogrammi  $AE$ , sunt 3. & qualium omnes vnifecundæ sub parallelogrammo  $AH$ , & sub vtrisque triangulis  $IEC$ ,  $DEH$ , sunt 2: talium omnes tertiæ potestates  $AH$ , sunt 6: & omnes biprimæ sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , sunt vtrorumque differentia, nempe 4: & omnes duodecuplæ biprimæ sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , sunt 48. item qualium omnes tertiæ potestates  $AH$ , sunt 6: talium omnes tertiæ



tia potestates  $AB$ , sunt 48. Ergo omnes duodecuplae bi-primae, sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , sunt aequales omnibus tertijs potestatibus  $AB$ . Quod &c.

Dico sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , omnes 60plas trise-  
cundas, aequales esse, omnibus quintis potestatibus paral-  
lelogrammi  $AB$ .

*Demonstr. 3.*

Quoniam aggregatum ex trisecondis  $KMN$ ,  $OPR$ ,  
est aequale duplae quintae potestati  $KL$ , dempta quadru-  
pla triseconda  $KLM$ , addita dupla vniquarta  $KLM$ . osten-  
detur similiter vt supra, quod omnes trisecondae sub trian-  
gulis  $ACD$ ,  $BCD$ , sunt aequales omnibus quintis potesta-  
tibus parallelogrammi  $AH$ ; demptis omnibus duplis trise-  
cundis, sub potestatibus tertijs  $AH$ , & sub secundis vtro-  
rumque triangulorum  $IEC$ ,  $DEH$ , additis omnibus vni-  
quartis sub potestatibus primis  $AH$ , & sub quartis vtro-  
rumque triangulorum  $IEC$ ,  $DEH$ .


Qualium autem omnes secundae potestates trianguli  
 $IEC$ , sunt 5: talium omnes secundae potestates parallelo-  
grammi  $AE$ , sunt 15. ideoque qualium omnes trisecon-  
dae sub tertijs potestatibus parallelogrammi  $AE$ , & sub se-  
cundis trianguli  $IEC$ , sunt 5: talium omnes quintae pote-  
states parallelogrammi  $AE$ , sunt 15: atque talium omnes  
duplae trisecondae sub  $AE$ , & sub  $IEC$ , sunt 10: atque  
differentia vtrarumque, est 5.

Rursum, qualium omnes quartae potestates trianguli  
 $IEC$ , sunt 3: talium omnes quartae potestates  $AE$ , sunt

Zz

15.





15. ideoque qualium omnes vniuartæ, sub primis,  $AE$ , & quintis  $IEC$  potestatibus, sunt 3: talium omnes quintæ potestates  $AE$ , sunt 15. sed talium ostensæ sunt omnes quintæ  $AE$ , demptis omnibus duplis trisecundis, sub  $AE$ , & sub  $IEC$ , esse 5: ergo additis omnibus vniuartis, sub  $AE$ , & sub  $IEC$ , sunt 8.

Sed qualium omnes quintæ  $AE$ , sunt 15: talium omnes quintæ  $AH$  sunt 30: & omnes quintæ  $AH$ , demptis omnibus duplis trisecundis, sub  $AH$ , & sub vtrisque  $IEC$ ,  $DEH$ , additisque omnibus vniuartis, sub  $AH$ , & sub vtrisque  $IEC$ ,  $DEH$ , sunt 16: nempe omnes trisecundæ, sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , sunt 16: & omnes 6oplæ trisecundæ sub iisdem, sunt 960. & qualium omnes quintæ potestates  $AH$ , sunt 30: talium omnes quintæ potestates  $AB$ , sunt 960. Ergo omnes 6oplæ trisecundæ, sub triangulis  $ACD$ ,  $BCD$ , sunt æquales, omnibus quintis potestatibus parallelogrammi  $AB$ . Quod &c. Quare &c.

*His*



His demonstratis, cogitabam si possent aliæ quadraturæ inueniri ex inuentis compositæ, in quas insignis aliqua resoluatur; quemadmodum in triangula, parabolam Archimedes resoluit. Et quæsiui primum de omnibus figuris, in quibus ordinatæ ad basim, sunt omnes potestates abscissarum, primæ, secundæ, tertiæ, & deinceps in infinitum: quas ex demonstratis à Cauallerio loco citato, deprehendebam esse in serie harmonica naturali ab unitate earumque summam demonstraui excrecere in infinitum, in præfatione ad meum libellum, cui titulus, *Nouæ Quadraturæ Arithmeticæ, seu de Additione Fractorum*.

Deinde tentavi, si possent in unam colligi summam figuræ, in quibus ordinatæ ad basim, sunt abscissæ primæ, & producti sub primis abscissis, & residuarum potestatibus omnifariam, idest, abscissæ primæ, uniprimæ, unisecundæ, unitertiæ, uniquartæ, & deinceps in infinitum: quas colligere mihi successit feliciter, & æquales inuenire parallelogrammo, cuius ad eandem basim ordinatæ, sunt omnes totæ; ut potest facile colligi ex supra demonstratis, & ex 17. p. *Nou. Quadr.*

Item si possent colligi figuræ, in quibus ordinatæ ad basim sunt abscissæ secundæ, & producti sub abscissis secundis, & residuarum potestatibus omnifariam, idest, abscissæ secundæ, biprimæ, bisecundæ, bitertiæ, biquartæ, & deinceps in infinitum: quas etiam colligere mihi successit, & æquales inuenire triangulo, cuius ordinatæ sunt omnes abscissæ. ut patet ex supra demonstratis, & ex 8.2. *Nou. Quadr.*

Et generaliter inueni, figuram, in qua ordinatæ sunt omnes potestates abscissarum, & deinceps omnes figuras, in quibus ordi-



natæ sunt productæ sub ijsdem potestatibus abscissarum, & sub residuarum potestatibus omnifariam, simul aggregatas, æquales esse figuræ, in qua ordinatæ sunt omnes potestates abscissarum ordinis proximè inferioris. Verbi gratia, omnes abscissas tertias, additis omnibus triprimis, omnibus trisecundis, omnibus triteritijs, alijsque omnibus triquotis; esse æquales, omnibus abscissis secundis. Item omnes abscissas quartas, additis omnibus quadriprimis, omnibus quadrisecondis, omnibus quadritertijs, omnibus quadriquartis, alijsque omnibus quadriquotis; esse æquales omnibus abscissis tertijs, quod ita generaliter ut enunciatur est, & ex supra demonstratis, & ex 5. 3. Nou. Quadr. potest manifestari.

Ipsam interim accessionem, quam Geometriæ Indivisibilium feceram, præterui: Veritus eorum auctoritatem, qui falsum putant suppositum, omnes rectas figuræ planæ infinitas, ipsam esse figuram planam: non quasi hanc sequens partem; sed illam quasi non prorsus indubiam deuitans: tentandi animo, si possem de eadem eandem indivisibilium methodum, aut aliam æquivalentem novis, & indubijs prorsus constituere fundamentis.

Mechanicis deinde ac Musicis hucusque imperfectis occupatus lucubrationibus, in eas quandoque veni demonstrandarum conclusionum angustias, ut per omnifariam hæc nostra elementa, novorum indigerem argumentorum. quæ priuatis tradita scripsit delitecebant, non inculta solum, sed & ita perperam posita, ut quasi specialia Lemmata quorundam mathematicorum, non valerent ad aliud. Animaduvertebam etiam me non posse multum in Mechanicis proficere, quas liberaliter profiteor; nisi ex ubertiore

Geo-



Geometria, quàm quæ hucusque ab Euclide, Apollonio, alijsque posterioribus tradita esset.

Nuperrimè hoc anno, Adm. R. P. Fr. Stephanus de Angelis Iuattus, meus condiscipulus, de indiuisibilium Præceptoris nostri Geometria omnium optimè meritis, cuius intellectus copiam, & felicitatem, nunquam satis à me cõmendari possè verbis existimo, mittebat ad me libellum suum De Infinitis Parabolis &c. legendum: cuius ex eruditione mirabili, melior, & vegetior factus Geometra; maximum hoc emolumentum percepi: Ut præterita studia reuenterentur in mentem; ordinemque, inter plura deinceps inuenta, postularent. & illud tandem mihi, opinor, successisse feliciter, quod duodecim ante annos desideraueram: ijs etiam, quibus deuincior, Mechanicorum studiorum obligationibus oportunum. super qua mea opinione, Vir Excellentissime, hisce lucubrationibus perlectis; & quatenus oportuerit ad correctionem notatis: tuam sinceram enixè rogans, postulo, & expecto sententiam. Vale.





*Tabula Formosa.**FO.u.**FO.a. FO.r.**FO.a2. FO.ar. FO.r2.**FO.a3. FO.a2r. FO.ar2. FO.r3.**FO.a4. FO.a3r. FO.a2r2. FO.ar3. FO.r4.**Tabula Subquadraturarum.**FO.u.**FO.a. FO.r.**FO.a2. FO.2ar. FO.r2.**FO.a3. FO.3a2r. FO.3ar2. FO.r3.**FO.a4. FO.4a3r. FO.6a2r2. FO.4ar3. FO.r4.**Tabula Quadraturarum.**FO.u.**FO.2a. FO.2r.**FO.3a2. FO.6ar. FO.3r2.**FO.4a3. FO.12a2r. FO.12ar2. FO.4r3.**FO.5a4. FO.20a3r. FO.30a2r2. FO.20ar3. FO.5r4.*

GEO-







# GEOMETRIÆ SPECIOSÆ ELEMENTVM SEXTVM.

## DEFINITIONES.



- 1  Sumatur inter lineas, vna quælibet quantitas; quæ, Rationalis, dicetur.
- 2  Et exponatur quædam recta linea, rationali æqualis; quæ dicetur, Tota:
3. Sitque data positione; quæ dicetur, Basis.
4. Eiusque alterum extremorum punctorum, dicetur, Finis abscissarum.
5. Alterum, Finis residuarum.
6. Et ab vnoquoque puncto in basi sumpto, vsque ad finem abscissarum, quatenus ipsa basis extenditur, quantitas dicetur Abscissa.
7. Ideoque tota dicetur etiam, Maxima abscissarum.
8. Item ab vnoquoque puncto in basi sumpto, vsque ad finem residuarum, quatenus basis extenditur, quantitas dicetur Residua.
9. Ideo-



9. Ideoque tota dicetur etiam, Maxima residuarum.

10. Super basi describatur quadratum: & ab vno quolibet puncto in basi sumpto, recta ducatur, vsque ad oppositum latus, reliquis lateribus quadrati parallela: quæ dicetur, Ordinata in quadrato.

11. Quæ cum sit æqualis rationali, & totæ; dicetur Rationalis, & Tota, & Maxima abscissarum, & Maxima residuarum.

12. Et quadratum, per suas ordinatas extensum, dicetur, Forma omnes rationales, & Forma omnes totæ. & significabitur characteribus *FO. u.* & *FO. t.*

13. Immò quoniam tota est æqualis rationali, & reliquæ omnes potestates totæ, sunt inter se, & rationali æquales: ordinata in quadrato dicetur etiam, Tota secunda, Tota tertia, Tota quarta, & deinceps.

14. Et quadratum, dicetur, Forma omnes totæ secundæ, Forma omnes totæ tertiæ, Forma omnes totæ quartæ. aptisque significabitur characteribus, *FO. t2*, *FO. t3*, *FO. t4*. & sic deinceps.

15. A fine abscissarum ducta diameter quadrati, facit semiquadratum triangulum: cuius ab vno quolibet puncto in basi sumpto recta ducatur, vsque ad prædictam diametrum, alteri lateri parallela, quæ dicetur, Ordinata in triangulo.

16. Quæ cum sit æqualis abscissæ, dicetur, Abscissa.

17. Ipsumque triangulum per suas ordinatas extensum, dicetur, Forma omnes abscissæ. & significabitur characterẽ, *FO. a.*

18. Si-



18. Similiter à fine residuarum ducta, diameter quadrati, facit semiquadratum triangulum: cuius vnaquolibet ordinata, cum sit æqualis residuæ, dicetur Residua.

19. Et per ordinatas residuas extensum triangulum, dicetur, Forma omnes residuæ. & significabitur caractere, *FO.r.*

20. Si super basi concipiatur figura extensa non nisi per ordinatas in quadrato: sed in qua, vnaquolibet ordinata, est abscissa secunda, dicetur, Forma omnes abscissæ secundæ. & significabitur caractere *FO.a2.*

21. Item, in qua, vnaquolibet ordinata, est vniprima, dicetur, Forma omnes vniprimæ. & significabitur caractere, *FO.ar.*

22. Et in qua, vnaquolibet ordinata, est residua secunda, dicetur Forma omnes residuæ secundæ. & significabitur caractere, *FO.r2.*

23. Et generaliter, si super basi concipiatur figura, extensa non nisi per ordinatas in quadrato: & in qua, vnaquolibet ordinata, est assumpta quædam in tabula proportionalium: dicetur, Forma omnes tales proportionales. aptoque significabitur caractere. vt Forma omnes abscissæ tertiæ, *FO.a3:* Forma omnes biprimæ, *FO.a2r:* Forma omnes vnifecundæ, *FO.ar2:* Forma omnes residuæ tertiæ, *FO.r3.* & sic deinceps.

24. Itaque ad instar tabulæ proportionalium, & specierum, alia tabula ordinabitur formarum, quæ dicetur, Formosa.

A a a

25. Quod



25. Quod si vna quaelibet ordinata in forma, est assumpta quædam in tabula nominum: dicetur, Forma omnes totuplæ tales proportionales, aptoque significabitur caractere. vt, Forma omnes duplæ vniprimæ, *FO.2ar*: Forma omnes triplæ biprimæ, *FO.3ar*: Forma omnes triplæ vnifecundæ, *FO.3ar2*. & sic deinceps.

26. Ideoque ad instar tabulæ nominum, & subquadratricum, alia tabula ordinabitur, quæ dicetur, Tabula subquadraturarum.

27. In qua digestæ formæ, dicentur, Subquadraturæ.

28. Item ad instar tabulæ quadratricum, alia tabula ordinabitur, quæ dicetur, Tabula Quadraturarum.

29. In qua digestæ formæ, dicentur, Quadraturæ.

30. Denique si vnaquælibet ordinata, in forma, est assumptæ proportionalis multipla, vel submultipla, vel multiplæ submultipla: dicetur, Forma omnes totuplæ tales proportionales, vel subtotuplæ, vel totuplarum subtotuplæ. aptisque significabitur caracteribus. vt Forma omnes quintuplæ bitertiæ, *FO.5ar3*: & Forma omnes biprimæ subtriplæ, *FO.2ar(3)*: & Forma omnes quadruplæ triquartæ subseptulæ, *FO.4ar4(7)*. & sic deinceps.

31. Si basis diuisa fuerit in partes æquales; ductæque fuerint per extrema & media diuisionum puncta parallelæ ordinatæ in forma; & super partibus basis æqualibus, inter parallelas completa fuerint parallelogramma maxima intra formam iacentia: figura ex parallelogrammis composita, dicetur, Inscripta formæ.

32. Quod



32. Quod si completa fuerint parallel ogramma minima formam includentia: figura ex parallel ogrammis composita, dicetur, Circumscripta formæ.

33. Figura vero ex tot parallelogrammis, quot sunt ordinatæ per puncta diuisionum, & ad ipsas ordinatas iacentibus composita, dicetur, Adscripta formæ.

34. Speciosa, & Formosa tabulis congruentibus, Massæ, & Formæ, quarum in vtrisque sunt eedem appellationes, & iidem characteres, dicentur inuicem Homonymæ.

35. Item Homonymarum æquemultiplices, dicentur Homonymæ.

36. Ideoque etiam in duabus subquadratricum, & subquadraturarum, aut quadratricum, & quadraturarum tabulis, Massæ, & Formæ, dicentur Homonymæ.




Aaa 2

Theo-



*Theor. I. Prop. I.*

**T**Abulæ formosæ primi lateris, in tertia, quarta, & reliquis deinceps formis, in singulis ordinatæ, pro maioribus abscissis, sunt maiores; & pro maxima abscissarum, est maxima, & ipsi basi æqualis: item ultimi lateris in formis, pro maioribus residuis, sunt maiores; & pro maxima residuarum, est maxima, & ipsi basi æqualis.

*Hypoth.*

Est basis  $AR$ : in qua finis abscissarum,  $A$ ; finis residuarum,  $R$ . & sint abscissæ,  $AB$  minor,  $AC$  maior,  $AR$  maxima; & residuæ,  $RC$  minor,  $AB$  maior,  $RA$  maxima: & esto in primo latere tabulæ formosæ, tertia  $FO.a2$ ; & in ultimo, tertia  $FO.r2$ .

Dico in  $FO.a2$ , ordinatam per  $C$ , maiorem esse ordinatam per  $B$ : & per  $R$ , maximam esse ordinatarum, & æqualem ipsi  $AR$ .

Item in  $FO.r2$ , ordinatam per  $B$ , maiorem esse ordinatam per  $C$ : & per  $A$ , maximam esse ordinatarum, & æqualem ipsi  $RA$ .

*Demonstr.*

*def. 20b* Basis  $RA$ , ad ordinatam per  $B$ , duplicatam habet rationem eius, quàm habet ad  $AB$ : & ad ordinatam per  $C$ , duplicatam eius, quàm habet ad  $AC$ :



4. 3.  $AC$ : & ad ordinatam per  $R$ , duplicatam æqualitatis, quàm habet ad  $AR$ . Sed  $RA$  ad  $AB$ , maior est, quàm vt ad  $AC$ : & ad  $AC$ , maior, quàm vt æqualis ad  $AR$ . Ergo ad ordinatam per  $B$ , maior est, quàm vt ad ordinatam per  $C$ : & ad ordinatam per  $C$ , maior, quàm vt ad ordinatam per  $R$ . Ergo ordinata per  $B$ , minor est, quàm quæ per  $C$ : & vtralibet per  $B$ , & per  $C$ , minor, quàm quæ per  $R$ : & ordinata per  $R$ , est maxima; ad quàm  $RA$  duplicatam habet rationem æqualitatis, nempe eandem habet æqualitatis rationem: ergo per  $R$  ordinata, est ipsi  $AR$  æqualis. Quæ &c.

Simili prorsus demonstratione ostendetur, quòd in  $FO.r2$ , ordinata per  $B$ , maior est, quàm quæ per  $C$ : & vtralibet per  $B$ , & per  $C$ , minor, quàm quæ per  $A$ : & per  $A$  ordinata est maxima, & ipsi  $AR$  æqualis. Quæ &c.  
Quare &c.


---

*Theor. 2. Prop. 2.*

**I**N singulis formosæ tabule, non primi, nec vltimi lateris formis, ordinarum maxima, minor est, quàm tota: & facit abscissam, & residuam, proportionales, vt numeri, à quibus ipsa forma denominatur: reliquarum verò ex vtralibet parte, propior maxime remotiore maior est.

*Hy-*



*Hypoth.*

Est basis  $AR$ ; in qua, finis abscissarum,  $A$ ; finis residuarum  $R$ : & esto in tabula formosa, non in primo, nec in ultimo latere, forma omnes bitertiae, quàm denominant numeri 2, 3, cuius character,  $FO.a2r3$ . & diuidatur  $AR$  in  $B$ , ut abscissa  $AB$ , ad residuam  $BR$  sit proportionalis, sicut 2 ad 3: sumanturque aliae abscissae minores, quàm  $BA$ , nempe  $DA$ ,  $CA$ : & aliae residuae minores, quàm  $BR$ , nempe  $ER$ ,  $FR$ .

Dico in  $FO.a2r3$ , ordinatam per  $B$  minorem esse, quàm  $AR$ ; & ordinatarum esse maximam: & ordinatam per  $D$ , maiorem esse, quàm quæ per  $C$ : & ordinatam per  $E$ , maiorem, quàm quæ per  $F$ .

*Demonstr.*


6. p. Rationalis  $u$ , ad  $a2r3$ , rationem habet compositam ex rationibus,  $u$  ad  $a2$ , &  $u$  ad  $r3$ : idest  
 def.8. p. compositam ex duplicata  $u$  ad  $a$ , & ex triplicata  $u$  ad  $r$ . Est autem  $AR$  ad  $AB$ , ut  $u$  ad  $a$ : &  $AR$  ad  $BR$ , ut  $u$  ad  $r$ : & ad ordinatam per  $B$ , est ut  $u$  ad  $a2r3$ . Ergo  $AR$  ad ordinatam per  $B$ , habet rationem compositam ex rationibus, duplicata  $AR$  ad  $AB$ , atque triplicata  $AR$  ad  $RB$ . Sed  $AR$  ad  $AB$ , &  $AR$  ad  $RB$ , sunt maioris inequalitatis



litatis rationes, quæ tùm multiplicatæ, tùm compositæ, faciunt maioris inæqualitatis rationem. Quare  $AR$  maior est, quàm ordinata per  $B$ . Quod &c.

Simili prorsus demonstratione ostendetur, quod ordinata per  $D$  ad  $AR$ , habet rationem compositam ex duplicata  $AD$  ad  $AR$ , & ex triplicata  $DR$  ad  $AR$ . Ergo ex æquali, ordinata per  $D$  ad ordinatam per  $B$ , rationem habet compositam ex duplicata  $DA$  ad  $AB$ , & ex triplicata  $DR$  ad  $RB$ . Sunt autem  $DA$ ,  $AB$ ,  $BR$ ,  $RD$ , quatuor arithmetice dispositæ, quarum secunda  $AB$  ad tertiam  $BR$  est vt 2 ad 3. Ergo duplicata ratio  $DA$  ad  $AB$  minor est, quàm triplicata  $BR$  ad  $RD$ . Habet autem secunda potestas  $DA$  ad secundam  $AB$  duplicatam rationem eius, quàm habet  $DA$  ad  $AB$ : & tertia potestas  $BR$  ad tertiam  $RD$  triplicatam  $BR$  ad  $RD$ . Ergo secunda potestas  $DA$  ad secundam  $AB$  minor est, quàm vt tertia potestas  $BR$  ad tertiam  $RD$ : ergo productus sub secunda potestate  $AD$ , & sub tertia  $DR$ , minor est producto, sub secunda  $AB$ , & sub tertia  $BR$ . Sed productus sub secunda potestate  $AD$ , & sub tertia  $DR$ , ad productum sub secunda  $AB$ , & sub tertia  $BR$ , compositam habet ex rationibus secundæ potestatis  $AD$  ad secundam  $AB$ , & tertiæ  $DR$  ad tertiam  $BR$ : nempe compositam ex duplicata  $AD$  ad  $AB$ , & triplicata  $DR$  ad  $RB$ :





$RB$ : nempe eandem quàm ordinata per  $D$  ad ordinatam per  $B$ . Ergo ordinata per  $D$ , minor est quàm ordinata per  $B$ . Similiter ostendetur, quòd & ordinata per  $E$ , per  $C$ , per  $F$ , singulæ sunt minores, quàm ordinata per  $B$ . Ergo ordinata per  $B$  est maxima. Quod &c.

Simili prorsus demonstratione ostendetur, quòd ordinata per  $C$  ad ordinatam per  $D$ , est vt productus sub secunda potestate  $AC$ , & sub tertia  $CR$ , ad productum sub secunda  $AD$ , & sub tertia  $DR$ : & quod rationem habet compositam ex rationibus, duplicata  $CA$  ad  $AD$ , & triplicata  $CR$  ad  $RD$ . Sunt autem  $DA$ ,  $AC$ ,  $CR$ ,  $RD$ , quatuor arithmetice dispositæ quarum  $DA$  maior est, quàm  $AC$ : & sunt duo numeri 2 ad 3, vt  $AB$  ad  $BR$ , maiorem scilicet rationem habentes, quàm  $AD$  ad  $DR$ . Ergo maior est  $DA$  ad  $AC$  duplicata ratio, quàm  $CR$  ad  $RD$  triplicata: & è conuerso minor est  $CA$  ad  $AD$  duplicata, quàm  $DR$  ad  $RC$  triplicata: & minor est secunda potestas  $CA$  ad secundam  $AD$ , quàm vt potestas tertia  $DR$  ad tertiam  $RC$ : & minor est productus sub secunda potestate  $AC$ , & sub tertia  $CR$ , quàm sub secunda potestate  $AD$ , & sub tertia  $DR$ : & minor




minor est ordinata per  $C$ , quàm ordinata per  $D$ . Simi-  
liter ostendetur, quòd ordinata per  $F$ , minor est, quàm or-  
dinata per  $E$ . Quod &c.

Quare &c.

*Probl. I. Prop. 3.*

**F**ormæ propositæ, in data basi, per datum punctum,  
ordinatam inuenire.

*Hypoth.*



Esto proposita  $FO.10a2r3$ , super data basi  $AR$ , in  
qua datum punctum  $B$ .

Oportet per  $B$  ordinatam inuenire.

*Constr.*


Data  $AR$ , datisque  $AB$ ,  $BR$ , inueniatur recta  $BC$ , ad  
quàm  $AR$ , rationem habet compositam ex datis rationi-  
bus,  $AR$  ad  $AB$  duplicata,  $AR$  ad  $BR$  triplicata, & ex ra-  
tione subdecupla: & collocetur  $BC$  perpendiculariter ad  
 $AR$ .

Dico  $BC$ , esse ordinatam per  $B$ , in  $FO.10a2r3$ .

Bbb

De-





*Demonstr.*

Ratio  $AR$  ad  $BC$ , componitur ex rationibus  $AR$  ad  $AB$  duplicata,  $AR$  ad  $BR$  triplicata, & ex subdecupla: sed  $AR$ , est  $u$ ;  $AB$ , est  $a$ ;  $BR$ , est  $r$ : Ergo  $AR$  ad  $BC$  ratio, componitur ex rationibus  $u$  ad  $a$  duplicata,  $u$  ad  $r$  triplicata, & ex subdecupla: sed ex iisdem componitur  $u$  ad  $10a^2r^3$ : ergo  $AR$  ad  $BC$  est ut  $u$  ad  $10a^2r^3$ : Sed  $AR$  est  $u$ : ergo  $BC$ , est  $10a^2r^3$ : ergo  $BC$  est ordinata per  $B$ , in  $FO.10a^2r^3$ . Quod &c.

Quare &c.

*Probl. 2. Prop. 4.*

**S**Vper data basi propositæ formæ primi vel ultimi lateris, per datum numerum diuisa in partes æquales, tres figuras ex parallelogrammis describere, inscriptam, circumscriptam, & adscriptam: & ostendere, quòd inscripta & adscripta sunt æquales: & quòd circumscripta excedit inscriptam quantitate rectanguli sub maxima ordinata, & sub vna æqualium basis partium.

*Hy-*



*Demonstr.*

2. h.

def. 32b

Ordinatarum per omnia  $BF$  puncta, maxima est per  $F$ , nulla per  $B$ : ergo inter ordinatam per  $F$ , & parallelam per  $B$ , minimum parallelogrammorum includentium formam est  $MB$ , ideoque ad circumscriptam pertinens figuram: nullum verò est intra formam iacentium. Item ordinatarum per omnia  $EF$  puncta maxima est per  $G$ ; & per  $E$ , minor, quàm quæ per  $E$ , est minima: & inter ordinatas  $EK$ ,  $FM$  minimum parallelogrammorum includentium formam, est  $ELF$ , & intra formam iacentium maximum  $EM$ ; ideoque ad circumscriptam pertinet  $ELF$ ; ad inscriptam verò  $EM$ . Similiter ostendetur, quod  $DK$ ,  $CI$ ,  $AH$  pertinent ad circumscriptam; &  $HD$ ,  $IE$  ad inscriptam. Quare inscripta est ex  $HD$ ,  $IE$ ,  $EM$ : & circumscripta  $AH$ ,  $CI$ ,  $DK$ ,  $ELF$ ,  $MB$ . Et quoniam  $CH$ ,  $DI$ ,  $EK$ ,  $FM$  sunt ordinatæ; quibus adjacent parallelogramma  $AH$ ,  $CI$ ,  $DK$ ,  $EM$ , vel  $HD$ ,  $IE$ ,  $KF$ ,  $MB$ : manifestum est adscriptam ex  $AH$ ,  $CI$ ,  $DK$ ,  $EM$ , vel ex  $HD$ ,  $IE$ ,  $KF$ ,  $MB$  compositam esse. Excedit autem circumscripta adscriptam spatijs,  $AH$ ,  $HI$ ,  $IK$ , & excessu  $ELF$ , supra  $KF$ ; vel spatijs  $KLM$ ,  $MB$ : quæ utralibet sunt æqualia vni rectangulo  $ELF$ : excedit ergo circumscripta adscriptam, quantitate rectanguli  $ELF$ . Adscripta vero excedit inscriptam

spa-



spatijs  $AH, HI, IK$ ; vel spatijs  $KM, MB$ : quæ vtralibet non maiora sunt rectangulo  $ELF$ : excedit ergo adscripta inscriptam, non maiori quantitate, quàm sit  $ELF$ . Quæ &c. Quare &c.

---

*Probl. 4. Prop. 6.*

**I**nuenire numerum, per quem propositæ formæ data basis diuidatur, vt circumscripta, & inscripta sint propiores æqualitati, quàm in data ratione inæqualitatis.

*Hypoth.*

Esto data basis  $B$ , dataque ratio maioris inæqualitatis  $c$  ad  $d$ .

Oportet numerum inuenire, per quem cum diuisa fuerit  $B$ , & figuræ circumscripta & inscripta descriptæ fuerint, circumscripta ad inscriptam, minor sit, quàm vt  $c$  ad  $d$ .

*Constr.*

Assumatur quilibet numerus, per quem diuidatur  $B$ : & inscripta describatur figura  $E$ : & inueniatur quantitas  $F$ , ad quàm  $E$ , maior est, quàm vt  $c$  ad  $c---d$ . Assignetur etiam, in ipsa  $B$ , punctum: per quod maxima ordinarum inueniatur  $G$ : & ad  $G$  applicetur quantitas  $F$ , vt fiat latitudo  $H$ : & sumatur ipsius  $H$  multiplex  $L$ , maior quàm dupla  $B$ : & quotuplex est  $L$  ad  $H$ , totus numerus esto  $M$ .

Dico  $M$ , esse numerum, per quem, cum diuisa fuerit  $B$ ; & figuræ circumscripta, & inscripta, fuerint descriptæ:  
cir-



circumscripta ad inscriptam minor est, quàm vt  $c$  ad  $d$ .

*Præpar.*

Quotus est  $M$ , tota pars ipsius  $B$  accipiatur  
 5. b.  $N$ . & diuisa basi per numerum  $M$ , sit inscripta  
 figura  $Q$ , circumscripta  $R$ , adscripta  $S$ .

*Demonstr.*

2. p. Quoniam  $B$  ad  $N$ ; est vt  $M$  ad unitatem, vel  
 vt  $L$  ad  $H$ : permutando  $B$  ad  $L$ , est vt  $N$  ad  
 F. p.  $H$ : &  $2B$  ad  $L$ , vt  $2N$  ad  $H$ . Sed  $2B$ , minor  
 est, quàm  $L$ : ergo  $2N$ , minor est, quàm  $H$ : er-  
 go  $2GN$  rectangulum, minus est rectangulo  $GH$ .  
 sed rectangulum  $GH$ , est æquale ipsi spatii  $F$ : er-  
 go  $2GN$ , minus est, quàm  $F$ . Et est  $E$  ad  $2GN$ ,  
 ratio maior, quàm  $E$  ad  $F$ . Sed  $E$  ad  $F$  ratio,  
 maior est, quàm  $c$  ad  $c---d$ : ergo  $E$  ad  $2GN$   
 ratio, maior est, quàm  $c$  ad  $c---d$ . Est autem  $R$ , ma-  
 ior, quàm  $E$ : ergo  $R$  ad  $2GN$  ratio, maior est,  
 5. b. quàm  $c$  ad  $c---d$ . Est autem  $R---S$ , equalis ipsi  
 $GN$ : &  $S---Q$ , non maior est, quàm  $2GN$ : er-  
 go  $R$  ad  $R---Q$ , maior est, quàm  $c$  ad  $c---d$ :  
 3. 3. ergo, per conuersionem rationis,  $R$  ad  $Q$ , mi-  
 nor est, quàm vt  $c$  ad  $d$ . Ergo  $M$  est numerus  
 per quem &c. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 3. Prop. 7.*

**A**dscripta, & forma, sunt quasi æquales.

Ccc

De-



*Demonstr.*

6. h. Nam data qualibet inæqualitatis ratione, pos-  
 5. h. sunt inueniri, circumscripta formæ, & inscripta,  
 67. 5. propiores equalitati: est autem vtraliber adscripta,  
 & forma, minor, quàm circumscripta, & maior,  
 quàm inscripta: ergo potest inueniri adscripta ad  
 def. 3. 3. formam propior equalitati, quàm in data qualibet  
 inæqualitatis ratione. Quare adscripta, & forma,  
 sunt quasi æquales.

*Theor. 4. Prop. 8.*


**A**dscripta cuiusque formæ, ad formam in vertice for-  
 mosæ tabula, est vt à radice numero partium basis,  
 massa homonyma, ad totam vnitate plus ordinatā, quàm  
 sit basis tabulæ speciosæ, ad quam pertinet massa.

*Hypoth.*

def. 12. b. Sunt duæ formæ, vna in vertice formosæ  
 FO. u, quæ est quadratum AB; altera FO. i o a 2 r 3,  
 super eadem basi AR: in qua finis abscissarum A;  
 finis residuarum R. Et esto AR diuisa in partes  
 æquales, mediātibus pūctis D, E, F, G, H, I: per quæ  
 ordinatæ sint, in altera forma, rectæ DK, EL, FM,  
 GN, HO, IP; & in quadrato, sint DQ, ER, FS,  
 GT, HX, IY. & sint AK, DL, EM, FN, GO,  
 HP parallelogramma, ex quibus componitur ad-  
 scripta, quæ vocetur S: & AQ, DR, ES, FT,  
 GX, HY, IB parallelogramma æqualia, in quæ di-  
 uiditur



Q R S T X Y B



uiditur quadratum  $AB$ . Assumatur etiam numerus  $t$ , partium æqualium ipsius  $AR$ : & à radice  $t$ , massa  $O.1042r3$ , quæ ad quintam basim pertinet speciosæ tabulæ: sumaturque ab eadem radice  $t$ , tota sexta  $16$ .

Dico  $AB$  ad  $S$ , esse vt  $t6$  ad  $O.1042r3$ , à radice  $t$ .

*Demonstr.*

Quoniam  $AR$  ad  $DK$ , rationem habet compositam, ex duplicata  $AR$  ad  $AD$ , & ex triplicata  $AR$  ad  $RD$ , & ex subdecupla: videlicet pro abscissa vnitate  $a$ , compositam ex  $12$  ad  $a2$ , & ex  $13$  ad  $r3$ , & ex subdecupla: idest,

Ccc 2

eamdem,



eamdem, quàm  $t_5$  ad  $10a2r3$ , pro abscissa vnitae. sed  $AQ$  ad  $AK$ , est vt  $AR$  ad  $DK$ : ergo  $AQ$  ad  $AK$ , est vt  $t_5$  ad  $10a2r3$ , pro abscissa vnitae. Similiter  $DR$  ad  $DL$ , est vt  $t_5$  ad  $10a2r3$  pro abscisso binario: necnon similiter pro reliquis abscissis numeris. Sunt autem tot parallelogramma componentia ascriptam  $S$ , quot ordinatæ per puncta  $D, E, F, G, H, I$ , totidemque, quot ipsa puncta: & vnitae pauciores, quàm numerus partium ipsius  $AR$ ; nempe totidem, quot sunt eiusdem numeri  $t$  abscissiones, & abscissæ. Ergo per homologiam, æquemultiplicato vtriusque antecedente per  $t$ , collectisque consequentibus, quadratum  $AB$ , ad adscriptam  $S$ , est vt  $t$ , ad  $O.10a2r3$ . Quod &c.

Quare &c.

---

*Theor. 5. Prop. 9.*

**F**orma omnes multiplæ, ad formam omnes simplas eadem proportionales, super eadem basi iacentem, est æquemultiplica.

*Hypoth.*

Esto  $A$  forma omnes duplæ: & esto  $B$  forma omnes simplæ eadem proportionales, super communi basi iacentes.

Dico  $A$  ad  $B$  duplam esse.

*Demonstr.*

| Diuisa enim communi basi, per quemlibet numerum, in partes æquales, ordinate per puncta diuisio-



uisionum in  $A$ , duplæ sunt ordinatarum per eadem puncta in  $B$ , singulæ singularum: & adiacentia parallelogramma, quæ adscriptas componunt, dupla sunt singula singulorum; & simul omnia simul omnium: & adscripta  $A$ , adscriptæ  $B$  est dupla: sed adscripta  $B$  quasi est æqualis ad suam formam  $B$ : ergo adscripta  $A$ , quasi est dupla formæ  $B$ : sed forma  $A$  quasi est æqualis adscriptæ  $A$ : & sunt formæ  $A$ ,  $B$ , quantitates determinatæ. Ergo  $A$  ad  $B$  est dupla. Quod &c. Quare &c.

---

*Theor. 6. Prop. 10.*

**O**Mnes quadraturæ super eadem basi constitutæ, sunt inter se æquales.

*Demonstr.*

8. h. Nam adscripta cuiuslibet quadraturæ, ad formam in vertice formosæ tabulæ iacentem, est ut quadratrix homonyma, ad totam vnitate plus ordinatam, quàm in qua basi est quadratrix in sua tabula: sed quadratrix ad huiusmodi totam, quasi est æqualis: ergo adscripta quadraturæ, ad formam in vertice formosæ iacentem, quasi est æqualis: sed & ad suam quadraturam quasi est æqualis: ergo quadratura ad formam in vertice formosæ iacentem, est æqualis. Quare omnes quadraturæ, cum eidem determinatæ formæ sint æquales, inter se sunt æquales.

---



*Theor. 7. Prop. 11.*

**I**N vna quasque basi tabulæ subquadraturarum, subquadraturæ sunt æquales: & simul omnes, componunt quantitatem formæ, in vertice formosæ tabulæ iacentis.

*Demonstr.**def. 28b**9. h.**10. h.*

Nam in vnaquaque basi tabulæ subquadraturarum, quadraturæ sunt æquemultiplex. Sed æquales, ipsæ sunt inter se quadraturæ: ergo æquales etiam sunt inter se subquadraturæ.

*10. h.*

Deinde in vnaquaque basi tabulæ subquadraturarum, quotupla est quadratura vna vnus, tot sunt subquadraturæ: atque totupla est summa omnium subquadraturarum, ad vnā tantum. quare summa omnium subquadraturarum, vni quadraturæ est æqualis: sed vnaquælibet quadraturæ æqualis est formæ in vertice formosæ tabulæ iacenti. Quare in vnaquaque basi tabulæ subquadraturarum, summa omnium, æqualis est vni formæ, in vertice formosæ tabulæ iacenti.

*Porro in Tabula Formosa, in ipsius formis, præter ea, quæ in epistola ad Excellentissimum Casinum commemoravi ex meo libello Nouarum Quadraturarum alia inueni duo, quæ hic pro coronide recenseto: alias publicanda cum demonstratione, si Deus otium, & vltiorem fortunam concesserit.*

*Vnum de mixtilineis angulis, & de cornibus formarum; & de angulorum quantitibus, & idelicet.*

Se-



Secundæ basis secunda & penultima forma, est binangula, cuius angulorum sinus rectus duplus versi. tertiæ verò, & quartæ, ac reliquarum deinceps omnium basium formæ, prima & vltima, secunda & penultima, sunt vnicornes, & vnangulæ; quarum sinus rectus angulorum, ad verum totuplus est, quotus est ordo basis: in tertia, triplus; in quarta, quadruplus; in quinta quintuplus, & sic deinceps. reliquæ demum formæ omnes, sunt bicornes.

*Alterū de centris grauitatum bipartitum, cuius prima pars est.*

Cuiusque formæ in tabula formosa, recta linea per centrum grauitatis ordinata, facit partes basis reciproce proportionales, ab scissam ad residuam, sicut eius ordinum numeri in sua basi à prima, & ab vltima. Exempli gratia. Formæ in quarta basi, secundæ tritultimæ per centium ordinata, facit partes basis, ab scissam ad residuam proportionales, vt 3 ad 2, ordo tritultimæ ad ordinem secundæ.

*Secunda pars est.* In vnaquaque forma, linea ex centro grauitatis ducta ordinatim ad basim, à basi, & centro finita, dicetur, Altitudo centralis. Itaque formarum in tabula formosa, centrales altitudines habent reciprocam rationem compositam ex rationibus numerorum, qui quadraturas ex formis producant; ex directâ iacentium in iisdem basibus, & lateribus tabulæ quadraturarum, & ex conuersa iacentium in basibus duplordinatis, & in lateribus vnitatis minùs, quàm duplordinatis. Exempli gratia. Centralis altitudo  $FO.a4r2$ . formæ in sexta basi tertiæ quintultimæ, ad centralem altitudinem  $FO.a3r6$ , formæ in nona  
basi



basi septimæ quartultimæ, rationem habet compositam ex rationibus numerorum quadraturas producentium ex formis; ex ratione, inquam, 105, tertij quintultimi in sexta basi, ad 840, septimum quartultimum in nona basi; & ex ratione 352716, tredecimi septimultimi in decima octaua basi, ad 6435, quintum nonultimum in duodecima basi.

*Vel aliter.* Altitudines centrales formarum in tabula formosa iacentium, rationem habent compositam, tum ex ratione earundem formarum conuersa, tum etiam ex directa aliarum in eadem tabula in basibus duplordinatis, & in lateribus vnitate minùs quàm duplordinatis. Exempli gratia. Centralis altitudo  $FO.44r2$ , ad centralem

$FO.43r6$ , rationem habet compositam, ex rationibus,  $FO.43r6$ , ad  $FO.44r2$ ; &

$FO.48r4$ , ad  $FO.46r12$ .



DEO GRATIAS.



005643695



